

## **ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften**

### **Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluß der wichtigsten venerischen Erkrankungen**

für praktische Ärzte und Studierende

**Jacobi, Eduard**

**Berlin [u.a.], 1913**

**ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften**

Shelf Mark: UiVI -2-

Fibromata mollusca.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-145485](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-145485)

## Fibromata mollusca.

Tafel 96, Fig. 157.

Isolierte Fibrome der Haut kommen verhältnismäßig selten zur Beobachtung, weit häufiger sind die angeborenen oder auf kongenitaler Anlage sich entwickelnden, von den Nervenscheiden ausgehenden multiplen weichen Fibrome (Neurofibrome). Dieselben kommen meist in außerordentlich großer Anzahl und sehr wechselnder Größe, teils der Haut flach aufsitzend, teils aber auch gestielt, oder in beutelartigen Hautfalten eingelagert vor (Fig. 157). Nach Schwund des Inhalts kann die leere Hauttasche zurückbleiben. Die Haut zieht entweder unverändert über die Geschwülste hinweg oder weist erweiterte Gefäße oder Drüsenausführungsgänge auf. Durch Wachstum können diese Tumoren eine exzessive Größe erreichen und schließlich an der Oberfläche ulzerieren. Außer den beschriebenen Tumoren gehören zum Bilde der Neurofibromatosis, auch Recklinghausensche Krankheit genannt, Pigmentierungen, die in Form multipler Naevi zwischen den, bei tieferem Sitz bläulich durchscheinenden Hautfibromen sich finden oder flächenhafte Verfärbungen bilden, sowie nicht selten psychische Störungen, die aber auch fehlen können. Von subjektiven Beschwerden sind heftige Schmerzen zu erwähnen. Bemerkenswert ist ferner, daß sarkomatöse Entartungen vorkommen. Die durch die Tumoren hervorgerufene Entstellung kann sehr hohe Grade erreichen.

Die **Diagnose** dürfte kaum auf Schwierigkeiten stoßen.

Die **Prognose** ist abgesehen von der Umwandlung in maligne Geschwülste eine günstige, doch ist eine spontane Rückbildung und damit Verschwinden der Entstellung und Beschwerden kaum zu erwarten.

Die **Therapie** ist eine rein chirurgische und wird sich auf die Entfernung der größten und störendsten Geschwülste beschränken.

## Dermatomyoma multiplex.

Tafel 96.

Eine ziemlich seltene Erkrankung stellen die meist an den Extremitäten lokalisierten **multiplen Dermatomyome** dar, die in der Regel aus den glatten

---

Anm. 157. Moulage der Lassarschen Klinik in Berlin (Kasten).

Anm. 158. Moulage aus der Klientel von Prof. Touton in Wiesbaden.