

Fünfte Familie.

Geometridae. Spanner.

Die Schmetterlinge fliegen in der Dämmerung und in der Nacht, in der Ruhe halten sie die Flügel flach ausgebreitet, nur einige Arten dachförmig. Die Raupen der meisten Arten haben 10 Füße, nur wenige andere Arten haben 12 oder 14 Füße; ihr Gang ist gekrümmt, in der Ruhe halten sie sich nur mit den Hinterfüßen, während dann der Körper lang und steif gestreckt ist, wodurch sie oft kleinen Zweigen oder Blattstielen täuschend ähnlich sehen.

Pseudoterpna, H. S.

1. *Pruinata*, Hufn. Nicht selten, im Juli und August. Im Mai und Juni an Ginster (*Genista*) und Besenpfrieme (*Spartium scoparium*).

Geometra, L.

1. *Papilionaria*, L. Nicht selten, im Juni, Juli. Vom Herbst bis Juni an Birken, Buchen, Erlen u. s. w.

2. *Vernaria*, L. Selten, im Mai und Juni. Im August an Waldrebe (*Clematis vitalba*) u. s. w.

Phorodesma, Boisd.

1. *Pustulata*, Hufn. Ziemlich selten, im Juni, Juli. Im Mai an Eichen.

Nemoria, Hübn.

1. *Porrinata*, Zell. Selten, im Mai, Juni und August. Im Juni und September an Haselstauden, Weißdorn u. s. w.

2. *Fimbriata*, Hufn. Nicht häufig, im Juli, August. Im Juli, August an Eichen und Haselstauden.

Thalera, Hübn.

1. *Thymiaria*, L. Selten, im Juli und August. Im Mai und Juni an Schafgarbe (*Achillea*) und Thymian (*Thymus serpyllum*).

Jodis, Hübn.

1. *Putataria*, L. Nicht selten, im Mai und Juni, wo Heidelbeersträucher wachsen. Im Juni, Juli an Heidelbeersträuchern. Putata, St.

2. *Lactearia*, L. Häufig, im Juni und Juli. Raupe im Herbst an Erlen und Heidelbeersträuchern.

Acidalia, Tr.

Die Falter der meisten Arten haben 2 Generationen. Die Raupen überwintern und leben im Frühjahr an niederen Pflanzen, die meisten Arten lassen sich mit welchem Salat füttern. Verpuppung in einem leichten Gewebe.

1. *Trilinearia*, Borkh. Häufig, im Mai und wieder im Juli, August. Raupe im Juni, Juli und im Herbst bis April an Eichen, Buchen u. s. w.

2. *Virgularia*, Hübn. Häufig, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni und im Herbst bis April an niederen Pflanzen.

3. *Pallidata*, W. V. Bismlich selten, im Mai und Juni. Raupe mir unbekannt.

4. *Bisetata*, Hufn. Bismlich selten, im Juli und August. Raupe bis April an welchen Pflanzen.

5. *Dilutaria*, Hübn. Selten, im Juni und Juli. Raupe bis Mai an Moos.

6. *Aversata*, L. Häufig, im Mai, Juni und wieder im August, September. Raupe im Juli und vom Herbst bis April an welchem Laube.

Abart Spoliata, nicht selten.

7. *Emarginata*, L. Nicht häufig, im Juni bis August. Raupe vom Herbst bis Juni an niederen Pflanzen.

8. *Immorata*, L. Häufig, im Juni, Juli. Raupe bis Mai an niederen Pflanzen.

9. *Remutata*, W. V. Nicht selten, im Mai bis August. Raupe bis April an niederen Pflanzen.

Zonosoma, Led.

1. *Pendularia*, L. Ziemlich selten, im Frühling und Sommer. Raupe im Juni, Juli und wieder im Herbst an Birken, Eichen, Erlen u. f. w.

2. *Orbicularia*, Hübn. Selten, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni, Juli und Herbst an niederen Pflanzen.

3. *Annotata*, Schulz. Häufig, im Mai, Juli, August. Raupe im Juni, Juli und Herbst an Laubholz und niederen Pflanzen.

4. *Punctaria*, L. Nicht selten, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni, Juli und Herbst an Eichen und Birken.

Timandra, Boisd.

1. *Amataria*, L. Nicht selten, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni und Herbst an Melde (*Atriplex*) und Ampfer.

Abraxas, Leach.

1. *Grossulariata*, L. Harlequin. Häufig, im Juli, August. Raupe im Mai und Juni an Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern.

2. *Ulmata*, W. V. Sehr selten, im Juni und Juli. Raupe im August und September an Ulmen und Traubeneichen. Den Schmetterling habe ich nur einmal angetroffen im Garten bei der Schule in Wendlinghausen. *Sylvata*, St.

3. *Adustata*, W. V. Nicht häufig, im Mai bis Juli. Raupe im August und September an Spindelbaum (*Evonymus europaeus*).

4. *Marginata*, L. Häufig, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni und September an Haselnuß, Pappeln, Weiden u.

Bapta, Steph.

1. *Pictaria*, Curt. Selten, im März bis Mai, fliegt oft Abends an den Kästchen der Sahlweiden. Raupe im Juni und Juli an Eichen und Schlehen.

2. *Bimaculata*, Fabr. Nicht häufig, im Mai und Juni. Raupe vom Juni bis August an Pappeln und Weiden.

3. *Temerata*, W. V. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im Juli, August an Weiden, Erlen, Birken u. f. w.

Cabera, Tr.

1. *Pusaria*, L. Häufig, vom Mai bis Juli. Raupe im Juli bis September an Birken, Erlen, Haselnuß.

2. *Exanthemaria*, Scop. Häufig, von Mai bis Juli. Raupe vom Juli bis September an Birken und Erlen.

Numeria, Dup.

1. Pulveraria, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im Juli, August an Weiden.

Ellopiä, Tr.

1. Fasciaria, L. Häufig, im Juli, August. Raupe 12füßig, im April, Mai an Nadelholz. Prosapiaria, St.

Var. Prasinaria, Hübn. Seltener wie Fasciaria.

Metrocampa, Latr.

1. Margaritaria, L. Nicht selten, im April und Juli. Raupe im Juli und Herbst an Eichen, Buchen u. f. w. Die Raupe 12füßig und in den Seiten gefranzt.

Eugonia, Hübn.

1. Alniaria, L. Nicht selten, im September, October. Raupe im Juni und Juli an Schlehen, Apfelbäumen, Espen, Erlen u. f. w. Autumnaria, St.

2. Angularia, W. V. Häufig, im Sommer und Herbst. Raupe vom Juni bis September an Eichen, Linden u. f. w.

3. Quercinaria, Hufn. Häufig, vom Juli bis October. Raupe vom Juni bis September an Eichen.

4. Fuscantaria, Haw. Bei Horn nicht eben selten, im September. Ich fand den Schmetterling und auch die Raupe mehreremale auf dem Schützenplatze und auch bei der Friedenseiche. Raupe im Juni und Juli an Eichen.

5. Canaria, L. Nicht selten, im August und September. Raupe im Mai und Juni an Linden, Birken und auch an Eichen. Tiliaria, Tr.

Selenia, Hübn.

Alle vier Arten haben zwei Generationen.

1. Tetralunaria, Hufn. Nicht selten, im Mai und Juli, August. Raupe vom Juli bis September an Birken, Eichen, Schlehen, Rosen u. f. w. Illustraria, Tr.

2. Lunaria, W. V. Nicht häufig, im Mai, Juli und August. Raupe vom Juli bis October an Schlehen.

3. Delunaria, Hübn. Ziemlich selten, im Mai, Juli und August. Raupe vom Juli bis October an Schlehen.

4. Illunaria, Esp. Häufig, im Mai, Juli und August. Raupe im Juli, August, September an Erlen, Weiden u. f. w.

Pericallia, Steph.

1. *Syringia*, L. Nicht selten, im Mai, Juli und August. Raupe im Juni und August, September an Flieder (*Syringa vulgaris*), Hartriegel, Heckenfirsche u. f. w.

Therapis, Hübn.

1. *Evonymaria*, W. V. Nicht häufig, im Juli, August. Raupe im Mai an Spindelbaum (*Evonymus europaeus*)

Odontopera, Steph.

1. *Bidentata*, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe 14füßig, im August und September an Pappeln, Schlehen u. f. w.

Himeria, Dup.

1. *Pennaria*, L. Häufig, im September, October. Raupe mit zwei Spitzen auf dem ersten Segmente, im Mai und Juni an Obstbäumen, Birken, Weiden u. f. w.

Crocallis, Tr.

1. *Elinguaria*, L. Häufig, im Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Weiden, Eichen, Schlehen u. f. w.

Eurymene, Dup.

1. *Dolabraria*, L. Häufig, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni und Herbst an Eichen, Buchen, Linden u. f. w. Der Schmetterling oft an Baumstämmen.

Angerona, Dup.

1. *Prunaria*, L. Häufig, im Juni, Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Schlehen, Hainbuchen u. f. w.

Var. *Corylaria*. Selten, nur einmal aufgefunden.

Urapteryx, Leach.

1. *Sambucaria*, L. Nicht selten, im Juni und Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Hollunder (*Sambucus*), Gaisblatt (*Lonicera*), Linden u. f. w.

Rumia, Dup.

1. *Crataegata*, L. Häufig, im Mai Abends an Dornhecken fliegend. Raupe 14füßig, vom Herbst bis Mai an Weißdorn und Schlehen. *Luteolata*, St.

Epione, Dup.

1. *Apiciaria*, W. V. Nicht häufig, im August bis October. Raupe vom Juni bis August an Weiden und Pappeln.

2. *Advenaria*, Hübn. Nicht selten, im Mai, Juni. Raupe im Juli und August an Heidelbeersträuchern.

3. *Vespertaria*, L. Nicht häufig, im Juli, August. Raupe im Mai, Juni an Birken, Eichen u. f. w. *Parallelaria*, St.

Venilia, Dup.

1. *Macularia*, L. Häufig, im Mai und Juni. Raupe vom Herbst bis April an Laubnessel.

Macaria, Curt.

1. *Notata*, L. Nicht häufig, im Mai und Juli. Raupe im Juni, August und September an Weiden und Birken.

2. *Alternata*, W. V. Nicht selten, im Mai und Juli. Raupe im Juni, August und September an Nadelhölzern.

3. *Signaria*, Hübn. Nicht häufig, im Mai und Juli. Raupe im Juni, August und September an Nadelholz.

4. *Liturata* Hübn. Nicht selten, im Mai und Juli. Raupe im Juni, August und September an Nadelholz.

Hibernia, Latr.

Die weiblichen Schmetterlinge mit ganz kleinen Flügelstumpfen.

1. *Rupicapraria*, W. V. Ziemlich selten, im März, April. Raupe im Mai, Juni an Laubholz.

2. *Bajaria*, W. V. Nicht selten, im Herbst. Raupe im Mai, Juni an Laubholz.

3. *Leucophaearia*, W. V. Häufig, im März und April. Raupe im Mai, Juni an Eichen.

4. *Aurantaria*, Esp Häufig, im Herbst. Raupe im Mai und Juni an Laubholz.

5. *Progemmaria*, Hübn. Recht häufig, im Herbst. Raupe im Mai und Juni an Laubholz. *Marginaria*, St.

6. *Defoliaria*, L. Häufig, im October und November. Das Weibchen ist ganz ungeflügelt. Raupe im Mai und Juni an Laubholz.

Anisopteryx, Steph.

1. *Aceraria*, W. V. Nicht selten, im November. Das Weibchen dieser wie der folgenden Art mit nur halbsolangen Flügeln wie das Männchen. Raupe im Juni und Juli an Laubholz.

2. *Aescularia*, W. V. Häufig, im März, April. Raupe im Mai, Juni an Laubholz.

Phigalia, St.

1. *Pilosarius*, W. V. Häufig, im März, April. Das Weibchen mit ganz kurzen Flügeln. Raupe im Juni, Juli an Birken, Eichen, Erlen u. f. w. *Pedaria*, St.

Biston, Leach.

1. Hispidarius, W. V. Selten, im März und April. Das Weibchen mit ganz kurzen Flügelstumpfen. Raupe im Juni und Juli an Birken, Eichen u. f. w.

2. Hirtarius, L. Nicht selten, im März und April. Raupe im Juli bis September an Laubholz.

3. Stratarius, Hufn. Nicht selten, im Frühjahr. Raupe im Herbst an Laubholz.

Amphidasis, Tr.

1. Betularia, L. Birkenspanner. Häufig, im Mai, Juni. Raupe vom Juli bis Oktober an Laubholz, besonders an Birken.

Boarmia, Tr.

1. Cinetaria, W. V. Nicht häufig, im April und Mai. Raupe im Juni und Juli an Beifuß (Artemisia), Hartheu (Hypericum) u. f. w.

2. Rhomboidaria, W. V. Nicht selten, im Juli, August. Raupe im April und Mai an Schlehen und Obstbäumen. Gemmaria, St.

3. Secundaria, W. V. Ziemlich selten, im Juni bis August. Raupe vom Herbst bis Mai an Fichten.

4. Abietaria, W. V. Selten, im Juni, Juli. Raupe im Frühjahr an Birken, Weiden, Eichen u. f. w.

5. Repandata, L. Nicht selten, im Juni, Juli. Raupe im Mai und Juni an Laubholz.

6. Roboraria, Fabr. Der größte der Gattung, nicht selten, im Juni und Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Eichen.

7. Consortaria, Fabr. Häufig, im April und Mai und wieder im August. Raupe im Mai und Juli an Laubholz.

8. Lichenaria, Hufn. Nicht selten, im Juli und August. Raupe im Mai und Juni an Baumflechten.

9. Viduata, W. V. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im Herbst an Baumflechten.

10. Crepuscularia, W. V. Häufig, im April, Mai und im Juli, August. Raupe im Juni und Herbst an Obstbäumen und Weiden.

11. Consonaria, Hübn. Nicht häufig, im April und Mai. Raupe im August, September an Birken, Linden u. f. w.

12. Extersaria, Hübn. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im August, September an Erlen, Haselnuß u. f. w. Luridata, St.

13. *Punctulata*, W. V. Häufig, im Mai und Juni. Raupe vom Juli bis October an Birken und Erlen.

Thephronia, Hübn.

1. *Sepiaria*, Hufn. Ziemlich selten, im Juli und August. Raupe im Juni an Flechten.

Gnophos, Tr.

1. *Obscurata*, W. V. Ziemlich selten, im Juni und Juli. Raupe im April, Mai an Brombeeren, Beifuß (*Artemisia*).

2. *Dilucidaria*, W. V. Nicht eben selten, im Juli und August. Raupe vom Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.

Fidonia, Tr.

1. *Fasciolaria*, Hufn. Nicht häufig, im Mai und im Juli, August. Raupe im Juni, Juli und Herbst an Beifuß (*Artemisia*).

2. *Roraria*, Fabr. Selten, im Mai und Juni. Raupe im August, September an Hartheu und Besenpfrieme.

Ematurga, St.

1. *Atomaria*, L. Häufig, im Mai und vom Juli bis Herbst, auf Heide fliegend. Raupe im Juni und Herbst an Heide, Birken, Erlen u. f. w.

Bupalus, St.

1. *Piniarius*, L. Häufig, im Mai und Juni. Raupe vom Herbst bis October an Föhren (Kiefern).

Halia, St.

1. *Wawaria*, L. Nicht häufig, im Juni. Raupe im August und September an Stachelbeersträuchern.

2. *Brunneata*, Thunb. Nicht selten, im Mai. Raupe im Juni, Juli an Heidelbeersträuchern.

Diastictis, Hübn.

1. *Artesiaria*, Fabr. Selten, im Juni bis August. Raupe im Mai und Juni an Weiden.

Phasiane, Dup.

1. *Petraria*, Hübn. Selten, im Mai und Juni. Raupe im Sommer an Farnkraut (*Pteris aquilina*).

2. *Clathrata*, L. Gemein, im Mai, Juni und August, am Tage auf Esparsette fliegend. Raupe im Juni und Herbst an Kleearten.

Scoria, Steph.

1. Dealbata, L. Nicht häufig, im Juni und Juli. Raupe im Mai, Juni an Hartheu (Hypericum). Lineata, St.

Lythria, Hübn.

1. Purpuraria, L. Nicht selten, im Mai bis August an den grasigen Stellen am Fuße des Kleinen Rigi. Raupe im Sommer an Ampfer.

Ortholitha, Hübn.

1. Luridata, Huf. Häufig, im Juni, Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Heide und Klee. Plumbaria, St.

2. Chenopodiata, L. Häufig, im Juli bis August. Raupe vom Herbst bis Mai an Gras, Klee u. f. w.

3. Moeniararia, Scop. Nicht häufig, im Juli und August. Raupe vom Herbst bis Mai an Ginster und Besenpfrieme.

4. Bipunctaria, W. V. Nicht selten, im Juni, August. Raupe vom Herbst bis Mai an Gras, Klee u. f. w.

5. Comitata, L. Nicht häufig, im Juni bis August. Raupe im Herbst an Gänsefuß (Chenopodium).

Minoa, Boisd.

1. Fuscata, Hufn. Ziemlich selten, im Juni, Juli und September. Raupe im Juli und Herbst an Wolfsmilch.

Odezia, Boisd.

1. Chaerophyllata, L. Ziemlich selten, im Juni, Juli. Raupe im Mai an Kälberkropf (Chaerophyllum) u. Atrata, St.

Anaitis, Boisd.

1. Plagiata, L. Ziemlich selten, im Juni bis September. Raupe vom Mai bis Juli an Hartheu (Hypericum).

2. Cassiata, Tr. Selten, im Juni, Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an Hartheu. Praeformata, Hübn.

Chesias, Tr.

1. Spartiata, Füssl. Selten, im Herbst. Raupe im Mai und Juni an Hartheu und Besenpfrieme.

2. Griseata, W. V. Selten, im Mai. Raupe im Juni und Juli an Raute ((Sisymbrium sophia) u. f. w.

Lobophora, Curt.

1. Carpinata, Bork. Nicht selten, im April und Mai. Raupe im Juli, August an Weiden und Pappeln.

2. Halterata, Hufn. Ziemlich selten, im April und Mai. Raupe im Herbst an Weiden, Pappeln, Eichen u. f. w.

Cheimatobia, Steph.

Die Weibchen sind flügellos.

1. Brumata, L. Frostspanner. Häufig, an Hecken und Bäumen im October bis Dezember. Raupe im Mai an Obstbäumen, oft schädlich.

2. Boreata, Hübn. Häufig, in Waldungen im October, November. Raupe im Mai, Juni an Birken, Sahlweiden und vielen anderen Laubhölzern.

Triphosa, Steph.

1. Dubitata, L. Nicht selten, im April, Mai und Juli, August. Raupe im Juni und Herbst an Schlehen u. f. w.

Eucosmia, Steph.

1. Certata, Hübn. Häufig, im Mai. Raupe im Juni und Juli an Sauerdorn (*Berberis vulgaris*).

2. Undulata, L. Nicht selten, im Juni, in Waldungen. Raupe im Herbst an Sahlweiden, Weiden u. f. w.

Scotosia, Steph.

1. Badiata, W. V. Häufig, im April, Mai. Raupe im Juni, Juli an wilden Rosen.

2. Vetulata, W. V. Ziemlich selten, im Juni, Juli. Raupe im Mai und Juni an Wegeboden (*Rhamnus frangula*), zwischen zusammengekommenen Blättern.

Lygris, Led.

1. Prunata, L. Häufig, im Juli, August. Raupe im Mai und Juni an Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern, auch an Schlehen.

2. Testata, L. Ziemlich selten, im Juli bis September. Raupe im Mai, Juni an Pappeln, Eichen u. f. w.

3. Populata, W. V. Häufig, im Juli, August. Raupe im Mai, Juni an Heidelbeersträuchern.

Cidaria, St.

1. Silacea, Hübn. Nicht häufig, im Mai, Juni. Raupe im Juli und September an Weiden (*Epilobium*).

2. Capitata, H. S. Selten, im Juni, August. Raupe im Juni und September an Taubnesseln und Balsaminen.

3. Suffumata, W. V. Nicht häufig, im April und Mai. Raupe im Juli an Labkraut (Galium).

4. Fulvata, Forst. Nicht selten, im Juli und August. Raupe im Mai an Rosen u. f. w.

5. Variata, W. V. Häufig, vom Juli bis August. Raupe im April, Mai an Nadelholz.

6. Juniperata, L. Nicht eben selten, im October, November. Raupe im Juli, August an Wachholder.

7. Corylata, Thun. Ziemlich selten, im Juni, Juli. Raupe im September an Schlehen, Linden u. f. w.

8. Truncata, Hufn. Häufig, im Mai bis Herbst. Raupe im April, Mai und Juli an niederen Pflanzen.

9. Viridaria, Fabr. Nicht selten, im Juni und Juli. Raupe im Mai an Labkraut.

10. Galiata, W. V. Nicht selten, im Juni und August. Raupe im Mai und im Juli an Labkraut.

11. Unangulata, Haw. Selten, im Juni und Juli. Raupe mir unbekannt.

12. Sociata, Borkh. Nicht selten, vom Mai bis Juli. Raupe im Juli, August an Labkraut.

13. Montanata, W. V. Häufig, im Mai bis Juli. Raupe vom Herbst bis Mai an niederen Pflanzen.

14. Ferrugata, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im Juni und Herbst an Labkraut (Galium).

15. Ocellata, L. Häufig, im Juli, August. Raupe im Mai an Labkraut.

16. Biriviata, Borkh. Nicht häufig, im April und Mai. Raupe im August an Balsaminen und Taubnesseln. Quadri-fasciata, St.

17. Berberata, W. V. Nicht häufig, im Mai und August. Raupe im Juni und Herbst an Berberitzen (Berberis vulgaris) zc.

18. Molluginata, Hübn. Nicht häufig, im Juni, August. Raupe im Juni und September an Labkraut.

19. Fluctuata. Häufig, vom Mai bis August. Raupe im Sommer und Herbst an Meerrettig (Cochlearia).

20. Bicolorata, Hufn. Ziemlich selten, im Juli, August. Raupe im Mai und Juni an Erlen u. f. w.

21. *Siterata*, Hufn. Nicht selten, vom Herbst bis Mai. Raupe im Juni und Juli an Rosen u. f. w.

22. *Bilineata*, L. Häufig, vom Juni bis August. Raupe im April und Mai an niederen Pflanzen.

23. *Tristata*, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im Herbst an niederen Pflanzen.

24. *Hastata*, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im August an Birken, Erlen u. f. w.

25. *Albicillata*, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im August und September an Brombeer- und Himbeersträuchern.

26. *Didymata*, L. Ziemlich selten, im Juli und August. Raupe im Mai, Juni an Heidelbeersträuchern und niederen Pflanzen.

27. *Vespertata*, Hübn. Selten, im Juni und August. Raupe mir unbekannt.

28. *Dilatata*, W. V. Häufig, vom Herbst bis April. Raupe im Mai an Laubholz. Im Herbst 1882 waren auf dem Barnack an fast jedem Baume 20 bis 40 Stück dieser Schmetterlinge zu finden.

29. *Niveata*, Steph. Ziemlich selten, im Juni. Raupe im Juli und August in den Kapseln des Hahnenkamms (*Rhinanthus minor*) u. f. w. *Albulata*, Tr.

30. *Albulata*, Hufn. Häufig, im Mai und Juni. Raupe im Herbst an Buchen und Hainbuchen. *Candidata*, H. S.

31. *Luteata*, W. V. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe mir unbekannt.

32. *Obliterata*, Hufn. Häufig, vom Juni bis August. Raupe im Herbst an Birken und Erlen.

Eupithecia, Curt.

1. *Insigniata*, Hübn. Selten, im April und Mai. Raupe im Juni an Obstbäumen und Schlehen.

2. *Succenturiata*, L. Nicht selten, im Mai und Juni. Raupe im August und September an Beifuß.

3. *Satyrata*, Hübn. Häufig, im Mai und Juni. Raupe im Juli und August an Labkraut.

4. *Plumbeolata*, Haw. Nicht selten im Mai und Juni. Raupe mir unbekannt.

5. *Trisignaria*, H. S. Selten, im Mai und Juni. Raupe im August und September an Bärenklau (*Heracleum spondylium*), Haarstrang (*Peucedanum*) u. f. w.

6. *Pimpinellata*, Hübn. Selten, im August. Raupe im September, October an Biebrnell (*Pimpinella saxifraga*).

7. *Nanata*, Hübn. Häufig, im Mai und Juni. Raupe im Juni bis September an Heide.

8. *Sobrinata*, Hübn. Selten, im September. Raupe im Mai an Wachholder.

9. *Pusillata*, W. V. Nicht selten, im Mai. Raupe im Juli an Nadelholz.

10. *Rectangulata*, L. Häufig, im Juni. Raupe im Mai an Obstbäumen, oft schädlich.

