

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Traité descriptif des maladies de la peau

symptomatologie et anatomie pathologique

Atlas de 54 planches - comprenant 212 dessins ... un texte explicatif

Leloir, Henry

Paris, 1889

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1615

PLANCHE XIII ÉRYTHÈME POLYMORPHE.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519)

PLANCHE XIII

ÉRYTHÈME POLYMORPHE.

Les figures de cette planche représentent les lésions histologiques de l'érythème polymorphe maculo-papuleux.

Ces préparations proviennent de lambeaux cutanés excisés sur le vivant, au niveau de la face dorsale de l'avant-bras, chez un homme de vingt-deux ans atteint d'érythème maculo-papuleux et papuleux.

Durcissement dans l'alcool absolu. Coloration au picro-carminate d'ammoniaque.

L'on peut constater dans ces figures que la lésion dermique de l'érythème polymorphe est constituée d'une façon générale par une hyperhémie œdémateuse siégeant surtout dans la moitié supérieure du derme, mais envahissant aussi les parties profondes de celui-ci. L'on remarquera en outre que cette hyperhémie œdémateuse est surtout accentuée autour des glandes cutanées et des vaisseaux sanguins. Ces préparations ont été présentées en 1884, par l'un de nous, à la Société anatomique. (H. Leloir, *Recherches sur l'anatomie pathologique des érythèmes et de l'érythème polymorphe en particulier*. — 4 avril 1884.)

Fig. 1.

coupe d'érythème maculo-papuleux. Grossissement 25 diamètres.
e, épiderme (corps muqueux de Malpighi). — On remarquera l'absence de la couche granuleuse et la disparition presque totale de la couche cornée.
d, région supérieure du derme. A ce niveau, le derme est infiltré de leucocytes et de quelques globules rouges extravasés.
v, v, vaisseaux sanguins dilatés et entourés de manchons de cellules lymphatiques.
f, follicule pileux.
s, u, glande sébacée infiltrée et entourée d'une grande quantité de cellules lymphatiques.
i, infiltrat de cellules lymphatiques.
l, lacune lymphatique fortement dilatée.
s, glomérule d'une glande sudoripare coupé transversalement, au niveau et autour duquel le tissu conjonctif cutané présente des signes d'hyperhémie œdémateuse notable et est infiltré d'une grande quantité de cellules lymphatiques.

Fig. 2.

Un point de la coupe précédente examiné à un grossissement de 300 diamètres, là où il persistait encore un vestige de la couche granuleuse.

c, couche cornée.
g, couche granuleuse réduite à une rangée de cellules, peu riches relativement en éléidine.
m, corps de Malpighi.
v, v, cellules lymphatiques migratrices qui ont envahi le corps de Malpighi.
p, couche des cellules perpendiculaires.
c, vaisseau papillaire dilaté.
n, cellules lymphatiques qui entourent ce vaisseau.
d, amas de cellules lymphatiques.
f, lacune lymphatique dilatée.
l, lacune lymphatique très dilatée et renfermant une grosse cellule endothéliale gonflée.

Fig. 1.





Fig. 2.

A. Karmanski ad nat. del. et lith.

Paris, G. Masson,

Imp. Lemerrier & Co. Paris.




PLANCHE XIV

ERYTHÈME POLYMORPHE.

Ces préparations ont été présentées en 1884 par l'un de nous à la Société anatomique (Voir H. Leloir : *Recherches sur l'anatomie pathologique des érythèmes et de l'érythème polymorphe en particulier*. — Bulletins de la Société anatomique, 4 avril 1884.)

Fig. 1.

Cette figure représente une préparation d'érythème polymorphe maculo-papuleux. Le lambeau cutané malade a été recueilli sur la jambe d'un sujet vivant et plongé aussitôt dans une solution d'acide osmique à 1 p. 100. Puis il a été durci dans l'alcool absolu. Grossissement 60 diamètres.

On y remarquera : la dilatation considérable des vaisseaux sanguins du derme et l'infiltration abondante de globules blancs qui existe autour d'eux, la dilatation des espaces lymphatiques du derme.

c, couche cornée.

m, corps de Malpighi.

p, p, vaisseaux papillaires dilatés et entourés de cellules lymphatiques.

v, v, vaisseaux dilatés et entourés de manchons de cellules lymphatiques.

g, amas de cellules lymphatiques suivant le trajet d'un vaisseau.

Fig. 2.

Cette figure représente une préparation d'érythème polymorphe papulo-vésiculeux au début. Le lambeau cutané malade a été recueilli sur le bras d'un sujet vivant et plongé aussitôt dans l'alcool absolu. Grossissement 300 diamètres.

On y remarquera : le grand amincissement de la couche granuleuse, le début de l'altération cavitaire au niveau de la plupart des cellules malpighiennes, l'infiltration du corps de Malpighi par de nombreuses cellules migratrices, l'infiltration des couches supérieures du derme par de nombreuses cellules lymphatiques.

c, couche cornée.

g, couche granuleuse réduite à une seule rangée de cellules espacées.

m, corps de Malpighi dont la plupart des cellules sont atteintes du début de l'altération cavitaire.

l, l, cellules lymphatiques migratrices situées entre les cellules du corps de Malpighi.

p, couche des cellules perpendiculaires.

l', cellule lymphatique en train de pénétrer dans l'épiderme entre deux cellules perpendiculaires.

d, couche papillaire du derme infiltrée d'une petite quantité de cellules lymphatiques.

i, infiltration abondante de cellules lymphatiques dans la couche supérieure du derme.