

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Traité descriptif des maladies de la peau

symptomatologie et anatomie pathologique

Atlas de 54 planches - comprenant 212 dessins ... un texte explicatif

Leloir, Henry

Paris, 1889

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1615

PLANCHE XVI FAVUS.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519)

PLANCHE XVI

FAVUS.

Fig. 1.

Cette figure représente une coupe de favus du cuir chevelu passant au milieu d'un godet favique. Le lambeau cutané a été recueilli aussitôt après la mort chez un enfant de 10 ans, et plongé dans l'alcool absolu. Coloration à l'hématoxyline. Grossissement 50 diamètres.

On y remarquera : la dilatation énorme du follicule pileux par le godet favique ; l'infiltration par de nombreuses cellules embryonnaires du derme ambiant irrité ; la propagation de l'irritation et de l'infiltration de cellules embryonnaires jusque dans l'hypoderme ; la pénétration du champignon favique dans l'épaisseur du derme.

c, couche cornée de l'épiderme.

g, couche granuleuse.

m, corps de Malpighi.

d, derme.

i, i, infiltration de cellules embryonnaires dans le derme.

h, tissu adipeux de l'hypoderme.

p, poil situé dans un follicule pileux coupé obliquement. A un fort grossissement l'on constate au niveau de ce poil de nombreuses spores qui n'ont pas été bien figurées dans cette planche.

b, pointe que le godet favique envoie dans le follicule pileux.

e, paroi externe du godet favique, surtout constituée par des tubes de mycélium.

t, région du godet favique surtout constituée par des tubes sporifères.

s, région du godet favique surtout constituée par des spores.

*F*³, point du derme envahi par le champignon favique qui a été représenté dans la figure 3.

*F*⁴, point du derme envahi par le champignon favique qui a été représenté dans la figure 4.

Fig. 2.

Cette figure représente une section de follicule pileux siégeant profondément dans le derme, étudiée au niveau d'une coupe provenant du lambeau cutané malade dans lequel a été faite la préparation de la figure 1. Grossissement 400 diamètres.

On y remarquera : les spores du champignon favique au niveau du poil ; les cellules migratrices nombreuses qui pénètrent les cellules épidermiques de la couche malpighienne du follicule pileux.

p, poil et spores faviques.

f, couche malpighienne du follicule pileux.

m, cellules migratrices.

d, derme et hypoderme ambiants.

Fig. 3.

Cette figure représente le point *F*² (de la préparation dessinée dans la figure 1) examiné à un grossissement de 350 diamètres.

On y remarquera : l'infiltration et la dissociation des faisceaux conjonctifs du derme par les spores du champignon favique ; l'infiltration, par des cellules embryonnaires, du tissu conjonctif irrité.

c, faisceaux du tissu conjonctif dissociés par les spores du champignon favique.
s,s spores du champignon favique.

e, cellules embryonnaires.

e' cellules embryonnaires.

f, faisceaux du tissu conjonctif.

Fig. 4.

Cette figure représente le point F⁵ (de la préparation dessinée dans la figure 1) examiné à un grossissement de 350 diamètres.

On y remarquera l'infiltration et la dissociation des faisceaux conjonctifs du derme par les spores du champignon favique ; l'infiltration, par des cellules embryonnaires, du tissu conjonctif irrité.

t, faisceaux de tissu de conjonctif.


s,s, spores.

i, infiltration de cellules embryonnaires dans le derme.

Fig. 1.



Fig. 2.



A. Karmanski ad nat. del. et lith.

Paris, G. Masson

Fig. 3.




Fig. 4.



Imp. Lemerrier & C^{ie} Paris




PLANCHE XVII

PÉRIFOLLICULITES SUPPURÉES CONGLOMÉRÉES EN PLACARDS

Les figures de cette planche sont tirées du mémoire publié par l'un de nous en 1884 (H. Leloir, sur une variété nouvelle de perifolliculites suppurées, conglomérées en placards, *Annales de dermatologie*, 1884.)

Fig. 1.

La figure 1 représente une coupe de perifolliculites suppurées et conglomérées en placards, du dos de la main. Variété commune. Placard unique. Le lambeau cutané, excisé sur le vivant, a été immédiatement plongé dans l'alcool absolu. Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 60 diamètres.

- f*, follicule pileux légèrement dilaté et kystique, rempli d'un épithélium plus ou moins complètement kératinisé.
- c'*, couche cornée superficielle.
- c*, couche cornée inférieure renfermant quelques cellules dont le noyau et le protoplasme se colorent par le carmin.
- g*, couche granuleuse.
- m*, corps de Malpighi.
- p*, papille du derme avec son vaisseau central dilaté.
- v*, vaisseau dermique dilaté.
- d*, derme infiltré d'une grande quantité de cellules embryonnaires.

Fig. 2.

La figure 2 représente une autre coupe du placard précédent de perifolliculite conglomérée. Grossissement 25 diamètres.

- c'*, couche cornée superficielle.
- c*, couche cornée profonde renfermant des cellules encore vivaces, c'est-à-dire dont le noyau et le protoplasme se colorent encore par le carmin.
- g*, couche granuleuse.
- m*, corps de Malpighi.
- d*, derme enflammé et infiltré de cellules embryonnaires.
- f*, follicules pileux dilatés et remplis de produits épidermiques plus ou moins complètement kératinisés.
- o*, orifice dilaté d'un de ces follicules pileux.
- f'*, petit follicule pileux.
- f''*, follicule pileux dilaté et rempli de produits épidermiques.
- r*, fissure.

Fig. 3.

La figure 3 représente une coupe de perifolliculites suppurées conglomérées en placards, à tendance légèrement papillomatuse. Le lambeau cutané malade a été excisé sur l'avant-bras d'un sujet vivant, et plongé aussitôt dans l'alcool absolu. Coloration au picro-carmin. Grossissement 20 diamètres.

- f*, follicule enkysté et dilaté.
- f'*, follicule enkysté et fortement dilaté.
- f''*, follicule enkysté et dilaté qui s'est ouvert à l'extérieur.
- f'''*, follicule profond enkysté et dilaté.
- d*, derme irrité et infiltré de cellules embryonnaires.