

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Traité descriptif des maladies de la peau

symptomatologie et anatomie pathologique

Atlas de 54 planches - comprenant 212 dessins ... un texte explicatif

Leloir, Henry

Paris, 1889

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1615

PLANCHE XVIII FOLLICULITES.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519)

PLANCHE XVIII

FOLLICULITES.

Fig. 1.

La figure 1 et la figure 2 représentent les lésions histologiques de la folliculite des rattacheurs, telles qu'elles ont été décrites par l'un de nous dans son mémoire sur cette affection. (Voir H. Leloir, *De la folliculite et périfolliculite des fileurs et rattacheurs* (Bouton d'huile) — *Annales de dermatologie*, 1889.)

Les lambeaux cutanés malades ont été excisés sur le vivant et plongés dans l'alcool absolu. Coloration au picro-carmin. Grossissement, 35 diamètres.

On remarquera dans la figure 1 : l'inflammation périfolliculaire prononcée du derme ; l'altération du follicule pileux et de l'épiderme avoisinant.

c, couche cornée.

c' c' couche cornée un peu altérée desquamante.

g, couche granuleuse. — Elle disparaît totalement au niveau des régions épidermiques sus-jacentes à l'endroit où l'inflammation périfolliculaire est la plus intense.

m, corps de Malpighi.

f, gros follicule pileux altéré.

f', petit follicule pileux sain.

i, infiltration de cellules rondes abondantes autour du follicule (Inflammation périfolliculaire).

i', vaisseau dermique dilaté et entouré d'un manchon épais de cellules lymphatiques.

d, derme.

Fig. 2.

Grossissement, 35 diamètres.

On remarquera dans la figure 2 (qui représente également les lésions histologiques de la folliculite des rattacheurs), la profondeur de l'inflammation qui file vers l'hypoderme en suivant le tissu conjonctif dermique plus lâche qui existe normalement en dessous des gros follicules pileux et se continue avec celui de l'hypoderme.

c, couche cornée.

g, couche granuleuse, presque entièrement disparue au niveau des régions épidermiques sus-jacentes à l'endroit où l'inflammation périfolliculaire est la plus intense.

m, corps de Malpighi.

p, poil.

p', poil.

f, follicule pileux.

i, infiltration de cellules rondes abondantes autour du follicule — (Inflammation périfolliculaire).

i', infiltration de cellules abondantes filant de la partie profonde du follicule pileux jusque dans les régions profondes du derme.

d, derme.

GALE.

Fig. 3.

La figure 3 et la figure 4 représentent des coupes de peau d'un sujet atteint de gale croûteuse dite norvégienne, recueillies et rapportées d'un de ses voyages, par l'un de nous (Leloir). Les morceaux de peau ont été immédiatement plongés dans l'alcool absolu. Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 40 diamètres.

On y remarquera : l'abondance et l'épaisseur des croûtes ; les acares et les embryons d'acares qui se trouvent emprisonnés dans ces croûtes ; la disparition de la couche granuleuse ; l'hypertrophie des prolongements interpapillaires du corps de Malpighi ; l'inflammation des régions supérieures du derme.

c, c, croûtes.

a, acare.

a', a'', embryons d'acares.

m, corps muqueux de Malpighi.

p, p, papilles.

i, derme enflammé et infiltré de cellules embryonnaires.

Fig. 4.

Grossissement 40 diamètres.

On remarquera dans la figure 4, qui représente les lésions histologiques de la gale croûteuse dite norvégienne, l'épaisseur des croûtes remplies d'embryons d'acares.

c, c, croûtes.

c', couche cornée de l'épiderme.

a', a'', embryons d'acares.

a, a, embryons d'acares.

m, m corps muqueux de Malpighi.

p, papilles du derme légèrement enflammées.

d, derme légèrement enflammé.






PLANCHE XIX

HERPÈS ZOSTER. ICHTHYOSE.

Fig. 1.

Cette figure représente une coupe de peau de la région antérieure de la cuisse recueillie sur un sujet atteint d'ichthyose serpentine.

Coloration au moyen du picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 40/1.

On remarquera dans cette figure : l'hypertrophie de la couche cornée; l'altération d'un follicule pileux qui est rempli de masses cornées renfermant un assez grand nombre de poils follets atrophiés; la disparition de la couche granuleuse de l'épiderme; l'atrophie du corps de Malpighi; l'atrophie du tissu conjonctif des couches supérieures du derme et la persistance du tissu élastique; l'atrophie du glomérule de la glande sudoripare.

f, f, poils follets englobés dans des masses cornées.

m, corps de Malpighi.

d, derme.

e, tissu conjonctif atrophie avec tissu élastique persistant au niveau des couches supérieures du derme.

s, conduit d'une glande sudoripare.

g, glomérule sudoripare atrophie.

Fig. 2.

Cette figure représente une coupe de peau recueillie chez un sujet atteint d'ichthyose serpentine généralisée (Voy. l'obs. XV de la page 270 dans le travail de l'un de nous (Leloir) intitulé : *Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse*. Paris, 1881. Cette figure est tirée également de ce travail).

Coloration au moyen du picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 20/1.

On remarquera l'épaississement de la couche cornée en certains points; la pigmentation de la couche granuleuse de Aufhammer et de Langerhans; l'hypertrophie des papilles du derme qui donne à la coupe de peau un aspect légèrement papillomateux; la dilatation des vaisseaux papillaires; l'épaississement du derme dont les fibres élastiques paraissent moins nombreuses qu'à l'état normal; la diminution de nombre et l'atrophie des follicules pileux et des glandes sébacées.

c, couche cornée.

g, couche granuleuse.

m, corps de Malpighi.

v, vaisseau du derme.

d, derme.

Fig. 3.

La figure 3 représente un nerf cutané altéré, sous-jacent à une plaque d'herpès zoster.

Cette préparation est l'une de celles qui ont servi de base à l'un de nous (Leloir) dans ses recherches sur les affections cutanées d'origine nerveuse.

Le nerf a été traité d'après la méthode indiquée en 1881 par l'un de nous dans son travail intitulé : *Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur les affections cutanées d'origine nerveuse*. Paris, 1881. Grossissement 500/1.