

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Traité descriptif des maladies de la peau

symptomatologie et anatomie pathologique

Atlas de 54 planches - comprenant 212 dessins ... un texte explicatif

Leloir, Henry

Paris, 1889

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1615

PLANCHE XLII PURPURA.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-117519)

PLANCHE XLII

PURPURA.

Fig. 1.

Cette figure représente les lésions histologiques du purpura hemorrhagica.

Le morceau de peau a été recueilli aussitôt après la mort.

Durcissement dans l'alcool absolu après passage dans l'acide osmique.

Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 80/1.

Cette figure montre que dans le purpura hemorrhagica les hémorrhagies sont profondes, envahissent le derme moyen et le derme profond; qu'elles sont larges et diffuses; que de plus le derme, surtout au niveau de sa région supérieure et de la couche papillaire, est rempli d'une grande quantité de globules blancs sortis des vaisseaux par diapédèse.

e, épiderme.

g, *g*, globules blancs.

g', *g'*, globules blancs constituant des manchons aux vaisseaux.

h, *h*, foyers hémorrhagiques.

m, *m*, fibres musculaires de la peau.

Fig. 2.

Cette figure représente un point du derme de la préparation précédente examiné à un grossissement de 260/1.

On remarquera dans cette préparation la dissociation des faisceaux conjonctifs du derme par l'infiltration hémorrhagique.

g, *g*, foyers hémorrhagiques.

g, *g*, globules rouges isolés.

c, *c*, tissu conjonctif dermique.

Fig. 3.

Cette figure représente un point de la préparation dessinée dans la figure 1, situé au niveau d'un faisceau de nerfs cutanés. Grossissement 260/1.

On remarquera la dissociation du tissu conjonctif qui entoure les faisceaux nerveux par l'infiltration hémorrhagique et de nombreux globules blancs qui l'accompagnent. Les faisceaux nerveux eux-mêmes sont respectés.

h, *h*, infiltration hémorrhagique.

g, globules blancs.

c, tissu conjonctif.

n, *n*, faisceaux nerveux.


Fig. 3.



Fig. 2.



Fig. 1.



A. Karmanaki ad. nat. del. et lith.

Imp^{tes} Lemerle, Paris.

Paris. G. Masson.




PLANCHE XLIII

PURPURA.

Fig. 1.

Cette figure représente une coupe de purpura télangiectasique d'après une préparation qui nous a été obligeamment communiquée par M. V. Cornil. (Voir Arragon, Du purpura télangiectasique. — Thèse de Paris, 1878.)

Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement, 30/1.

On remarquera dans cette figure la dilatation considérable des vaisseaux papillaires donnant lieu à la production de foyers hémorrhagiques par distension vasculaire.

v, v, vaisseaux papillaires dilatés d'une façon excessive et gorgés de globules rouges.

m, corps de Malpighi.

d, derme rempli d'une assez grande quantité de cellules lymphatiques.

Fig. 2.

Cette figure représente une coupe de phlyctène hémorrhagique dans un cas de purpura hémorrhagique d'après une préparation qui nous a été obligeamment communiquée par M. V. Cornil. (Voir Cornil et Rigal, Note sur un cas de purpura-hémorrhagica aigu survenu chez un malade atteint d'une affection du cœur ancienne. *Société médicale des hôpitaux*, 1879.)

Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement 80/1.

On remarquera dans cette figure la phlyctène remplie de globules rouges; la dilatation considérable des vaisseaux papillaires du derme qui sont remplis de globules rouges.

c, couche cornée de l'épiderme.

m, m, corps de Malpighi.

i, i, prolongements interpapillaires épidermiques soulevés.

g, globules rouges renfermés dans la cavité de la bulle.

h, vaisseau distendu par l'hémorrhagie.

Fig. 3.

Cette figure représente une coupe de peau dans un cas de purpura hémorrhagique au voisinage d'un glomérule d'une glande sudoripare.

Durcissement dans l'alcool après passage dans l'acide picrique et la gomme.

Coloration au picro-carminate d'ammoniaque. Grossissement, 170/1.

On remarquera dans cette préparation l'obstruction d'un gros vaisseau sanguin par un coagulum fibrineux farci de globules rouges constituant un véritable infarctus hémorrhagique; l'intégrité des canaux de la glande sudoripare.

t', gaine du vaisseau sanguin dissociée par les globules rouges.

t, infarctus fibrineux et hémorrhagique obstruant la lumière du vaisseau dont l'endothélium est profondément altéré et constituant un véritable infarctus hémorrhagique.

d, derme.

h, h, hémorrhagies diffuses.

s, s, tubes de la glande sudoripare.

c, capillaires remplis de globules rouges.