

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

De rheumate praesertim corneae

Virchow, Rudolf

Berlin, 1843

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1667

Widmung

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-118441](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-118441)

V I R O

ILLUSTRISSIMO, ORNATISSIMO,
HUMANISSIMO

H. G. GRIMM,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, REGIS ARCHIATRO, MEDICORUM PRAETORIANORUM SUPREMO, INSTITUTI FRIDERICI GUILIELMI MEDICO-CHIRURGICI DIRECTORI SECUNDO, IN STATIONE NOSOCOMII CARITATIS CHIRURGICA MEDICO DIRIGENTI, ORDINIS REGII DE AQUILA RUBRA IN CLASSE TERTIA CUM LEMNISCO AC PLURIMORUM PRINCIPUM EXTERNORUM ORDINUM EQUITI ETC. ETC.

GRATI ANIMI TESSERA.

V I R O

ILLUSTRISIMO O. GRAYATISSIMO
HUMANISSIMO

H. C. GRIMM

MEDECINAE ET CHIRURGICAE DOCTOR, ACADEMIAE
PHYSICAE PRAEFATIONARIUS, SEPTIMO LECTORE
ACADEMIAE MEDICAE CHIRURGICAE DOCTOR, IN
TOME NOVOGOTIAE CARITATIS, CHIRURGICAE MEDICAE
ORDINIS REGNI DE AUSTRIA REGIAE CLASSE TERTIAE
SINGULI AC PLENISSIMI PRINCIPIS EXTENSIONIS, ORDINIS
SINGULI ET

GRATIA ET

ARGUMENTUM.

Praefatio (§. 1.), Rheumatis natura. Acre rheumaticum non acidum (§. 2.), sed albuminosum (§. 3—4.). Globulorum sanguinis imminutio bene censenda (§. 5.). Rheumatis sedes tela gelatinosa, cujus pars in adipem abit (§. 6.). Electricitas minoris momenti (§. 7.). Sanguinis corruptione irritatio localis, postremo inflammatoria (§. 8.) — Rheuma oculi, ejus species (§. 9.) et natura (§. 10—12.). — Rheuma corneae. Exponitur primum anatomia corneae: ejus epidermis (§. 13.), substantia fibrosa, humor (§. 14.), vasa sanguifera et lymphatica, nervi, conjunctio cum tunicis vicinis (§. 15.). Tum agitur de ceratorheumatis speciebus, simplici (§. 16.), inflammatoria (§. 17—18) et torpida (§. 19.). Accedit de corona rheumatica disquisitio (§. 17.). Deinde sequuntur ceratorheumatis caussae (§. 20.), decursus (§. 21.) et exitus (§. 22—27.). Exit vero aut in sanationem completam, plerumque crisis supplementariis (§. 22.), aut in incompletam, orientibus obscurationibus, ulcerationibus (§. 23), pseudocrisibus vel metastasibus (§. 24—27.), aut in alios morbos (§. 28.). Pseudocrisis exsudatis fiunt vel hydropico, vel albuminoso, ex