

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Die Tuberkulose

Cornet, Georg

1907

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1958 -2-

Titelblatt

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-129189](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-129189)

DIE TUBERKULOSE.

VON

PROF. D^R. G. CORNET

BERLIN UND REICHENHALL.

ZWEITE, VOLLSTÄNDIG UMGEARBEITETE UND IM UMFANG
VERDOPPELTE AUFLAGE.

MIT 15 ILLUSTRATIONEN, 1 KARTE UND 5 TAFELN IN FARBENDRUCK.

II. HÄLFTE.

(SEITE 549—1442.)

RECENSIONS-EXEMPLAR

WIEN, 1907.

ALFRED HÖLDER,

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER,
BUCHHÄNDLER DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,

I., ROTENTURMSTRASSE 13.

U i VI
1958
-2-

ALLE RECHTE, INSBESONDERE AUCH DAS DER ÜBERSETZUNG, VORBEHALTEN.



II. ABSCHNITT.

Lungentuberkulose.

1. Kapitel.

Pathologische Anatomie.

Allgemeines.

Schon der äußere Anblick eines an Lungentuberkulose gestorbenen Menschen ist vielfach so typisch, daß die Diagnose prima vista zu stellen ist. Die bis zum Skelett abgemagerte Leiche, die eingefallenen Wangen, tiefliegende Augen, weitabstehende Ohren, die hervortretenden Backen- und Hüftknochen, die blasse, anämische, schlaffe, gerunzelte, faltige, oft ins Schmutziggraue gehende Haut, unter der sich die Umrisse der Knochen abzeichnen, besonders an der Brust mit Schuppen und Pityriasis versicolor bedeckt, offenbaren uns die schwere Leidensgeschichte.

Doch im Gegensatz dazu treffen wir manchmal wohlgenährte Leichen, mit reichlich entwickeltem Fettpolster, kräftiger Muskulatur, von blühendem Aussehen noch im Tode, und finden gleichwohl in den Lungen umfangreiche Zerstörungen.

Die Lungenveränderungen.

Die Veränderungen in der Lunge erfordern ein Eingehen auf ihre verschiedene Entstehungsweise.

Die Tb. der Lunge läßt sich auf hämatogene, lymphogene oder aërogene Infektion zurückführen.

Ist die Blutbahn durch den Einbruch eines im Körper bereits vorhandenen tuberkulösen Herdes mit Tb.B. übersät, so tritt, entsprechend der Menge und Verteilung der Bazillen, eine über beide Lungen disseminierte Miliartuberkulose ein und bildet eine Teilerscheinung der allgemeinen Miliartuberkulose.

Auf dem Lymphwege werden Tb.B. von benachbarten Teilen, von einem kariösen Wirbel oder einer kariösen Rippe, besonders häufig von