

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Die Tuberkulose

Cornet, Georg

1907

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1958 -2-

6. Kapitel. Prognose.

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-129189](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-129189)

6. Kapitel.

Prognose.

Für die allgemeine Prognose der Lungentuberkulose fehlen uns vorläufig noch brauchbare Unterlagen. So viel ist sicher, daß die da und dort veröffentlichten Heil- und Erfolgsstatistiken kein zuverlässiges Urteil erlauben. Liest man z. B. die Statistiken der Sanatorien, so sollte man meinen, daß die hygienisch-diätetische Tuberkulosebehandlung im Laufe der letzten Quinquennien ganz unglaubliche Fortschritte gemacht hat; denn eine Anstalt übertrifft scheinbar die andere an Heilungen und glänzenden Dauererfolgen. Zuerst war man zufrieden mit zirka 10—15% Heilungen, dann kamen Anstalten mit 30% und diese wurden von andern mit mehr als 60% überboten.

Dettweiler und Meissen haben von 731 Patienten 6·3% geheilt und 20·3% relativ geheilt, A. Spengler gibt von 297 Patienten 21% Heilung an, Mittermaier und Goldschmidt hatten von 244 schweren Fällen 81 = 32·2% geheilt, Williams 28·5% gute Erfolge, Hess 14—15% absolute und ebensoviel relative, also 28—30% Heilungen, Turban nach Manasse 21% geheilt und 26% fast geheilt = 47% und nach einer späteren Mitteilung 66·1% „Entlassungserfolg“ mit absoluter und relativer Heilung.

Es wäre natürlich verfehlt, nach den Resultaten dieses statistischen Wettrennens, das bei dem unbefangenen Sachverständigen mehr psychologisches als phthiseo-therapeutisches Interesse erweckt, die Heilungschancen in den betreffenden Orten und Anstalten zu bemessen. Wir halten von diesen Heilstatistiken überhaupt nicht viel, denn erstens ist schon die Stadieneinteilung zu verschieden und meist recht willkürlich (siehe nächste Seite), zweitens ist das Urteil über größere oder geringere Besserung auch bei aller optima fides recht subjektiv und individuell verschieden, drittens ist das Beobachtungsmaterial zu different und abhängig von den Intentionen des Arztes; denn je strenger die Auswahl der Kranken getroffen und vorgeschrittene, fieberhafte Fälle von der Aufnahme in die Anstalt ausgeschlossen, je mehr Schwerkranke noch in den letzten Lebenstagen fürsorglich nach Hause überwiesen werden (!), um so

glänzender fallen solche Statistiken aus. Endlich sind auch die Zahlen viel zu klein, als daß nicht jene Fälle, über die man nichts Weiteres erfahren hat, und das sind oft gerade die Todesfälle, nicht ganz wesentlich die Resultate korrigieren könnten.

Aber auch im einzelnen Fall ist es schwierig, bei der Schwindsucht eine annähernd sichere Prognose zu stellen, und doch ist es unendlich wichtig, sich darüber ein klares Bild zu machen. Ist doch davon abhängig, ob wir dem Kranken und den Seinigen die schweren Opfer, die eine zweckmäßige, längere Behandlung erfordert, zumuten sollen, ob wir sie nachdrücklichst verlangen müssen oder bei einem Verlorenen zu gunsten der Existenz der Familie resignieren dürfen.

Wir werden zu einem Kranken gerufen, der seit geraumer Zeit nicht unerhebliches Fieber hat, die deutlichen Zeichen einer ausgebreiteten Infiltration und die Merkmale der Konsumption an sich trägt. Er verliert das Fieber, nimmt an Gewicht zu und kann zu unserer Überraschung Jahre hindurch geheilt bleiben.

Vor 18 Jahren behandelte ich einen Kollegen, der Fieber bis 40°, Dämpfung bis zur vierten Rippe rechts vorne und rückwärts und links bis zur zweiten Rippe hatte und, weil man täglich seinen Tod befürchtete, brutalerweise aus dem Hotel ausquartiert wurde. Heute hat er eine ausgedehnte, anstrengende Praxis, ist verheiratet und betrachtet sich als geheilt.

Ein anderer Arzt erkrankte, durch seine 2 Monate vorher an Tb. gestorbene Mutter infiziert (1883), vor 23 Jahren an unbestimmten Larynxerscheinungen, nach wenigen Wochen 39·3 und manifeste Infiltration der rechten Spitze bis unter die 2. Rippe, H. bis zur Spina sc. Nach wenigen Tagen schwand das Fieber, nach 2 Monaten mittelstarke Hämoptoe, in deren Anschluß 14 Tage Fieber 39·8—40·2 mit akuter pneumonischer Verdichtung, massenhafte Tb. B. Im Frühjahr 1884 medizinisches Staatsexamen, während desselben zeitweise 39·4 und Nachtschweiße, im Sommer leichte Hämoptoe, Dämpfung auch links. 1885 Assistent mit zeitweise 12—14stündiger Arbeitszeit, trotzdem Zunahme, kein Fieber, aber noch reichlich Bazillen im verminderten Auswurf. Objektiver Befund von Ende 1885 wesentlich gebessert. Von 1887 an war und blieb Auswurf verschwunden. Seitdem den größten Teil des Jahres 14- und monatelang 18stündige Arbeitszeit. Gewicht 98 kg, Entfettungskur auf 80 kg und zweimalige Influenza (1890 und 1894) ohne Folgen. Vollkommenes Wohlbefinden.

Selbst die floride Phthise kann unter Umständen zur völligen Ausheilung kommen. Ein junger Mann beispielsweise, den ich vor 6 Jahren mit vielmonatlichem Fieber von 38—39·5°, mit schweren, rasch um sich greifenden Lungenerscheinungen, hochgradiger Macies, profusen Nachtschweißen, unzähligen Tb. B. im Auswurf behandelte, verlor sein Fieber, wurde dick und fett und ist heute, seit 4 Jahren, subjektiv gesund, verheiratet und hat gesunde Kinder. Aber wie selten sind solche Fälle!

In anderen Fällen sind die Erscheinungen der Phthise so weit zurückgegangen, daß wir eine Heilung anzunehmen berechtigt sind. Der Kranke erfreut sich eines blühenden, kräftigen Aussehens. Mit einem Male kommt eine Hämoptöe; Fieber, Bronchopneumonie schließen sich an, und nach 8—14 Tagen tritt der Tod ein.

Die nur auf die anatomische Ausdehnung der Tb. begründete schematische Stadieneinteilung von Turban u. a. läßt kein Urteil für die Prognose zu; denn der Umfang des Prozesses bildet nur einen der vielen Faktoren und nicht einmal den wichtigsten, außerdem hat ein fieberloser Tuberkulöser im 2. und selbst im 3. Stadium mit großen Kavernen nicht selten weit größere Aussicht auf Heilung als der leichte Spitzenkatarrh mit mittlerem und hohem Fieber. Siehe auch Sterling, Schneider u. a.

Die wichtigsten Faktoren für die Prognose bilden die Virulenz des Tb. B. und die individuellen körperlichen Verhältnisse des Erkrankten. Die genaue Normierung der Virulenz, die ein immer dringenderes Bedürfnis für die Beurteilung des Falles wird, läßt vorläufig noch viel zu wünschen übrig, doch sind wir auf dem Wege, hier festere Grundlagen zu gewinnen.

Von der individuellen Widerstandskraft, ihrem Wesen und ihren Komponenten, von der Fähigkeit des Körpers, die Einwirkung der Bazillen zu neutralisieren und Schutzkörper zu bilden, wissen wir, was die Tb. anlangt, vorläufig noch sehr wenig Bestimmtes.

Bei aller Würdigung der individuellen Verhältnisse müssen wir uns vor ihrer Überschätzung ebenso hüten, wie vor einer Unterschätzung. Erstere findet den prägnantesten Ausdruck in der Lehre des Nosoparasitismus. Einer seiner hervorragendsten und gemäßigtsten Vertreter, Gottstein sagt: „Verlauf und Ausgang, also diejenigen Momente, die für die Prognose und Therapie in erster Linie maßgebend sind, hängen (dagegen) ganz oder fast ausschließlich von der individuellen Konstitutionskraft ab.“ Gottstein und mit ihm Martius u. a. wollen nur für das symptomatisch-klinische Bild den spezifischen Eigenschaften des Krankheitserregers einen vielleicht überwiegenden Einfluß einräumen. Dieser Anschauung gegenüber haben uns aber die oben (Seite 56 ff.) mitgeteilten Versuche zur Evidenz gezeigt, daß Verlauf und Ausgang wenigstens häufig vorwiegend oder ausschließlich von der Virulenz abhängen. Und selbst die von Gottstein mitgeteilten Beispiele sprechen gegen seine Ansicht, denn sie zeigen Heilung trotz ihrer konstitutionellen Defekte, trotz schmalem Thorax, Magerkeit, schlechter, äußerer Lebensbedingungen etc.

Gleichwohl gibt es gewisse Kardinalpunkte, nach denen man in der Regel eine zutreffende Prognose zu stellen vermag.

Von Einfluß sind die allgemeinen Verhältnisse des Kranken.

Die Prognose ist abhängig von dem Kräftezustand des Körpers. Von Jugend auf schwache Personen — von Eltern abstammend, die zur

Zeit der Zeugung krank waren, gleichviel ob an Syphilis, Tb., Krebs oder irgend einem anderen schweren Leiden — Personen, die durch vorausgegangene oder noch bestehende Krankheiten, Typhus, Syphilis, Anämie, Diabetes, oder durch ein lockeres Leben, Exzesse in Baccho et Venere, übermäßige körperliche und geistige Anstrengungen geschwächt sind, Frauen nach häufigen Wochenbetten und Laktationen bieten im ganzen eine üblere Prognose, besonders wenn eine tiefgreifende Störung des Körpergewichtes damit einherging. Je jünger an Jahren der Kranke ist, um so schlechter ist die Prognose, namentlich beim Kinde läßt sich einer raschen Ausbreitung nur selten Einhalt tun, je älter, um so besser; erst nach dem 60. bis 70. Jahre, wenn das Fettpolster schwindet, nach Stadler für die schwer arbeitenden Volksklassen schon vom 40. bis 45. Jahre an, scheint sich die Prognose wieder zu verschlimmern. Die sogenannte hereditäre Belastung der Erwachsenen, die ja freilich nach der üblichen Feststellung nur ein vager Begriff ist, da die Eltern oft erst lange nach der Geburt des Betreffenden erkrankt sind, hat nach fast übereinstimmender Erfahrung keinen Einfluß auf die Prognose (Cornet, Turban, Weicker u. a.); wie sich die Prognose bei wirklicher Belastung (Tb. der Eltern zur Zeit der Geburt des Kindes) gestaltet, ist noch unbekannt. Eine schlechte Prognose gibt im allgemeinen die Gravidität, respektive das Puerperium (Schamelhout u. a.); wir kommen darauf bei der Therapie näher zurück.

Schwer in die Wagschale fallen die Vermögensverhältnisse des Kranken. Die erhöhten Leistungen für die Ernährung, die lange Dauer der Schonung, die gebotene Enthaltung von Arbeit, der monate- und jahrelange Aufenthalt an geeigneten Orten erfordern große Geldmittel. Und doch darf man auch bei den „Enterbten des Glückes“ nicht verzagen; gerade die Leichen der Anatomie beweisen uns täglich die Möglichkeit der Heilung.

Von wesentlichster Bedeutung ist der Charakter des Kranken. Wer es nicht gelernt hat, sein Tun und Lassen nach den Gesichtspunkten der Zuträglichkeit einzurichten, wer gewohnten und lieb gewordenen Genüssen nicht für längere Zeit entsagen will, wer sich nicht zu konzentrieren, sich nicht an eine gewisse Ordnung der Lebensweise zu gewöhnen vermag: der Indolente, der Leichtsinrige, der Zerfahrene, der Energielose, der Überängstliche und Nervöse, bietet eine weit üblere Prognose als der in sich Gefestigte, Zielbewußte und Energische, der Kopfhänger eine üblere als der Heitere. Dem bekannten Satze, daß der Mensch oft mehr an seinem Charakter als an seiner Krankheit zu grunde geht, wohnt gerade für den Phthisiker eine tiefe Wahrheit inne.

Auch die Intelligenz ist nicht ohne Einfluß; denn die lange Dauer der Krankheit stellt an den Intellekt gewisse Ansprüche, manche

Schädlichkeiten zu erkennen und zu meiden, auch wenn die führende Hand des Arztes im Augenblick fehlt.

Ein entscheidender Einfluß fällt dem Zustand der Verdauungsorgane zu. Guter Appetit, kräftige Verdauungsorgane sind eine unendlich wertvolle Hilfe für unsere therapeutischen Bestrebungen. Schlechte Esser bieten fast immer geringe Aussichten auf Stillstand der Erkrankung. Bei gestörter Verdauung leidet schon die normale Ernährung und Fettbildung. Um wieviel weniger ist ein kranker Verdauungstraktus den gesteigerten Anforderungen gewachsen, die ein phthisischer Organismus stellt, um das pathologische Defizit zu decken? Ein beschleunigter Bankrott des Körpers wird um so rascher die Folge sein, namentlich wenn Erbrechen und Durchfälle das Defizit steigern.

Was die Krankheit selbst anlangt, so gibt uns die physikalische Untersuchung für die Prognose nicht immer einen maßgebenden Anhalt. Gerade die gefährlichste Form der Ausbreitung, die miliare, entgeht uns am leichtesten. Im ganzen ist die Prognose mehr von dem bisherigen Verlauf als vom Umfang der Herde abhängig. Der Nachweis nicht zu umfangreicher Kavernen schließt Besserung und Heilung nicht aus, wenn Fieber, Abmagerung, wenn die Zeichen des Fortschreitens fehlen.

Je disseminierter die Herde, um so infauster ist die Prognose. Am günstigsten ist es, wenn der Prozeß noch auf eine Spitze beschränkt ist. Wesentlich getrübt wird die Aussicht auf Besserung durch den Übergang des Prozesses auf die andere Spitze, beunruhigend durch die Zeichen raschen Gewebszerfalls oder einer rasch sich einstellenden Infiltration, einer Bronchopneumonie. Die nächste Zeit muß dann entscheiden, ob es sich lediglich um rückbildungsfähige Pneumonien durch Proteine und Sekundärbakterien oder um einen wirklich tuberkulösen Prozeß handelt.

Die größte Wichtigkeit kommt dem Fieber¹⁾ zu. Ein afebriler Zustand, exakt festgestellt, ist fast stets ein Zeichen des Stillstandes, und der Stillstand bedeutet, wenn wir uns der Auseinandersetzung Seite 682 ff. erinnern, den Beginn der Heilung. Hingegen macht mich schon das geringe Fieber mit abendlicher Steigerung auf nur 37·4 bis 37·8° für die Zukunft des Kranken hange. Diese Erhöhungen sind ein Beweis, daß er sich auf der abschüssigen Bahn bewegt und niemand weiß, wo und wann er einen Haltepunkt findet. Je länger das Fieber besteht, je hartnäckiger es trotz Ruhe und guter Ernährung anhält, desto schlimmer die Prognose. Hin und wieder gelingt es mit eiserner Geduld nach monatelangem Bestande das Fieber zu beseitigen, z. B. hatte die von mir mehrmals erwähnte Dame über 6 Monate dauernd höhere Temperatur und

¹⁾ Wenn wir hier von der Temperaturerhöhung als *pars pro toto* sprechen, geschieht dies, weil wir die anderen Koeffizienten des Fiebers zu wenig kennen.

nahm um 58 Pfund zu, aber das sind im ganzen Ausnahmen. Entsprechend ungünstiger ist natürlich höheres Fieber, noch bedenklicher sind die steilen Kurven mit ihrer Remission bis zur subnormalen oder Kollapstemperatur, oder die *Febris continua*, die oft in rapidem Zuge den Kranken seinem Ende entgegenführt.

Die annähernd gleiche prognostische Bedeutung kommt auch dem Schweiße, insbesondere den Nachtschweißen zu.

Zunehmende Gewichtsverluste müssen stets als ein sehr bedenkliches Zeichen betrachtet werden, da sie nicht nur den Verfall anzeigen, sondern auch direkt zur Verbreitung der bazillären Prozesse beitragen (siehe Seite 684). Dauernder und stetiger Gewichtsstillstand oder -zunahme eröffnen immer einen hoffnungsfrohen Ausblick, sofern sie nicht durch Ödeme bedingt sind.

Geheilte Phthisiker zeichnen sich oft durch ein imponierendes *Embon-point* aus. Die Ursache für diese außerordentliche Fettleibigkeit suchen Roger und Garnier in funktioneller durch Sklerose erzeugte Insuffizienz der Thyreoidea (siehe Seite 620 über Basedow).

Der Husten an sich entscheidet die Prognose wenig. Doch ist intensiver Husten, der den Patienten anstrengt, die Nachtruhe stört und zu Erbrechen, Blutungen und Aspirationsherden Veranlassung geben kann, immer ein zu fürchtender Begleiter.

Dasselbe gilt vom Auswurf. Profuse Sputa müssen nicht notwendig von der Phthise selbst abhängen; doch schwächen sie durch den Säfteverlust den Organismus. Ein geringer Auswurf berechtigt allein noch nicht zu einer günstigen Prognose; denn die am meisten gefürchtete miliare Ausbreitung der Bazillen geht mit der geringsten Menge Auswurf einher. Wohl aber ist es als günstiges Zeichen anzusehen, wenn ein bisher reichlicher eitriger Auswurf spärlicher und an Formelementen ärmer wird.

Die Zahl der Bazillen ist kein zuverlässiger Maßstab für die Prognose. Zwar geben rapid erweichte Herde massenhaft Bazillen ab, hingegen die gefährlichen Miliartuberkel keine. Immerhin ist es günstig, wenn die Zahl langsam abnimmt und ihr Verschwinden durch fortgesetzte Untersuchungen sich feststellen läßt. Die Abwesenheit pathogener Sekundär-bakterien darf gleichfalls günstig beurteilt werden.

Nach Maragliano und Mircoli sollen die gracilen, schlanken Tb. B., die die Färbung nur unterbrochen aufnehmen, für günstigen Verlauf, hohen Immunitätsgrad und wirksame Abwehr sprechen. Dieselbe Angabe machten Pierry und Mandoul. Sewall will aus der größeren Säurefestigkeit auf höhere Virulenz schließen.

Blutspuren im Auswurf, geringe Blutungen von 2—3 Eßlöffeln sind an sich für den Verlauf unwesentlich, treten sie doch gerade bei der

milderen, fibrösen Phthise ziemlich häufig auf. (Siehe auch Rancoule.) Zuweilen entstehen sie im Laufe der Heilung durch Knotenzug. Sie werden also mehr gefürchtet als sie verdienen. Ja, oft verursachen sie einen heilsamen Schrecken und wirken insofern günstig, als der Kranke den Ernst der Situation begreift und sein Leben danach einrichtet. In manchen Fällen freilich rufen sie eine so tiefgehende Gemütsdepression hervor, daß daraus Schaden erwächst.

Unter Reiches günstig verlaufenen Fällen fanden sich mehr Kranke (17%) mit initialer Hämoptoe als in der Gesamtheit der Fälle (9.5%).

Reichlichere Blutungen bedeuten oft einen Wendepunkt zum Schlimmern. Die Anämie wird bedenklich gesteigert, durch tiefe Inspiration gelangt leicht Blut, mit Sputum vermisch, in gesunde Teile und leitet pneumonische Prozesse und Verkäsung ein. Durch Suffokation und akute Anämie kann selbst der Tod rasch eintreten.

Ferner fallen im ungünstigen Sinne ins Gewicht: Dyspnoe, Schlaflosigkeit und namentlich konstant beschleunigter Puls, wenn er auch ohne nervöse Veranlassung und im afebrilen Zustande über 90 Schläge in der Minute beträgt.

Besonders A. Sterling¹⁾ betont auf Grund eingehender Untersuchungen (1239 Kranke) mit Recht die Pulsbeschleunigung als infaustes Zeichen schon für das Frühstadium und plaidiert für dessen Berücksichtigung bei der Stadieneinteilung. Zu gleichen Resultaten kam Schneider an 1000 Fällen aller Stadien. (Siehe auch Behrend.)

Auch zu reichliche Menses, namentlich aber deren Zersieren und Abnahme der Libido verdüstern die Prognose.

Sehr ausgesprochene und andauernde Diazoreaktion²⁾ haben wir bereits als infaust bezeichnet (siehe Seite 449), sehr häufig ist sie der Vorbote baldigen Todes. Nach Holmgren betrug bei intensiver, konstanter Diazoreaktion die Lebensdauer maximal 6, durchschnittlich 2 Monate (siehe auch Wood, A. Widstrand).

Bernheim hält auch reichliche Phosphatausscheidung für prognostisch ungünstig.

¹⁾ Sterling irrt, wenn er glaubt, daß ich den frequenten Puls nur für vorgerücktere Stadien als ungünstig bezeichne, ich stimme vielmehr in diesem Punkte vollkommen mit dem geschätzten Kollegen überein. (Siehe auch Seite 609.)

²⁾ Ein abgekürztes Verfahren für die Diazoreaktion gibt S. Bondi an: Man bringt mit dem Glasstabe einen Tropfen Harn auf zwei übereinandergelegte Filtrierpapierstreifen, auf die gleiche Stelle einen Tropfen Ammoniak. An dem mit etwas Natriumnitrit (0.05:160) befeuchteten Glasstabe läßt man aus der Pipette vorsichtig einen Tropfen Sulfanilsäure so herabfließen, daß sie sich mit dem Natriumnitrit mischt. Ein Umkreisen der feuchten Stelle auf dem Papier mit der so erhaltenen Diazobenzolsulfosäure ruft bei Harnen mit positiver Diazoreaktion einen deutlich roten Fleck hervor, anderer Harn gibt keinen oder nur einen schwach gelben Fleck.

Thrombosen finden sich auch meist erst bei schweren Phthisen, die innerhalb einem oder einiger Monate sterben. Nach Ruge und Hierokles folgte auf Venenthrombose durchschnittlich 2—3 Wochen später der Tod.

Eine prognostische Bedeutung wird auch dem zweiten Pulmonalton zugeschrieben: Deutliche Akzentuierung spricht für einen gegen den erschwerten Lungenkreislauf kräftig ankämpfenden rechten Ventrikel; Abnahme einer bestehenden Akzentuierung neben mäßiger Dyspnöe für Freiwerden des kleinen Kreislaufes, neben zunehmender Dyspnöe für Erschöpfung des rechten Ventrikels (Smith).

In gewissen Grenzen wohnt auch dem verminderten Blutdruck ein prognostischer Wert inne (siehe Seite 610).

Arneth eröffnet die Aussicht, durch morphologische Untersuchung der mehrkernigen Neutrophilen einen Prüfstein für Prognose und Verlauf zu gewinnen (siehe Seite 598).

Ödeme als Zeichen der Herzdegeneration und der amyloiden Entartung sind meist als die Prodrome baldiger, vielleicht schon naher Auflösung anzusehen. Auch der Soor tritt meist erst in der letzten Zeit auf.

Von den tuberkulösen Komplikationen (siehe dort) sind besonders Larynx- und Darmtuberkulose von übler Vorbedeutung, doch nicht mehr wie früher als hoffnungslos zu bezeichnen; denn an beiden Organen finden wir spontan Heilungen, und am Larynx können wir sie durch rechtzeitige Eingriffe oft herbeiführen. — Die Pharynxtuberkulose darf wegen der damit verbundenen Dysphagie geradezu als Terminalerscheinung angesehen werden. — Exsudative Pleuritis bringt hin und wieder Besserung, noch öfter täuschen Pleuritis und Pneumothorax nur eine vorübergehende Besserung vor, beschleunigen aber im ganzen die Katastrophe. Überhaupt ist jede Weiterverbreitung, Pericarditis tuberculosa, Knochen- und Gelenktuberkulose u. s. w., besonders Meningealtuberkulose, infaust.

Von sonstigen Komplikationen ist namentlich der Diabetes ungünstig. Phthisische Diabetiker gehen in der Regel sehr bald zu grunde (v. Noorden u. a.). Die längste Krankheitsdauer, die ich beobachtete, war einmal $3\frac{1}{2}$, einmal 5 Jahre. Oeder berichtet von einem 58jährigen Manne, der 7 Jahre mit beiden Leiden lebte.

Auch die Assoziation mit Krebs gilt als ungünstig, doch beobachtete Jessen Karzinom bei ausheilender Tb. — von den Mischinfektionen wird mehrfach der Tetragonus als besonders ungünstig hervorgehoben. Basedow beeinträchtigt in leichter Form die Prognose wenig, in schweren wirkt er infaust (Lévy).

Syphilitische Tuberkulose halten sich hin und wieder auffallend gut, häufiger aber wird die Tb. durch Syphilis sehr ungünstig beeinflusst,

namentlich im vorgerückten Stadium. Besonders werden die Hg.-Kuren vor einer genügenden Kräftigung des Körpers oft verhängnisvoll (siehe auch Bernheim).

Bei Emphysematösen und Arthritikern zeichnet sich die Tb. im allgemeinen durch langsamen Verlauf aus. Kürzlich ist mir ein Fall bekannt geworden, wo sich bei einem 62jährigen Mann mit langjähriger Gicht und hochgradiger Arteriosklerose (2 apopl. Insulte) anscheinend in kurzer Zeit eine ziemlich umfangreiche Larynx-Tb. entwickelte und der Kranke bald darauf einer Apoplexie erlag. Alle Anzeichen, die auf fibröse Phthise hindeuten, lassen gleichfalls einen chronischen Charakter annehmen; solche Kranke gehen später eher an Herzschwäche als an Tb. zu grunde.

Mitralinsuffizienz und Stenose scheinen keinen besonderen Einfluß auf den Verlauf auszuüben, z. B. zeigte einer meiner Kranken mit hochgradigster Mitralinsuffizienz und verbreiteter fieberhafter Phthise innerhalb $\frac{3}{4}$ Jahre eine ganz überraschende Besserung, ging aber dann durch leichtsinnige Streiche zu grunde. v. Kryger betont das häufige Vorkommen geheilter Phthise bei bestehenden Klappenfehlern. Pulmonalstenose scheint ungünstig zu wirken. Herzfehler werden umgekehrt durch akute Tb. oft verschlimmert (s. S. 501 ff.).

Hin und wieder spottet der Verlauf der begründesten Prognose; trotz schwerster Komplikationen wird der eine gesund und der andere geht ungeachtet der günstigsten äußeren und inneren Verhältnisse unaufhaltsam zu Grunde.

So fand B. Fischer bei einem luetischen Potator mit schwerer chronischer Nephritis, der vordem reichliche Tb.B. gehabt hatte, eine geheilte Phthise des Oberlappens mit einer wallnußgroßen Kaverne.

Im ganzen ist die Prognose der Lungentuberkulose zwar ernst, aber nicht schlechterdings ungünstig. Sie würde noch besser, wenn der Kranke sich frühzeitiger entschließen wollte, bei jedem länger dauernden Katarrh etc. die Hilfe des Arztes in Anspruch zu nehmen, wenn der Arzt durch die Abstammung des Kranken aus gesunder Familie und sein gutes Aussehen anfangs sich nicht oft in der Diagnose täuschen ließe, und wenn die notwendigen Anordnungen mit Energie durchgeführt würden.

Pathologische Anatomie.

- Abrikossoff Al., Zur Frage üb. d. frühest. Initialveränderungen bei Lungenphthise. C. f. allg. Path., XIV., 1903, Nr. 10, p. 369. C. f. B., Bd. 34, S. 301.
- Altmann David, Üb. einen Fall v. Aneurysma d. Art. pulm. i. einer tub. Lungenkaverne. I. D., Freiburg, Mai 1900.
- Arnold, Üb. lentikuläre Lungennekrose u. d. Bildung v. Lungensteinen. M. m. W. 1897, Nr. 47. Pr. m. W. 1898, p. 141.
- Arnold, Birch-Hirschfeld, Lehrbuch der pathologischen Anatomie, Dmochowski Fränkel und Troje, Kaufmann, Orth, Pitres und Vaillard, Rindfleisch, Straßmann siehe frühere Kapitel.
- Askanazy, Üb. tumorart. Auftreten d. Tub. Z. f. kl. M., Bd. XXXII, H. 3 u. 4. D. m. W. 1898, L. p. 7.
- Auelair J., La sclérose pulm. d'orig. tub. A. d. méd. exp. 1900, p. 189. C. f. i. M. 1901, S. 948.
- Aufrecht E., Die Genese d. Lungenphthise u. d. Verschiedenh. d. m. d. Namen „Tuberkel“ bezeichn. Gebilde. A. f. kl. M. 1903, Bd. 75, H. 3-6. — Ursache u. örtl. Beginn d. Lungentub. 13. intern. m. Cgr. Paris, Aug. 1900. C. f. i. M. 1900, p. 1097. M. m. W. 1900, p. 1318. — Über die Lgschw. Magdeburg 1904.
- Baudouin Felix, Die tub. Cirrhose i. Kindesalter. Rev. mens. des malad. de l'enf. Mai 1902. M. m. W. 1902, p. 1475.
- Benjamin O., Le rôle de l'infect. vaséique dans la tub. pulm. A. gén. méd. 1900/120.
- Birch-Hirschfeld, Beginn d. Lungentub. Med. Ges. zu Leipzig, 21. Februar 1899. W. m. W. 1899, p. 977. M. m. W. 1899, Nr. 20, p. 427, 683. — Üb. d. Sitz u. d. Entw. d. prim. Lungentub. A. f. kl. M., Bd. 64. — Das erste Stadium der Lgschw., p. 213, B. T. C.
- Blöte H. W., Over ten zetel van d. prim. haard by longtub. Herimagsbundel. Prof. S. S. Rosenstein, angeb. Leiden, 1903, p. 33 u. 39.
- Blum Rudolf, Zur Statistik d. amyloiden Degeneration m. bes. Berücksichtigung d. Tb. W. kl. W., Jahrg. 1903, p. 349. D. m. W. 1903, L. B. p. 84.
- Blumenau M., Üb. d. akute tub. (käsige) Pneumonie. Wratschebnaja Gaseta 1903, Nr. 47. M. m. W. 1904, p. 357.
- Cobb J. O., The point of election in pulm. tub. Z. f. Tb., Bd. 5, p. 391.
- Cornet, Über Mischinfektion bei Lungentub. W. m. W. 1892, Nr. 19 u. 20.
- Cornet G. & Meyer A., Tub., Hbch. d. path. Mikroorganismen. Herausgeg. v. W. Kolle & Wassermann.
- Cornil, Les anévrysmes des cavernes. S. m. 1901, Nr. 38. D. m. W. 1901, p. 245 L.
- Dodwell, Thrombosis of the femoral vein in Phthisis. Am. journ. of the med. sc. June 1893.
- Delorme und Reverdin, VII. franz. Chir.-Cgr. (Myositis tub.) D. m. W. 1891, S. 711.
- Fraenkel E., Üb. Veränd. quergestreifter Muskeln bei Phthisikern. V. A., Bd. LXXIII, S. 380. — Üb. path. Veränd. d. Kehlkopfmuskeln b. Phthisikern. V. A., Bd. LXXI, S. 261.

- Haentjens, Spont. Perforat. einer Lungenkaverne durch d. Brustwand ohne Bildung v. Pneumothorax. Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, Nr. 5, 1898. M. m. W. 1898, p. 467.
- v. Hansemann, B. kl. W. 1902, S. 86. B. m. G., 8. Jan. 1902.
- Heinlein, Patholog.-anat. Demonstrationen. Nürnberg. m. Ges. v. 30. Dez. 1897. M. m. W. 1898, p. 438.
- Hirtz, Phlébite précoce chez les tub. Le mercredi méd. 1894, No. 24.
- Ipsen J., Menschth. v. Aussehen d. Rinderperlsucht. V. A., Bd. 177, H. 3, p. 570.
- Israel, Die anämische Nekrose der Nierenepithelien. V. A., Bd. 123, p. 310, 1891.
- Jürgens, X. intern. m. Cgr. 1890, III., p. 171.
- Kaufmann E., Lehrb. d. spez. path. Anat., II. Aufl. Berlin 1901. M. m. W. 1901, S. 1493.
- Krzyszowski und Wiezkowski, Ein Fall v. Aneurysma art. pulm., nebst mehrer. Aneurysmata a. d. Ästen obig. Arterie u. offen. Botallusgange. Przegląd lekarski. 1901, Nr. 48. D. m. W. 1901, L. p. 335.
- Lemoine, Note sur un cas de thrombose du Sinus chez un tub. Lyon méd. No. 12, 1880.
- Lucksch, Aorta v. einem an chron. u. subakut. Tb. Gestorbenen. Ver. D. Ä. i. Prag, Febr. 1903. M. m. W. 1903, p. 581.
- Mager W., Ein Fall v. Broncholithiasis. W. kl. W. 1898, p. 268. C. f. i. M. 1899, p. 634.
- Mihel E., Ein Fall v. Verkalk. d. Leber (serbisch). C. f. i. M. 1901, S. 84.
- Orth, Lehrbuch der spez. pathol. Anatomie. Berlin 1887, Bd. I, S. 465.
- Ortner, Die Lungentub. als Mischinfektion. Wien u. Leipzig 1893.
- Petzold H., Üb. vernarbte u. vernarbende tub. Darmgeschwüre. I. D. Kiel, 1898.
- Pianori, La tub. incipiente e il solco apicale del pulm. Gaz. d. osp. 1902, Nr. 120. D. m. W. 1902, L., p. 297.
- Poetzsch C., Üb. d. Auftr. v. Fibrin in tub. Lymphdr. I. D. Erlangen 1899.
- Posadsky S., Die Veränderungen der quergestreiften Muskeln bei den Schwindsüchtigen. C. f. m. W. 1881, Nr. 2, S. 17.
- Raabe H., Üb. fibrinöse Exsudation b. d. Lobulärpneumonie u. d. Tub. d. Lunge. I. D. Königsberg, 1900.
- Ransome A., The conditions of infection by tub. Z. f. Tb., I., 1900, p. 7.
- Ribbert Hugo, D. m. W. 1897, Nr. 53. (Miliartub.) — Üb. d. Ausbreit. d. Tub. i. Körper. Sonderabdr. a. d. Universitätsprogr. Marburg 1900, p. 20, N. G. Elwert. M. m. W. 1900, p. 1830. B. kl. W. 1901, p. 865. — Üb. d. Genese d. Lungentub. D. m. W. 1902, Nr. 17, p. 302. — Lehrb. d. spez. Path. u. d. spez. Anat. Vogel, Leipzig 1902. Z. f. Tb. Bd. 4, H. 4, p. 364.
- Ruge H. u. Hierokles, Üb. Thrombosen f. Lungentub. B. kl. W. 1899, p. 73, m. Literatur. M. m. W. 1899, S. 156.
- Sata, Üb. d. Bedeut. d. Mischinf. b. d. Lgschw. Zieglers Beiträge, 1899. 3 Suppl.-Heft.
- Sawada Keigi, Üb. Zerstörung u. Neubild. d. elastischen Gewebes i. d. Lunge b. verschiedenen Erkrank. V. A., Bd. 169, H. 2, 1902. — Zur Kenntnis d. hämatog. Miliartub. d. Lungen. A. f. kl. M. Bd. LXXVI, 1903, H. 4/5, p. 343.
- Schmoll E., La caséificat. R. d. l. tub., T. II, 1903, p. 164. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 629.
- Schmorl Georg, Lungentub. (Bestät. v. Birch-Hirschfeld). M. m. W. 1901, Nr. 50. M. m. W. 1902, p. 331. — Zur Frage d. Genese d. Lungentub. M. m. W. 1902, p. 1379, 1419. C. f. B. 32, p. 493. Z. f. Tb., Bd. 4, 3, p. 267.
- Schwalbe, Die Gastritis d. Phthisiker vom. pathol.-anatom. Standp., V. A., Bd. CXVII, S. 316. C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 765.
- Sotty J., Essai sur la périton. tub. à début brusque simul. l'appendic., Th. Lyon 1901.
- Souhaut, Etude sur le rétréciss. de l'artère pulm. dans ses rapports avec la tub. du poumon., Th. Paris 1902.

- Stade Fritz, Üb. Lungenverkalkg. I. D. Kiel. Juni u. Juli 1900.
- Storch G., Üb. d. Fälle v. Lungenarterienaneurysma. I. D. Breslau, Jan. u. Febr. 1899.
- Tendeloo N. Ph., Stud. üb. d. Urs. d. Lgkrkh. II. (path.) Teil, XII., p. 119—480.
- J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902. — Patholog. Anatomie. (Schröder & Blumenfelds Hb. d. Th. d. chr. Lgschw.) 1904, S. 19.
- Triboulet, Zustandekommen der Cirrhose durch d. Tb., und zwar meist durch eine solche d. serös. Häute. Paris. m. Ges. April 1903. D. m. W. 1903. V. B., p. 183.
- Troje, D. m. W. 1892.
- Uffenheimer A., Echte prim. Perlsucht d. Bauchfell. b. Kind. M. m. W. 1905, S. 1397.
- Weigert, Koagulationsnekrose od. Nekrose m. Inspissation. C. f. a. Path., II., 1891, p. 785.
- Werner C., Zur Ätiol. d. Spitzentub. I. D. Jena, Juni 1901.
- Wesener F., Klin. u. exp. Beitr. z. Fütterungstüb., Freiburg i. B. 1885, F. C. B. Mohr; Ärztl. int. Bl. 1885, Nr. 47, S. 693.
- Ziegler E., Lehrbuch d. allg. u. spez. pathol. Anat. f. Ärzte und Studierende. 10. Aufl. Jena 1901. C. f. i. M. 1901, S. 1151.

Symptome.

- Abraham, Üb. d. Bedeutung d. Hämoptoë bei d. Lungentub. I. D. Erlangen 1893.
- Achard Ch. et Loeper M., Les glob. blancs dans la tub. C. r. biol. 1900/1066.
- Addicks, Op. Eingr. beeinfl. tub. Herde, d. entfernt v. d. Op.-Stelle gelegen sind. Berlin 1902. D. m. W. 1903, L. p. 265.
- Alessi U., Gangli del simpat. e tub. Gaz. d. osp., No. 137. D. m. W. 1903, L., p. 302.
- Alkan Leop., Üb. nächtl. Fiebertemperatur. b. Tub. I. D. Leipzig, Dez. 1902.
- Amrein O., Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus d. Vorkommen von abgestorb. od. i. ihrer Virulenz abgeschwächten Tb.B. im Sputum ziehen? Diss. Zürich 1900.
- Andral, zitiert nach Hérard, Cornil und Hanot.
- Andrien H., Rhum. tub. chez l. enfants. Th. Lyon 1904.
- Andreesen, Üb. d. diagn. u. progn. Bedeut. d. Zahnfleischsaum. b. d. Lgtb. Pet. m. W. 1895; D. M. Z. 1895.
- Andrzejewsky A., Üb. d. Gehalt a. Schwefelsäure u. a. Ätherschwefelsäur. i. d. Harn d. Lungentub. Diss. St. Petersburg 1900. Z. f. Tb., III., S. 360.
- Appelbaum L., Blutunters. a. Phthis. B. kl. W. 1902, p. 7.
- Armand-Delille P. F., De l'act. s. l. centr. nerv. d. pois. d. bac. tb. hum., R. d. l. Tb. 1903, p. 413, C. f. B., 35.
- Arneill R. u. Michigan J., Die E. Diazor. Am. J. of the m. sc., März 1900; M. m. W. 1900, p. 1215.
- Arneth Jos., D. Lgschw. a. Grundl. klin. u. exp. hämatol. Unters. etc. Leipzig (Barth) 1905. Z. f. Tb., Bd. VII, S. 309.
- Arnold Fr., Üb. d. Atmungsgröße d. Mensch. Heidelberg 1885, Mohr.
- Arnold, Beitr. z. Anat. d. miliar. Tuberkels. V. A. 1880. Bd. LXXXII, S. 377.
- Arnsperger H., Herzverziehg. deh. mediastin. Proz. m. nachträgl. Lgerkrkg. M. m. W. 1905, p. 467.
- Asada Shigetaro, Üb. d. Diazoreakt. im Harn d. Phthis. I. D. Erlangen, Jan. 1901.
- Attwood R. D., A case of surg. emphys. i. pulm. tb. Lanc. 1904, p. 1714.
- Aufrecht, D. Verschiedenh. d. Lungenschalles b. In- u. Exsp. u. ihre Verwertg. b. path. Zuständ. A. f. kl. M., Bd. 65, H. 5 u. 6. — Aufheb. d. bronch. Atemgeräusch. i. d. Trachea d. Stenos. beid. Hauptbronch. A. f. kl. M. 1897, Bd. 58, p. 484.
- Auxion, Quelques considérat. sur la tub. infant. Th. Toulouse 1901.

- Avellis G., Üb. eine Art trach. Hämoptoe VIII. Vers. südd. Laryng. Heidelberg. M. m. W. 1901, Nr. 27, p. 1112 u. Nr. 34, p. 1351.
- Babes V., D. erste Nachw. d. Tb.B. im Harn. C. f. m. W. 1883, Nr. 9, S. 145.
- Baccarani, Üb. d. Auskultat. d. Mundhöhle. M. m. W. 1903, p. 210.
- Bach, Z. Meth. d. Pupillenunters. D. m. W. 1902, p. 410.
- Baginsky, Lehrb. d. Kinderkrankheiten. Berlin 1892.
- Ballmer u. Fräntzel, Üb. d. Verh. d. Tb.B. i. Auswurf während d. Verlaufes d. Lungenschwinds. B. kl. W. 1882, Nr. 45; C. f. m. W., H. 12, S. 212.
- Balvay A., D. l. toux ds. l. tb. pulm. chron. Lyon Storek & Cie. 1903.
- Bamberger, Würzb. m. Z. 1861, Bd. II.
- Bard L., Formes clin. d. l. tub. pulm. Genève 1901. Kündig. Gießen 1901. Roth., W. kl. W. 1901, p. 1305; Franz. Intern. Cgr. April 1898. W. m. W. 1898, p. 1417. — De la phthisie fibreuse. Th. de Lyon 1879.
- Barduzzi, Üb. d. mögl. Bezieh. d. Pityriasis versicolor z. d. Lgtb. Boll. dei Cultori di sc. med. di Siena, 1887, fasc. 2; Mh. f. pr. D. 1888, S. 391.
- Barety, De la mort chez les phthis. par thromb. ou emb. de l'artér. pulm. Nice méd. 1877.
- Batten F. E., Some tub. affect. of the nerv. system. Pract. 1901/125.
- Bauer Ph., Purpura haemorrhag. b. Tub. M. m. W. 1902, p. 748.
- Baumholtz, D. Resistenz d. rot. Blutkörperch. b. Phthis. pulm. 13. Int. m. Cgr. in Paris, Aug. 1900. B. kl. W. 1900, p. 852.
- Baumholz J., Z. Fr. v. d. Veränder. d. Blut. b. d. Lgtb. St. Pet. Diss. 1900.
- Beau N., Sur l'arthralgie des phthis. J. des conn. méd.-chir. 1856, p. 156.
- v. Bechterew, Üb. d. psych. Schluckstörung. Neur. C. 1901, Nr. 14; C. f. i. M. 1901, S. 892.
- Beclère, D. Verwend. d. Röntgenstr. z. Diagn. d. Lgtb. IV. frz. Cgr. z. Stud. d. Tb. Paris 1898. M. m. W. 1898, p. 1060.
- Beck, Üb. d. progn. Bedeut. d. Diazoreak. b. Phthis. Ch. A. 1894, t. XIX, p. 583.
- Becker, De glandul. lymphat. atque thymo. I. D. Berlin 1826.
- Behr M., D. Aff. d. ob. Luftw. b. Phth. i. d. Anfangsst. B. z. Tb., Bd. III, 1904, p. 37.
- van Beneden A., Diazoréact. et tub. Ann. de la soc. méd.-chir. de Liège 1901, Nov. Z. f. Tb., III., p. 537. — Températ. et Tuberculine. Le Scalpel 1902, No. 2; Z. f. Tb., 4, H. 1, p. 86.
- Benedikt, Beob. u. Betracht. a. d. Röntgenkabinette. W. m. W. 1896, Nr. 52, 53; 1897, Nr. 9, 10.
- Béraud M., Essais sur la psycholog. du tub. Th. Lyon 1902.
- Bergel, Fieber u. Fieberbehandlg. Th. M. 1902, p. 453/523.
- Berger A., Üb. Körpergew.-Veränd. d. Patient. d. Basel. Heilst. f. Lgkrk. i. Davos. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 521.
- Bernheim S., Associat. Franç. pour l'avancem. des sc., Cgr. de la Rochelle 1882. — Traité clin. et therap. de la Tub. pulm. Paris 1902. Z. f. Tb., 4., H. 2, p. 184.
- Bettmann S., Die prakt. Bedeut. d. eosinophil. Zellen. Volkmanns Sammlg., N. F., Nr. 226, Leipzig 1900; W. kl. W. 1900, p. 1140.
- Bezançon F., Contrib. à l'ét. d. l. tachycardie sympt. d. l. tub. R. de m. 1894, t. XIV, p. 38. — Üb. d. tub. Pseudorheum. Soc. méd. d. Hôp. M. m. W. 1901, Nr. 50, S. 2028.
- Bezançon F. u. Labbé Marcel, D. Leukocytose b. d. Infektionskrkh. Presse med. 1902, p. 1071; M. m. W. 1903, p. 620.
- Bierfreund, Üb. d. Hb.-Gehalt b. chir. Erkr. m. bes. Berücks. a. d. Wiederersatz v. Blutverlusten. A. f. kl. Ch., Bd. XLI, S. 1.
- Biermer, Die Lehre vom Auswurf. Würzburg 1855.

- Binetti, Sopra un caso di respiraz. cardio-polm. rilevabile a distanzo. Gz. d. osp. 1901, No. 96. C. f. i. M. 1901, S. 1115.
- Bischoff H., Blutunters. an mit Tuberkulin behand. Tuberkulösen. I. D. Berlin 1891.
- Bizot, citiert von Hérard, Cornil und Hanot.
- Bizzozzero G., Üb. d. diagn. Bedeut. d. Lungenalv.-Epith. i. Sputum. C. f. kl. M. 1881, S. 59.
- Blad A. u. Videbeck P., Üb. d. Diazoreaktion, bes. ihr. Auftreten b. d. Lgtb. Z. f. Tb. etc. 1901, Bd. 2, p. 412. — Hospitaltidende 1900, Nr. 48; Z. f. Tb., II, p. 180.
- Bloch, Üb. d. Husten d. Nervösen. D. m. W. 1898, p. 462.
- Blum V., Üb. leukopen. Blutbefund b. Infektionskrankh. W. kl. W. 1899, p. 401.
- Blumenfeld, Üb. d. Einfl. meteorol. Vorg. a. d. Verl. d. baz. Lgschw.
- Blumenthal A., Üb. d. Produkte d. Darmfäulnis im Urin. I. D. Berlin 1899.
- Bohland, Üb. d. Einw. d. Hidrotica u. Antihidrotica a. d. Leukoeytenzahl d. Blutes. C. f. i. M. 1899, Nr. 15, p. 361.
- de Boissière, The diazoreact. i. pulmon. tub. Br. m. J. 1902, no. 2185, p. 1576; D. m. W. 1902, L. p. 310.
- Bokay, Z. Chemie d. Sputa. Pest. m.-ch. Pr. 1879, p. 318, 344, 363.
- Bolli V., Alcune osservaz. sul val. diagnost. e progn. della diazoreazione. Rif. med., No. 184; D. m. W. 1901, L. p. 231.
- Bollinger, Z. Stat. ält. Veränd. i. menschl. Leichen. A. f. kl. M. 1869, Bd. I, S. 140.
- Bondi S., Üb. einfach. Ausf. v. E. Diazor. M. m. W. 1904, p. 671. C. f. i. M. 1904, Nr. 10—13.
- Botkin, Blutunters. b. Tblin.-Inj. D. m. W. 1892, Nr. 15, S. 321; Cor. f. Sch. Ä. 1892, Bd. XXII, S. 358.
- Bouchard, La pléurésie de l'homme étudiée à l'aide des rayons de Roentgen. Gz. des hôp. 1896, t. LXIX, p. 1408. — Les Rayons de Roentgen appliqués au diagnostic de la tub. pulm. Gz. des hôp. 1896, t. LXIX, p. 1439. — Applic. de la radioscopie au diagnostic des maladies du thorax. Gz. des hôp. 1897, t. LXX, p. 1.
- Bouie, D. l. secrét. sudor. dans l. tub. pulm. Th. Paris 1903 (Michalon), m. zahlr. Lit.; B. kl. W. 1903, L. A., p. 69.
- Bour L., Rapp. d. l. tb. et d. l. paralys. gén. Th. Paris 1903.
- Bourget, D. parall. u. gleichz. Auskultat. d. Lungen., Sch. Ä.-Tag. Lausanne, Juni 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 215.
- Bouveyron, Kl. Beitr. z. Stud. d. tub. Rheumat. in Fällen v. Lupus oder v. sogen. Tuberkuliden. R. d. ch. 1903, p. 329; M. m. W. 1904, 1, p. 133.
- Boyer, Guérison de la phthis. pulm. 1870, 9. édit., p. 13.
- v. Bozoky D., Einiges üb. Lungenblutgn. Z. f. Tb., Bd. 5, H. 3, 1904.
- Brecht M., D. diagn. Bedeut. d. Diazor. I. D. Berlin 1883; C. f. m. W. 1884, Bd. IV, S. 51.
- Brehmer H. jr., Das Verhalten d. Urins Schwindsüchtiger gegenüber d. Diazobenzol-sulfonsäure. Diss. Leipzig 1884; C. f. m. W. 1884, Nr. 38, S. 670. — D. Ther. d. chron. Lgschwinds. Wiesbaden 1889. I. F. Bergmann, S. 321.
- Breitung M., Üb. Ohrhusten. D. M. Z. 1895, S. 665.
- Bridge, Danger. pulm. hemorrh. in tub. and its managem. J. of the Am. m. As. No. 10; D. m. W. 1900, L. p. 75.
- Brieger O., Üb. d. Funktionen d. Magens b. Phthis. pulm. D. m. W. 1889, S. 269.
- Brissaud et Toupet, Étud. expér. 1887, p. 102.
- Broadbent, Myoidema i. pulmon. tub. Lane. 1900, 24. Febr.; C. f. i. M. 1900, p. 1099.
- Broca A., Hydarthros. tb. d. genou. etc. Gaz. d. hôp. 1904, p. 97.
- Brongniart, Contrib. à l'ét. physiolog. et thérapeut. de l'hypersécrét. sudor. chez les tub. (m. Literatur). Th. Lille 1909.

- Brown K. P., A study of the blood in 73 cases of bone tub. in children etc. Occident. med. times 1897, Aug. C. f. Ch. 1898, p. 347.
- Bruce-Porter, Intraven. inject. of norm. saline solut. i a. severe case of haematemes. recovery. Br. m. J. 29. März. D. m. W. 1902, L. p. 88.
- Brun, Contrib. à l'ét. des malad. du coeur droit dans l. phthisie. Th. Paris 1878.
- de Brun H., Rhumat. et érythème tub. J. d. Practiciens 1902, No. 36. Z. f. Tb., Bd. 4, 3, p. 262.
- Burekhardt Otto, Üb. Störungen d. Menstruation. Jb. d. allg. Poliklinik i. Basel. Z. f. Tb., Bd. 4, p. 469.
- Burekhardt M., Untersuch. üb. Blutdruck u. Puls b. Tub. in Davos. Diss. 1901. A. f. kl. M. 1901, 70. Bd., 3. u. 4. H.
- Burghart, Üb. Beeinfl. d. E. Diazor. d. Substanz v. stark. Affinität z. d. Ehrlichschen Reagens. B. kl. W. 1899, p. 842, 1901, p. 276/658; Ges. d. Char. Ä. i. Berlin, Febr. 1900.
- Büttner O. u. Müller K., Technik u. Verwertung d. Röntgenstrahl. im Dienste d. ärztl. Praxis u. Wissensch. Enzykl. der Photogr. 1897, H. 28, Halle a. d. S.
- Byers J. W., Cas. of amenorrh. assoc. with. Raignauds dis. and pulm. tb. Lanc. 1899, 26. Aug. C. f. i. M. 1900, p. 499.
- Cahn & v. Mering, D. Säuren d. ges. u. kranken Magens. A. f. kl. M., Bd. XXXIX, p. 233.
- de la Camp O. & Mohr L., Vers. e. exper. Begr. d. Williamsschen Sympt. b. Lgspitzentb. Z. f. exp. Path. 1905, p. 373.
- Campbell, Pulm. tub. i. young children. Edinb. m. journ. 1899, p. 259. C. f. i. M. 1900, p. 967. — The pulsrate i. pulm. tub. Br. m. J., 1. Juni 1901, p. 1334; D. m. W. 1901, L. p. 146.
- Camurri L., La diazo-reazione di Ehrlich (Progn. Wert d. Tb.). Gaz. d. osp., Nr. 56. D. m. W. 1903, L. B. p. 135.
- Capitain G., Variat. de la densité de l'ac. phosphor. et des subst. dissoutes dans les urines au cours des div. formes. clin. de la tub. pulm. Th. Lyon 1902.
- Carcassone P., Ét. d. amyotrophies scapulo thoraciques au cours d. l. tb. pulm. Th. Paris 1900.
- Carrie, Haemoptysie foudroyante chez un enfant de deux ans et demi.
- Carrière M. G., Les troubles nerveux périphériques de la tub. pulm. Gz. d. hôp., Nr. 109. D. m. W. 1901, p. (302) L.
- Cellerier N., D. l. tb. de l'étiol. d. l. sciatique, sérodiagn. Th. Lyon 1904.
- Chalier A., Rhum. artic. tb. Lyon méd. 1904, p. 789.
- Charlier, D. Lgkapaz. d. Tb. u. ihre klin. Anw. Paris. T. C. 1905. M. m. W. 1905, S. 2200.
- Charrin et Mavrojannis, La toxicité de la sueur norm. et patholog. C. r. biol. 1898, p. 682.
- Chashinski P. Ch., Unters. üb. d. Gewichtsverl. d. Wöchner. i. Laufe der ersten Woche. Shurnal-akusch. i shenskich bolesnej., N. V., 1898. Pet. m. W. 1898, p. 60.
- Chavigny, Palp. du début d. l. tub. pulm. Lyon méd. Année, 1903, p. 919.
- Ciommi u. Benedetti, Unters. üb. d. Toxizität d. Schweißes. 10. Cgr. d. ital. Ver. f. i. M. 1899. B. kl. W. 1899, p. 1066.
- Claude H., D. Verwend. d. Röntgenstrahl. z. Diagn. d. Lgtb. IV. franz. Cgr. z. Studium d. Tub., Paris 1898. M. m. W. 1898, S. 1160. — Eryth. scarlat. forme pré-tub. et inf. tub. suraiguë. R. d. l. tub. 1902, p. 261.
- Claude H. et Zaky A., Rech. hématolog. dans la tub. exp. du cobaye. C. r. biol. 1902, p. 505. — Rech. sur les modificat. du sang dans la tub. et particulièrement. dans la tub. exp. R. d. l. tub. 1902, 6. Sept., p. 117.

- Clayton, Some observed variat. i. the phosphates and urea of urine. *Lanc.* 6. Sept. D. m. W. 1902, L. p. 226.
- Clemens D., Diazor. d. Harnes. V. Freiburg. Ä. 1899. M. m. W. 1899, S. 1751.
- Cochez, D. l. rech. du bac. d. l. tub. dans l. produits d'expectoration. Th. de Paris 1883.
- Coëylas A., Pathog. et symptom. du vomissem. ds. la tb. pulm. Th. Paris 1904.
- Cohn E., Purp. haemorrh. bei Lgtb. M. m. W. 1901, Nr. 50, p. 2001 m. Literaturangabe.
- Cohn S., Eosinoph. Zellen a. d. Material der Tub.-Poliklinik nicht bestätigt. V. f. i. M., Berlin. M. m. W. 1901, Nr. 28, S. 1155.
- Colella Ros., Neuritis b. Tub. Acc. di Palermo, 24. März 1900. W. m. W. 1900, p. 2086. — Stud. sulla polinevr. tub. Ann. di nevr. Napoli XXI, 1903, Fasc. 2, p. 121.
- Colin, Bull. de la Soc. méd. des hôp. 1881.
- Cornet G., Einige spirometr. Beobacht. etc. I. D. München 1884.
- Cruveilhier, Traité d'anat. patholog., t. IV, p. 615—16.
- Cursechmann H., Die Heilbark. d. Lungentub. B. T. C., p. 355. — E. F. v. Hautemph. Med. Ges. i. Leipzig. D. m. W. 1901, p. 223, V. B.
- Cybulski H., E. Beitr. z. Diagn. d. Lungenkavernen. M. m. W. 1902, p. 1839. *Medyc.* (poln.) Nr. 51. — Ein. Bemerk. üb. Lungenblut. Z. f. Tb., Bd. 4, p. 299. — Üb. ein. eigentüml. Komplik. d. Lungenblut. M. m. W. 1902, p. 1613. — Üb. d. Lageveränd. d. Herz. i. Verl. d. chron. Lgtb. Görbersdorffer Veröff. a. Dr. Bretiners Heilanst. (Vogel & Kreienbink), Berlin 1902, p. 25.
- Czerny, Respirationsstör. Jb. d. Kdhlk., XLV. Buch, 1897, H. 2 u. 3.
- Darmezin H., Des variat. de poids dans la tub. chron. Th. Lyon 1901.
- Dehio, Blutunters. bei d. durch Phthis. pulm., Karzinom, Syphilis und Botriocephalus latus bedingten Anämie. *Pet. m. W.* 1891, Nr. 1; *D. m. W.* 1892, S. 484.
- Dejerine, Rech. d. bac. dans l. tub. calcifiée et caséocalc. R. de m. 1884, t. IV, p. 921.
- Delamare G., Paralysie ascend. aiguë, probablen. toxitub. C. r. biol. 1901, p. 1027.
- Déléarde, L'hémoptysie du début de la tub. pulm. est elle un accident du travail? *Echo méd. d. Nord* 1901.
- Dennig, Üb. trommelschlegelartige Veränd. a. d. Fing. u. Zehen. M. m. W. 1901, p. 380.
- Dettweiler, 1886, Frankfurt a. M. (Alt.)
- Dettweiler u. Setzer, Z. Statistik d. Zerstörungsgesetze chron. entzünd. Lungengewebe. D. m. W. 1878, Nr. 11, p. 121.
- Bluski K., Sur la digest. chez les phthis. Z. f. Tb., 4., H. 2, p. 100.
- Driver, Ratgeber für Lungenkranke, S. 64.
- Dunin, Plötzl. Tod bei Lgschwind. inf. v. Lufteintr. i. d. Gefäße. B. kl. W. 1882, Nr. 5.
- Duplant, A propos d. bruit d. pot fêlé. R. d. m. 1899, p. 989. C. f. i. M. 1900, p. 696.
- Edinger, Unters. z. Physiol. u. Path. d. Magens. A. f. kl. M., Bd. XXIX; B. kl. W. 1880.
- Egger F., Unters. üb. Reflexhyperästhesie b. Lungentub. Festschr. z. 25jähr. Jubiläum d. Hrn. Prof. K. Massini. Z. f. Tb., Bd. 4, 3, p. 260.
- Egmann F., Rhumat. articul. aigu tub.; pseudo rhum. infect. articul. à marche aiguë d'orig. bac. Th. Lyon 1901.
- Ehrlich, Üb. Diazoreakt. u. i. klin. Bedeutg. D. m. W. 1899, Nr. 10.
- Ehrlich P., Üb. eine neue Harnprobe. Ch. A. VIII; Z. f. kl. M., Bd. V, H. 2, S. 285.
- Eichhorst H., Lehrb. d. physikal. Unters.-Meth. inn. Krankh. Bd. I: Unters. d. Haut u. Temperatur, d. Pulses u. d. Respirationsorgane. Braunschweig 1886, Fr. Wreden.
- Eisenlohr, Idiopath. subakute Muskellähm. u. Atrophie. C. f. Nervhkl. 1879, Nr. 5, S. 100; A. f. kl. M. 1880, Bd. XXVI, S. 553.

- Elting A. W., The acute pneum. form of tub., A. J. of m. sc. 1900/509.
- Elzholz A., Üb. Psychosen b. Karzinomkachexie. M. m. W. 1898, p. 737, 791.
- Engel H., Üb. Fettorganisation i. tb. Sputum. Z. f. Tb. etc. 1901/120.
- English, Pulm. fearlessness. (Ängstlichkeit b. Lungenaffektionen). J. of the Am. m. Assoc., Nr. 4. D. m. W. 1902, L. p. 47.
- Erben Fr., Üb. d. chem. Zusammensetz. d. Blutes b. Tub. pulm. etc. Z. f. Hlk., Bd. 26, 1905, p. 303.
- Erni H., D. Klopffphänom. b. d. Phth. m. Kavern, Z. f. Tb., Bd. 7, S. 128.
- Escherich, Stud. üb. d. Morbidit. d. Kindes i. versch. Altersklass. 71. Naturf. Vers. München 1899. Jb. f. Khlk., Nr. 51, p. 1. — Z. diagn. Bedeut. d. Diazor. D. m. W. 1883, Nr. 45; C. f. m. W. 1884, S. 52; A. f. kl. M. 1885, Bd. XXXVI.
- Ewald, Klinik für Verdauungskrankheiten, II.
- Fabius, De spirometro ejusque usu. Diss., Amsterd. 1853; A. f. wissensch. Hlk., Bd. I, H. 3, S. 504; Z. f. rat. M., N. F., Bd. IV, H. 2, S. 281.
- Faisans, Üb. Tachykardie b. Tb. u. ihre Bedeut. i. diagn. prognost. u. therap. Hins. W. m. Bl. 1901, p. 183, 203. W. m. Pr. 1898, p. 2023, 2055. C. f. i. M. 1899, p. 532.
- Faivre, Soc. méd. de Lyon 1864.
- Fauconett Ch. J., Tb. Progesse u. Lymphocyten. Arch. f. klin. Med. 1905, 82. Bd., 1. u. 2. H., S. 182.
- Fenoglio, Üb. d. Wirkung einiger Arzneien a. d. Hb.-Gehalt d. Blutes. W. m. Jb. 1882, S. 635.
- Ferret, Der tb. Pseudorheum. Par. m. Ges. v. 6. Okt. 1903. M. m. W. 1903, II, p. 1989.
- Finizio G., Contrib. clin. ed. istolog. sulla polineuriti tub. Rif. med. 1900/435, Nr. 110 bis 114. D. m. W., L. p. 123.
- Fischer Bernhard, Üb. Ausheilg. großer tb. Lungenkavernen. Beitr. z. Klinik d. Tb., Bd. 1, 1903, H. 2, p. 153.
- Fischer C., Zur Frühdiagn. u. Frühkur d. Lungentb. Cor. f. Sch. Ä. 1904, p. 14.
- Fleischer, Sitz.-Ber. d. Erlanger med.-phys. Soz., 1879, Jänn.
- Fleischmann, zitiert von Herz.
- Foix, Sur un cas d'aphonie nerv. chez une tuberc. Rev. d. laryngol 1896, Nr. 37. C. f. Ch. 1897, p. 56.
- Fontana, La pratica medica 1900, Nr. 3.
- Forehheimer und Stewart, On the toxicity of the urine. Am. J. of the m. sc. Sept. 1899. Jb. f. Khlk., N. F. 51, p. 685.
- Forissier E., De l'albuminurie chez les tub.; forme grave de cette alb. Th. Lyon 1900.
- Foß, Üb. Luftdruckveränder. u. Lungenblut. Aus Dr. Brehmers Heilanst. f. Lungenkr., p. 97. Vogel & Kreienbrink, Berlin 1902 u. Z. f. Tb., Bd. 6, p. 43.
- Fowler, The arrest of pulm. tub. Lanc. 1899, p. 399, 12. Aug. C. f. i. M. 1900, p. 498.
- Frank F., Z. Fr. d. Menstr.-Fieb. tb. Frauen. B. kl. W. 1905, Nr. 42. M. m. W. 1905, S. 2092.
- Fränkel A. und Troje G., Üb. d. pneum. Form d. ak. Lgtb. Z. f. kl. M. 1894, Bd. XXIV.
- Fränkel A., Spez. Path. u. Ther. d. Lungenkrankheit. Berlin 1904. — Üb. d. akut. Formen d. Lungentb. B. kl. W. Nr. 21, p. 489, 523.
- Fraenkel E., Üb. path. Veränd. d. Kehlkopfmuskeln b. Phthis. V. A., Bd. LXXI, S. 261. — Üb. Veränd. quergestr. Muskeln b. Phthis. V. A., Bd. LXXIII, S. 380.
- Fräntzel O., Üb. Unterhautemph. b. Erkrank. d. Resp.-App. D. m. W. 1885, S. 161.
- Frassi A., La degen. nucleinica d. eritrociti nella tub. pulm. Clin. mod. 1902, II, p. 508, Giugno.

- Frédéricq A., R. de méd. ch. 1850, Mars.
- Freer Otto, Tub. of the larynx and aspirat. tub. of the lungs, follow. dermatit. blastomycetes. M. N., Vol. LXXXII, 1903, Nr. 22, p. 1027.
- Fréhet G., L. diazor. dans l. tub. pulm. chron. Bul. d. l. soc. sc. et méd. d. l'Ouest 1901, T. 10, Nr. 2.
- Freudweiler, Ein Vorschlag z. graph. Registrierg. d. phys. Lungenveränderg. A. f. kl. M., Bd. LXVII, H. 3 u. 4 (C. f. i. M. 1900, p. 1005).
- Freund E., W. m. Jb., Bd. I, S. 335.
- Friedländer, Kreislaufverhältnisse u. lok. Tb., A. f. kl. Chir. 1902, 68. Bd, p. 1031.
- Fries J., Vers. m. d. Thorakodynamometer nach Sticker. Z. f. Tb., Bd. 5, H. 3, 1904.
- Fuchs Emil, Die Entsteh., d. Vork. u. d. Bedeut. „eosinoph.“ Zell., m. besond. Berücksichtig. d. Sput. A. f. kl. M., Bd. 63, H. 5 u. 6.
- Gabler C. G., Üb. d. Fettleber d. Phthisiker. I. D., Berlin 1868.
- Gabrilowitsch J. G., Auftr. v. Lungenblutg. i. Zusammenhg. m. Luftdruckschwank. Z. f. Tb. 1900, Bd. 1, p. 223. — Zur Frg. üb. d. Bedeutg. d. sogenannt. paralyt. Brustkorbes (Thorax paralyt.) Wratsch, Nr. 4, 1901. Z. f. Tb., II, p. 376. — Beitr. z. Kenntn. d. wicht. Körpermaße b. Phthis. u. d. Verhältn. v. Brust- u. Bauchorg. zueinander. B. kl. W. 1899, p. 461. — Üb. Lungenblut. b. d. chron. Lungen-schwinds. B. kl. W. 1899, p. 14.
- Gaillard H., De la polyarthrite aiguë tub. à allures clin. rhumatism. (pseudo-rhum. tub. aigu.) Th. Paris 1902.
- Galliard, Üb. ein. F. v. tb. Rheumat. Soc. des hôp., 25. Okt. 1901. W. m. W. 1902, p. 528.
- Galvagni, Üb. d. Auskult. d. Mundhöhle. M. Jb. 1875, III. H.
- Gauthier P., Rhum. tb. primit. etc. Lyon m. 1905, p. 713.
- Gebhardt A., Üb. Spirometrie. M. m. W. 1902, p. 1953.
- Gehlig, Beobachtung. über Indikanausscheid. bei Kindern, spez. bei d. kindl. Tb. Jb. d. Khlk. 1894, Bd. XXXVIII, S. 285.
- Georgiewsky, Die neue Harnprobe Ehrlichs. D. m. W. 1883, Nr. 48; C. f. m. W. 1884, Bd. IV, S. 52.
- Gerhardt C., Lehrbuch d. Kinderkrankh. V. Aufl. Dr. C. Seifert, Tübingen. Laupp. 1897. — Üb. Blutspeien Tb., B. kl. W. 1899, p. 457.
- v. Geyer, Üb. Kehlkopfblutg. M. m. W. 1898, Nr. 15, p. 457.
- Giarre, Semiolog. Wert der Indikanurie bei der infantil. Tub. Med. phys. Acad. Florenz 1893, 16. Mars. D. M. Z. 1893, S. 774.
- Gieseler Th., Üb. d. prognost. Wert d. E. Diazoreakt. b. Phthis. Z. f. Tb. 1902, Bd. 3, p. 406.
- Gilbert A. & Weil E. (Fall v. Hämoptoë m. Purpura, Epistaxis u. Melaena). Soc. d. biol., 29. Okt. 1898. B. kl. W. 1899, L. B. p. 1.
- Gilbert & Lereboullet (Trommelschlegelfinger b. biliär. Lebercirrhose). Gaz. hebdom. 1902, Nr. 1. B. kl. W. 1903, L. A., p. 9.
- Gilchrist A., The low phosphates a. urea in the urine of the tub. Lane. 1902, Vol. 2, p. 1456.
- Girode, Contribution à l'étude de l'intestin des tub. Mém. inédit. 1887.
- Giuffrè, Palermo, Üb. d. Urspr. d. Fieb. b. d. Phthise. T. C. 1900. M. m. W. 1900, p. 710.
- Glückmann T., Zur Frage üb. d. diagnost. u. progn. Wert d. E. Diazoreakt. Wratschebn. gas. 1901, Nr. 38 (russ.).
- Gluzinski-Wolfram, Üb. d. Verh. d. Magensaft. i. fieberh. Krankh. A. f. kl. M., Bd. XLII.

- Goldmann Rud., Sensibilitätsstör. d. Haut b. Lungenerkrank., bes. d. Tub. Beitr. z. Kl. d. Tub. Würzburg, Bd. I, 1903, H. 4, p. 361.
- Gottstein A., Stat. Tab. üb. Brustumf. d. Phthisiker. Ges. f. soc. Med. 9. März 1905. Med. Reform 1905, Nr. 12.
- Gourand F. X., D. éch. phosph. ds. l. tb., R. tb. T. 10, 1903, p. 451.
- Grandélément L., Rhum. tb. ankylos. à forme spondylorhizom. Lyon m. 1905, p. 722.
- Grawitz, Üb. Tub. Berlin 1889, Mittler & Sohn. — Üb. d. Anämien bei Lungentub. und Karzinose. D. m. W. 1893, S. 1347.
- Green, Üb. Tb.B. in alten geheilten Lungenherden. I. D. Berlin 1889.
- Grunmach, Üb. d. Bedeut. d. Röntgenstrahl. f. d. i. M., Th. M. 1897, H. 11, S. 1.
- Grünwald L., Stud. üb. d. Zellen i. Auswurf u. i. entzündl. Ausscheidg. d. Menschen. V. A., Bd. 158, H. 2.
- Gueneau de Mussy, Clin. méd., t. IV, u. zit. v. Hérard, Cornil u. Hanot.
- Guttmann P., Zur Kenntn. d. Vaguslähmung b. Menschen, p. 51. V. A., Bd. LIX. — Üb. d. Nachweis d. Tb.B. u. ihr Vorkomm. in d. phthis. Sputis mit Demonstr. v. Präparaten. Verh. d. Berliner med. Ges. 1882, 19. Juli. B. kl. W. 1882, Nr. 52. C. f. m. W., Bd. XII, S. 212.
- Guttmann P. u. Schmidt H., Üb. Vorkomm. u. Bedeut. d. Lungenalveolarepithelien in d. Sputis. Z. f. kl. M. 1881, S. 124.
- Häberlin, M. m. W. 1888, Nr. 22.
- Halbron, Le sang ds. la tb. R. d. l. Tb. 1903, p. 319.
- Hammer Karl, E. exp. Beitr. z. Fr. d. periph. degen. Neurit. b. Tub. D. Z. f. Nerv., Bd. 12, H. 3 u. 4.
- Hannes, Schweißausbruch u. Leukocytose. C. f. i. M. 1901, Nr. 33, 34.
- v. Hansemann D., Üb. Heilg. u. Heilbark. d. Lungenphth. i. d. Hufeland. Ges., 27. März 1902. B. kl. W. 1902, p. 745.
- Harrington, An early sign. of tub. Phil. med. J. 1900.
- Haushalter Guerin, Nuklealbumin i. Harn b. tub. Pneumonie. Soc. de biol. 6. Juni 1898. W. m. W. 1898, p. 2042.
- Hays H. M., A fact. in the causat. of emaciat. in tbs. of the lungs. M. N. 1904, p. 739.
- Head, Sensibilitätsstörung d. Haut b. Visceralerkrank. Deutsch u. Seiffer, Berlin 1898.
- Hecht, Th. de Straßb. 1885.
- Heiberg Paul, Die Dauer d. letal. Tub.-Fälle in ein. Reihe versch. Erwerbszweige. Z. f. Tb., Bd. IV, H. 6, p. 509.
- Heine, zitiert von de Renzi.
- Heinzelmann, Die Psyche der Tuberkulösen. M. m. W. 1894, Nr. 5. — Üb. d. Umgang mit Tb., Z. f. Krkpf. 1894, p. 213. — D. Krkpf. Tb., Z. f. Krkpf. 1894, p. 453.
- Heitler, Üb. d. Spontanheil. d. Lungenschw. Anz. d. Ges. d. Wiener Ärzte 1880, Nr. 31. — Ein Fall v. geheilt. Lungentub. C. f. d. ges. Th. 1900/139.
- Hellendahl, Die E. Diazo-reakt. i. ihr. Bedeut. f. chir. Krankh. Beitr. z. kl. Chir. Tübingen, Bd. 32, H. 2. M. m. W. 1902, p. 457.
- Henle, Handb. d. anat. Pathol. Braunschweig 1846.
- Hensen H., Beitr. z. Physiol. u. Path. d. Blutdruckes. A. f. kl. M., Bd. 67, H. 5 u. 6.
- Henssen, Üb. saccad. Atmen. A. f. kl. M., Bd. LXXIV.
- Hérard, Cornil et Hanot, La phthis. pulm. Paris 1888. (Felix Alcan.)
- Herbert Henry, Dr., Troph. Störungen bei Lungentub.; ein Beitrag zur Symptomatolog. dies. Erkrankung. N. Y. m. Mschr., 9. Nov. 1900.
- Herzog, F. v. Morbus macul. Werlhofii b. ein. 4½ Jahre alt Knaben. Arch. f. Kinderhkl., 11, p. 140.

- Hildebrand C. H., Z. Kenntn. d. Magenverdauung b. Phthis. D. m. W. 1889, Nr. 15, S. 292.
- Hildebrandt W., Üb. eosinoph. Zellen i. Sput. M. m. W. 1904, S. 100.
- Hiller A., Eine Lammbutserumtransfusion b. Menschen. Z. f. kl. M., Bd. V, 1882, p. 1.
- Hinz Ernst, Üb. profuse Hämoptoë i. frühen Kindesalter b. d. Lungentub. I. D. Leipzig, Juni 1903, m. Literatur.
- Hirschowitz P., Z. Fr. üb. d. Natur d. Grdsubst. i. d. Exsud. b. Bronch. fibr. u. d. Bez. z. Lgtb. B. z. Tb. 1904, Bd. 2, H. 4. I. D. Tübingen 1904.
- Hirschlaff W., Bakt. Blutunters. b. sept. Erkrank. u. Lgtb. D. m. W. 1897, Nr. 48, p. 766.
- Hirtz et Brouardel, Utilité des tracés comme moyen de diagnostic etc. C. r. biol. 1900, p. 60.
- Hirtz, Paris, De l'emphysème pulm. chez les tub. Th. Paris 1878. — Üb. pneumograph. Stud. b. Tub. T. C. 1900. M. m. W., p. 710.
- Hitzig Th., Üb. d. Vork. u. d. Bedeutg. ein. Pupillendiff. b. Ösophkarz. D. m. W. 1897, Nr. 36.
- Hochsinger, Üb. Indikanurie im Säuglingsalter. W. m. Pr. 1890, Nr. 40, 41.
- Hodgson, A case of chron. pulm. tub. terminat. in acute surg. emphys. Lanc. 19. Aug. 1902. Z. f. Tb., 4, p. 79.
- Hödlmoser, Beitr. z. Klin. d. nerv. Ersch. d. Abdominaltyphus. W. kl. W. 1902, p. 599.
- Hoffmann Albin, Beitr. z. Sputum-Untersuch. C. f. i. M. 1898, Nr. 19. B. kl. W. 1898, p. 588.
- Hoffnung I., Üb. Hämoptoë bei Kindern. I. D. Berlin 1885.
- Hohlfeld M., Zur tub. Lungenphthis. i. Säuglingsalter. M. m. W. 1902, p. 1955.
- Holmgrew J., D. E. Diazor. als Prognostikum b. Lgphthise. Hygiea 1904, Nr. 8. M. m. W. 1904, p. 1758. Z. f. Tb., Bd. 7, p. 94.
- Hönig J., Die klin. Bedeut. d. Diazoreakt. Kl. th. W. 1900, Nr. 26—31.
- Hoepker Fr., Zur Kenntnis des Pemphigus d. Schleimhäute, insbesond. in Rücksicht auf einen Fall v. gleichzeit. besteh. Tub. M. f. Ohr. 1901/241.
- Hoeßlin Rudolf, Üb. Spirometrie. M. m. W. 1902, p. 1952.
- Hübner Hans, Üb. Hautemphysem b. Phthise. I. D. Leipzig 1901.
- Huchard, Tub. und Herpes zoster ex Influenza. Presse méd. belge 1894, Nr. 21. Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 572, 573.
- Huguency, Th. de Nancy 1883.
- Huguenin G., Üb. Lungenblutg. (Autoreferat.) Ges. d. Ä. d. Kantons Zürich 1896. Cor. f. Sch. Ä. 1896, p. 387. — Therap. intermittierender Frühblutg. a. d. Lunge. Cor. f. Sch. Ä. 1898, Nr. 4.
- Humbert G., D. l. résist. globul. d. l. tb. expér. C. r. biol. 1904. Nr. 19. C. f. B. Ref., Bd. 36, S. 573.
- Hutchinson J., On the capacity etc. Medico-chirurg. transact., Vol. XXIX, p. 137.
- Igersheimer J., Üb. d. Blutdruck b. Tb. I. D. Tübingen 1904.
- Imhoff F., La diazoréact. d'Ehrlich dans la tub. exp. Th. Lille 1901. A. int. de pharmacodyn. et de thérap. 1901. Vol. 9, fasc. 5/6, p. 359. Z. f. Tb., 4, H. 1, p. 83.
- Immermann, Üb. d. Funktion d. Magens b. Phthis. tub. Verh. d. Cgr. f. inn. M. 1889. C. f. m. W., Bd. XXVIII, S. 328.
- Jaccoud, Leç. de clin. méd. professées a l'hôp. Lariboisiere 1879. Path. int., t. I.
- Jakins P., A case of carcough. Pract. 1887, No. 228. C. f. m. W. 1887, Bd. XXV.
- Joffroi, De la névrite parenchymat. spontanée, généralis. ou partielle. A. de phys. norm. et path. 1879, No. 2.

- John M., Üb. d. arteriell. Blutdruck d. Phthis. Z. f. phys. Th., Bd. 5, H. 4, 1901/02, p. 275. M. m. W. 1901, S. 1542. C. f. i. M. 1901, S. 1018.
- Jones R., S. clin. notes on tb. arthrit. in the young. Tr. med. ch. soc. Edinburgh, Vol. 23, p. 179.
- Jouanneau, De la tachycardie dans la tub. pulm. Th. de Paris 1900.
- Kaatzer P., Das Sputum. Wiesbaden 1887, I. F. Bergmann.
- Kalischer S., Üb. d. Verbreitung u. Verhütung d. Lungenschw. i. Irrenanstalten. Z. f. M.-Beamte, Juli 1890, H. 7.
- Kaminer, Toxinämie. Disk. V. f. i. M. Berlin, Febr. D. m. W. 1902, V. p. 82, p. 199.
- Kara Eneff, De l'influence de la tub. pulm. sur l'aliénat. ment. (Th.) Montpellier 1899.
- Kelsch, Üb. leichte Lungenaffekt. Acad. de Méd., 21. Dez. 1897. M. m. W. 1898, p. 98.
- Kentzler, D. Komplementgeh. d. Blut. b. versch. Form. d. Lgtb. B. kl. W. 1905, Nr. 11.
- Kernig W., Üb. Dämpfung a. d. Lungenspitze ohne path. Veränder. i. derselben. Z. f. kl. Med. 1898, 34, S. 322.
- Kienböck, Üb. Lungenerkrank., tub. Verdichtg. u. Kavernen. W. m. Klub, 20. April 1898. W. kl. W. 1898, p. 475.
- Klemperer, Üb. d. Dyspepsie d. Phthisiker. B. kl. W. 1889, Nr. 11. C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 557.
- Klimmer M. u. Schmidt, Üb. d. diagnost. Bed. d. E. Diazoreakt. b. d. Tb. d. Rinder. A. f. wiss. u. pr. Tierhkl. 1901, p. 135.
- Kober, Üb. vikariierende Menstruation durch d. Lung. B. kl. W. 1895, Nr. 2. C. f. G., 1895, Bd. XIX, S. 742.
- Koch, Üb. eine Reihe akut verlauf. Fälle v. Lungentub. Ä. Ver. i. Nürnberg, 4. Juni 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 329.
- Koeniger, Erf. üb. Lgtb. aus Lippspringe. Th. M. 1895, p. 514.
- Köhler F., Fieberentstehg. u. Fieberbekämpf. i. ihren Bez. z. allg. Beh. d. Lgtb. Dr. Brehmers Heilanst. f. Lungenkr., p. 40. Vogel u. Kreienbrink., Berlin 1902.
- Koranyi in Eulenburgs Realenzyklopädie 1887.
- Kose Ottokar, Exp. Stud. üb. Lungenembolie. W. m. W. 1902, p. 1934, 1989 u. s. w.
- Kossel, Beiträge z. Lehre v. Auswurf. I. D. Berlin 1887.
- Kozieczkowsky Eugen v., Üb. d. klin. Wert d. E. Dimethylamidobenzaldehydreaktion, B. kl. W. 1902, p. 1029. — Üb. d. klin. Verwertbark. d. Sahlischen Meth. z. Funktionsprüfg. d. Magens. D. m. W. 1902, p. 462.
- Krämer C., Üb. Dauerheil. d. Tb. XXI. allg. Landesvers. d. Württemb. ä. Landesver. Schwäb. Hall. 29. Juni 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 248. — Das Prinzip d. Dauerheilg. d. Tb. Tübingen, Pietzker, 1904.
- Kraus H., Üb. prämenstr. Tempsteiger. b. Lgtb. W. m. W. 1905, p. 610.
- Krehl L., Unsere gegenwärt. Kenntn. üb. d. Bezieh. d. Wärmeproduktion i. Fieber. XVI. Cgr. f. i. M. i. Wiesbaden 1898. Pr. m. W. 1898, p. 414.
- Krokiewicz, Zur E. Diazoreakt. i. Harne. W. kl. W. 1898, Nr. 29, p. 703.
- Krönig G., Zur Topograph. d. Lungenspitzen u. i. Perkussion. B. kl. W., 1889, Nr. 37.
- Kurlow, Üb. d. Heilbarkeit d. Lungentub. A. f. kl. M. 1889, Bd. XLIV.
- Kurz, Üb. Reflexhusten. D. m. W. 1888, Nr. 13, S. 247.
- Kutty D., Zur Kenntn. d. Temperaturschwank. b. Lungenschwinds. während d. Heilstättenbehandlg. Z. f. diät. Th., Bd. VI, H. 9, p. 513, 1902. M. m. W. 1903, p. 262.
- Laache, Die Anämie. Christiania 1883.
- Lacker, D. Bestimmung d. Hb.-Gehalts i. Blut mitt. Fleischschen Hämatometers. W. m. W. 1886, Nr. 27, S. 960.
- Laënnec, zitiert v. Kurlow.
- Landgraf, Üb. ei. F. v. Tub. etc. D. m. W. 1892, p. 506. Berl. laryng. Ges., 29. Mai 1891.

- Lasker A., Bakt. Blutunters. b. Lungenphthise m. reichl. Lit. D. Ä. Ztg. 1901, p. 27.
- Laub, Ein Beitr. z. Fr. d. akut. tb. Rheumat. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 421.
- Lauver K., Üb. d. Wirk. d. tb. Erkr. a. d. Ernähr. d. menschl. Körp. I. D. Bonn 1905.
- Lawson, Üb. d. Temperat. d. Phthise. Edinb. Medico, Chirurg. Soc. 1901. M. m. W. 1902, p. 258.
- Lebert, Handb. d. prakt. Med., Tübingen 1859. — Lehrb. d. Skrofel- u. Tuberkelkrankh. Deutsch v. Röhlcr, Stuttgart 1851.
- Ledoux S. A., Contrib. à l'ét. du pouls dans la tub. pulm. Th. Paris 1902.
- Lemoine G., Les phthis. gras. S. m. Nr. 13, 1900/103. D. m. W. 1900, L. B., p. 78.
- Leriche, Rhum. chron. tub. à prédom. synov. Lyon méd. XXXV, 1903, Nr. 11, p. 421.
- Lesage L., Contrib. à l'ét. des névrites sensitivo-motrices de la tub. pulm. histor., étiol. pathog. symptom. Th. Paris 1900.
- Letulle M., Essai sur la psychol. du phthis. A. gén. de méd. 1900/257.
- Letulle M. et Pampilian M., Ét. graph. des mouvem. respirat. dans la tub. pulm. C. r. biol. 1902, No. 16, p. 523.
- Leubuscher, Üb. d. Fettabsondg. d. Körpers. XIII. Cgr. f. i. M. Karlsbad. C. f. i. M. 1899, p. 478.
- Lévy L., Blutdruckmess. an Tub. B. z. Tb., Bd. IV, 1905, p. 99. — Basedow-Sympt. b. Tb. B. z. Tb., Bd. IV, p. 105.
- Levy-Dorn, Verwendbarkeit d. Röntgenstrahl. i. d. prakt. Medizin. D. m. W., 8. Februar 1897. — Ein Asthmatischer i. Röntgenbild. B. kl. W. 1896, Nr. 47.
- Leyden u. Fräntzel, Ber. üb. d. Erg. d. Sammelf. betr. Heilung d. Lungenphthise. Z. f. kl. M., VIII, 1884, p. 580.
- Leyden, Üb. Poliomyelitis u. Neuritis. Z. f. kl. M., Bd. I, S. 387—434.
- Leyden u. Jaffé, V. A., Bd. LV, S. 239.
- Leyden u. Merkel, C. f. kl. M. 1883, Nr. 8 u. 12.
- Liebermann, Ätiol. u. Behandlg. d. Lungen- u. Kehlkopfphthise.
- Lichtheim, Z. diagn. Verwert. d. Tb. B. F. d. M. 1883, Nr. 1. — Die Störungen d. Lungenkreislaufes. Berlin 1876.
- Lienard, Contrib. à l'ét. de la dilat. du cœur droit chez les tub. I. D. Paris 1886.
- Limbeck R. v., Zur Lehre v. d. Nachtschweißen d. Phthis. Pr. m. W. 1894. — Grundriß einer kl. Patholog. d. Blutes. Jena 1896, G. Fischer.
- Lionnet A., L. arthropath. rhumatif. au cours d. l. tb. pulm. chez l'enfant. Th. Paris 1904.
- Litten, Demonstr. trommelschlegelart. Finger u. Zehen. Vh. d. Berl. med. Ges. 1897, S. 62. B. kl. W. 1897. — Grob. Reibegeräusch. V. f. i. M. z. Berlin 1899, p. 275. D. m. W. 1899, V. B., p. 46.
- Lohsse H., Ein Fall v. hochgr. Rechtsverlagerung d. Herz. infolge rechtseit. Lungenschrumpfg. M. m. W. 1901, Nr. 34, S. 1345.
- Londe P. u. Brécy M., Tub. mil. aiguë hémorrhag. Gz. hebd. 1902, No. 30, p. 337. C. f. i. M. 1902, p. 1078.
- Louis, Clin. méd. de la Pitié, Janvier 1836.
- Lövinson E., Üb. d. E.' Diazor. insb. b. d. Lungenphthise. I. D. Berlin 1883.
- Loew Johann, Zur Klin. d. terminal. Blutungen. W. m. W. 1900, p. 1079, 1125.
- Löwenthal, Üb. Hämoptoë intermittens b. Phthise. Z. f. kl. M. 1888, Nr. 39. C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 23.
- Luchsinger, Neue Vers. z. Lehre v. d. Schweißsekretion. Pflüg. Arch. 1877.
- Mackenzie I., Üb. Nasenhusten u. d. Vorhandensein einer Reflexzone i. d. Nasenschleimhaut. J. de méd. de Paris, November 1883. Jb. f. Khlk. 1884, Bd. XXI, S. 515.
- Mader, Beiträge z. Auskult. d. Herz. u. d. groß. Gefäße (tub. Prozesse d. Lunge). W. m. W. 1903, Nr. 1.

- Maercks G., Abgelaufene Tb. I. D. Kiel 1896.
- Mailland, Lyon, Der tb. Rheumatism. Pr. méd. 1901, Nr. 74. M. m. W. 1902, p. 76.
— Rhum. tub. ou pseudorhumat. infect. d'orig. bac. Gaz. hebdom. 1900/1045. —
Rhum. tb. et tb. inflamm. A. gén. méd. Ann. 82, 1905, p. 1496. — Rhum. artic. aigu. tb. Lyon m. 1905, p. 397.
- Maixner, 2 F. v. paradoxen Puls. Pr. Vj., 1879, p. 87.
- Malassez M. L., Rech. sur la richesse du sang en glob. rouges chez les tub. Progr. méd. 1874, No. 38; Jb. d. ges. M., 1874, I. Teil, S. 339.
- Manasse, Diss. Freiburg 1891.
- Maragliano E., Exp. Beitr. z. Kenntn. d. tub. Toxämie. Z. f. Tb. 1900/287. — Giftigk. d. Blut. u. Urins v. Tub. Gaz. degli osped. 1900, Juni. B. kl. W. 1901, L. B., p. 1.
- Maragliano V., Üb. Tb. B. im Urin. M. m. W. 1904, p. 1166; Gaz. d. osp. 1904, Nr. 7.
- Marek, Budapest, Üb. d. Entstehungsw. d. Atemgeräusche. D. m. W. 1902, p. 610, 632.
- Marfan, Gastrische Störungen b. Tub., Cgr. z. Stud. d. Tub. b. Mensch. u. Tier. Paris, Sitzg. v. 27. Juli bis 2. Aug. 1891. — Traité de méd., t. IV. — Üb. d. Erniedrigung d. Blutdrucks b. d. Lgphthise. S. m. 1891, No. 26. D. M. Z. 1891, S. 774.
- Mariani Manuel, Heilbare Formen d. Lungentub. 14. int. m. Cgr. z. Madrid. (Formas curables de la tub. pulmonar.) 1903. M. m. W. 1903, 1, p. 967.
- Maricot J., D. l. phlegmatia alba dolens chez l. tb. Th. Paris 1899.
- Marié R., L'albuminurie massive chez les tub. A. gén. méd. 1903, T. I, p. 599.
- Martel, zitiert von de Renzi.
- Martin, Les phthis. gras. Th. Lille 1900.
- Marx, Die Grenzen d. norm. Temperat. Z. f. diät. Th. 1900, Bd. 3, p. 555.
- Massini, Über die Heilbarkeit der Lungenschwinds. A. f. kl. M. 1873, Bd. XI, S. 446.
- Mattei, Über die Kontagiosität des Schweißes der Phthisiker. Gz. méd. de Montreal, 1889. D. m. W. 1890, S. 164.
- Mauclaire, Le artrit. tub. ad andamento reumatico o reumatoidi. Boll. d. clin. 1903, p. 278.
- May und Lindemann, Üb. d. Entsteh. d. tympan. u. d. nichttympan. Perkuss.-Schalles. A. f. kl. M., Bd. LXVIII, H. 1 u. 2.
- Meissen E., Bericht üb. 208 seit 3—11 J. geh. geblieb. Fälle v. Lungentub. Z. f. Tb., 4., H. 2, p. 115. — Üb. d. Begriff d. Heilung d. Lungentub. Th. M. 1898/643. — Fieber u. Hyperthermie. B. kl. W. 1898, p. 511, 529.
- Mendelsohn M., Zur Psyche d. Tb. Z. f. Krkpf. 1900, p. 80.
- Merklen, Soc. méd. des hôp. 1887.
- Mery, Die intermitt. Albuminurie i. Kindesalter. III. frz. Cgr. f. Gyn., Gebh. u. Khlk. 1901. M. m. W. 1901, S. 1812.
- Meyer F., Bakterienbef. i. Blute v. Phthis. Berl. Ver. f. i. M. 1901. C. f. i. M. 1901, S. 710.
- Meyer Franz, Beitr. z. Bedeut. d. eosinophil. Zellen i. Sput. d. Tb., D. Ä. Z. 1901, Nr. 1.
- Meyer R., Die Ausscheidungsverhältn. d. Kalium- und Natriumsalze bei Karzinom, Kachexie und Phthise. D. m. W. 1901/625.
- Michaelis M., Üb. Diazoreakt. b. Phthisikern u. ihre prognost. Bedeutg. Z. f. diät. Th., 3. Bd., 2. H., 1899, p. 140; B. T. C., p. 722; C. f. i. M. 1899, p. 1221. — Üb. Diazoreakt. u. i. klin. Bedeutg. V. f. i. M. z. Berlin 1899; D. m. W. 1899, p. 156, V. B., p. 46.
- Michaelis M. & Meyer Fr., Bakterienbef. i. Blut v. Phthis. Char. Ann. Jg. XXII. p. 151. C. f. Chir. 1898, p. 572.
- Micheleau E., Hyperchlorurie et pleurésie tb. A. gén. méd. 1905, p. 1537.
- Michoff M., Contrib. à l'ét. de quelqu. formes de la tub. chez l'enf. Th. Montpellier 1902.

- v. Mikulicz, D. hysterisch. Ödem (Tb.), 76. Naturf. Vers. Breslau 1904. M. m. W. 1904, S. 1810.
- Mircoli Stefano, Psyche d. Tub. Gaz. d. osp., Nr. 90. D. m. W. 1900, L. S. 180. — Sulle responsabilita dei tub. Gaz. d. osp., Nr. 66. D. m. W. 1900, L. B., p. 135. — Eine vermind. gesetzl. Zurechnungsfähigk. tub. Kranker. Gaz. d. osp. 1900, Nr. 66. M. m. W. 1900, p. 1246. — Das latente Fieber b. d. chron. Tub. A. f. kl. M., Bd. 63, H. 1 u. 2, p. 163. — Üb. d. Temperaturerhöhg. b. Tub. Gaz. d. osp. 1899, Nr. 115. M. m. W. 1899, S. 1621. — Harnstoffstickstoff u. Basenstickstoff b. Ges. u. Tub. R. Acc. di Genova, 12. März. W. m. W. 1900, p. 2086. — Üb. d. Gerinnungsfähigk. d. Blutes b. Tub. 11. Ital. Cgr. f. i. M., Pisa 1901. D. m. W. 1901, p. (295), V. B. — Üb. Hyperglob. Gaz. d. osp. 1904, Nr. 79, M. m. W. 1904, S. 2021.
- Mircoli u. Soleri, Üb. d. Stoffwechsel b. Tub., B. kl. W. 1902, p. 800.
- Moeller A., Beitr. z. d. Gefäßgeräusch i. d. Lunge. B. kl. W. 1903, p. 490.
- Mohr H., D. Gelenksrheum. tb. Urspr. B. Kl. 1904, H. 197, p. 28.
- Mollard J., Rhumat. tub. Lyon méd. Année XXXV, 1903, p. 78.
- Mollière, Ét. clin. sur le purpura. Ann. de dermat. 1887, p. 231, 324.
- Moses L., Üb. d. Auskult. d. Flüsterstimm., B. z. Tb., Bd. IV, H. 2. M. m. W. 1905, S. 2190.
- Mouriquand Gg., Rhum. tb. infant. Gaz. d. hôp. 1904, p. 69.
- Moussous André, Die klin. Formen d. Tub. d. ersten Lebensalters. XIII. Intern. m. Cgr. 1900. Abt. f. Kdkrankh. W. kl. W. 1900, p. 949.
- Moutet A., Rhum. tb. ankylos.; spondylose rhizomelig. d'orig. tb. Th. Lyon 1904.
- Müller C. W., Die vitale Lungenkapazit. u. ihre diagnost. Verwert. Göttingen. I. D. Leipzig 1868.
- Müller Fr., Beiträge zur Kenntnis des Mucins u. einiger damit verbundenen Eiweißstoffe. Z. f. Biol., Bd. 42.
- Müller R. L., Gefäßgeräusche üb. d. Lungen. B. kl. W. 1903, p. 466.
- Naegelsbach W., Zur Kenntn. d. Blutung. b. Lungentub. Dtsch. Praxis 1900, p. 29. Z. f. Tb., I., p. 255.
- Naumann A., Beitr. z. Lungenblutg. Z. f. Tb., II., Bd. 2, 1901/218.
- Naumann H., Zur Psyche d. Tub.-Krankenpflege 1902/03, H. 2, p. 111. — Blutdruckmessungen an Lungenkranken. Z. f. Tb., Bd. 5, 1903, p. 118. — Zur Psyche d. Tub. St. Pet. m. W. 1901, Nr. 39, p. 435. C. f. i. M. 1901, p. 1190.
- Neubert, Ein Beitrag zur Blutunters. I. D., Dorpat 1889.
- Neumann, Dr., Bez. zw. Menstruation u. Lgtb. B. kl. W., Nr. 21, 1899, p. 459.
- Neumann, Beitr. z. Beleucht. d. Temper.-Verhält. b. Tb. nach leicht. Körperbewegung. Norsk Magaz. for Lægevid. 1903, Nr. 10. M. m. W. 1904, S. 277.
- Neumann S., Rep. on the gastric secret. in twelve cases of pulm. tub. etc. Albany med. news 1901, Mai. C. f. i. M. 1901, S. 925.
- Nishimura T., Üb. den Zellulosegehalt tub. Organe. A. f. H., 1894, Bd. XXI, S. 52.
- Norris G. W., Tachycardia in pulm. tb. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 295.
- Novalkovic, Ein Fall v. Aushusten kleiner Kalksteinchen aus d. Lunge. (Serbisch.) C. f. i. M. 1900, p. 1004.
- d'Oelsnitz M., La leucocyt. dans la tub. etc. Th. Paris 1903.
- Oestreich R., Die Perkussion d. Lungenspitze. Z. f. kl. M. 1898, Bd. 35, H. 5 u. 6.
- Oppenheim, Beitr. z. Kenntn. d. multipl. degen. Neuritis. Neur. Cgr. 1885, S. 544.
- Ostenfeld J., Z. Fr. d. Entfieb. Tb. B. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 319.
- Ott, Heilst. Oderbg., Zur Bedeutg. d. eosinoph. Zellen im Phthisikersput. A. f. kl. M., Bd. 68, H. 1 u. 2, 1902.

- Pal J., Üb. multiple Neuritis. C. f. m. W. 1891, Bd. XXIX, S. 618. — Venengeräusch a. d. recht. Lungenspitze, entst. i. d. Vena azyg. Paroxysmal. Tachykardie. C. f. i. M. 1903, Nr. 28.
- Panizza O., Üb. Myelin, Pigment u. Epithelien im Sput. A. f. kl. M. 1881, Bd. XXVIII, S. 344.
- Pansini, Bakteriolog. Studien üb. d. Auswurf. V. A. 1890, Bd. CXXII, S. 424. C. f. m. W. 1891, Bd. XXIX, S. 307—308.
- Papillon, Paris, Üb. d. Reakt. d. sympath. Nervensystem auf d. tub. Infekt. Ogr. gegen d. Tub. 1900. M. m. W. 1900, p. 709. — La neurasth. pré-tub. A. d. sc. méd. 1900, Nr. 1 u. 2. C. f. i. M. 1900, p. 919.
- Paradi F., Beitr. zur Kenntnis des Erdmetallgehaltes u. d. spezif. Gewichtes d. Sput. Siebenb. Museumver., 23. Juni 1899. W. m. W. 1900, p. 676.
- Parbier, Rech. sur la fièvre tub. La Tub. infant. 1900, Nr. I. Z. f. Tb., I, p. 524.
- Pascheles W., Zwei seltenere Komplik. d. chron. Lungentub. C. f. m. W. 1895, Bd. XXXIII, S. 654.
- Du Pasquier G., Les troubles gastr. dans la tub. pulm. chron. Th. Paris (Steinheil) 1903. Gaz. des hôp. Année LXXVI, 1903, Nr. 85, p. 857. D. m. W. 1903, L. B., p. 202.
- Patel M., Fréq. du rhumat. tub. dans les tub. viscé. et dans les tub. locales. Gaz. hebdom. 1902, p. 109, 313, 469. C. f. i. M. 1902, p. 1078, 1219. — Sur un cas de rhumat. tub. vertébr. aigu. Gaz. hebdom. 1902, Nr. 55, p. 637. C. f. i. M. 1902, p. 1077.
- Pavillard H., Rech. sur la leucocyt. dans la tub. pulm. Th. Paris 1900.
- Pechkranz S., Beitr. z. Ätiol. d. Hustens. W. m. W. 1899, Nr. 15, p. 703.
- Peiper E., Die Überernährung bei d. Lungenschwinds. A. f. kl. M., Bd. XXXVII.
- Pel K. T., Ein seltenes Gefäßgeräusch i. d. Lunge. B. kl. W. 1903, p. 337.
- Pelizoeus, I. D. Würzburg 1880.
- Pelnár J., Üb. d. Bedeutg. d. Zellenelemente i. Sputum, bes. b. d. Phthisikern. Böhm. Sbornik kliniky 1899, Bd. I; Z. f. Tb., II, p. 539. Z. f. Tb., III, p. 168.
- Pelzl C., E. 'Diazor. als diff. diagn. Hilfsmittel b. vorgeschr. Tb. W. kl. W. Nr. 31, p. 899.
- Pende M., Tödl. hyster. Hämoptysis. M. m. W. 1904, S. 1938.
- Penzoldt, Weiteres über den diagn. Wert der sogenannt. Diazor. B. kl. W. 1883, Nr. 49; C. f. m. W. 1884, Bd. IV, S. 52.
- Perroud, De quelques phénomènes nouveaux dans le cours de la phthisie pulm. Lyon méd. 1872, t. I.
- Peter, zitiert von Hérard, Cornil und Hanot.
- Petersson O. V., Kliniskt.-exp. studier öfver lung-tub. Nordiskt. med. Arch. 1900, Nr. 30, 33, p. 1. C. f. i. M. 1901, p. 275.
- Petrén Karl, Bidrag till den kroniska lungtub. klinik. Eira 1900, Nr. 9. Stockholm. Z. f. Tb., I, p. 347.
- Petri, Das Verhalten d. Harns Schwindsüchtiger (Diazobenzolsulfonsäure). Z. f. kl. M. 1883, Bd. VI, S. 472; C. f. m. W. 1884, Nr. 4, S. 51.
- Petruschky J., Spinalgie als Frühsympt. tub. Infekt. Naturf. Vers. Karlsbad 1902. II, p. 84. M. m. W. 1903, p. 364.
- Pfüttsch Hans, Üb. Psychosen i. Verlauf d. Typhus abdomin. I. D. Kiel 1903.
- Pick F., Lähmung d. linken Sympath. V. d. A. i. Prag. Pr. m. W. 1898, p. 57.
- Piéry, Mandoul & Ortal, Bac. d. Koch et hémoptys. C. r. biol., T. LVIII, 1905, p. 99.
- Pitres A. et Vaillard L., Des névrites périphér. chez les tub. R. de m. 1886, Nr. 3.
- Polánski W., Phys. Charakt. d. Tb., bes. d. Lgtb. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 140.

- Pollak E., Üb. nerv. Taubheit b. Lgtb. B. z. Tb., Bd. III, H. 5, p. 409.
- Poncet A., Rhumat. tub. ou pseudorhumat. d'orig. bac. Gz. d. hôp. 1901, Nr. 85/77. Lyon méd. 1901/101. C. f. i. M. 1901, S. 1188. Bull. de l'acad. de méd. 1901/194. — Rheumatismus tub. Paris. med. Ges. 1901. D. m. W. 1901, p. 294, V. B. — Rheumatismus tub. ankylopoëticus. Par. m. Ges., Juli 1903. D. m. W. 1903, V. B. p. 296. — Rhumat. tub. Morbus coxae senil. d'orig. tub. Gaz. des hôp., Nr. 136. D. m. W. 1903, L. B., p. 312. — Rhumat. tub. Polyarthrites et synovites. Gaz. des hôp. 1903, Nr. 8. — Rhumat. tub. abarticul. Localisat. viscé. et autres du rhumat. tub. Gaz. hebdom. 1902, Nr. 58. Bull. de l'acad. de méd. 1902, No. 28, p. 97—113.
- Poncet A. & Leriche R., Ankylos. tb. Rheumat. Ac. d. m. Okt. 1904. M. m. W. 1904, S. 2078. — D. ankylos. tb. Rheumat.; plastisch. Arthr. tb. Ursprungs. R. d. ch. Jan. 1905. M. m. W. 1905, S. 920.
- Portal, Observat. sur la nat. et le traitem. de la phthisie pulm. Paris 1809.
- Potain, La pression artér. de l'homme à l'état norm. et path. Paris 1902.
- Pouly R., Rapport de la tub. avec le rhumat. chron. déform. Th. Lyon 1902.
- Pratt, Notes on a case of purp. haemorrh. associat. with. gener. tub. Br. m. J. 1901, p. 865, 28. Sept. C. f. i. M. 1901, S. 1188.
- Preobraschensky, D. Rolle d. Nase etc. b. Bluthust. Pharyng. hämorrh. Russky Wratsch. 1904, p. 642. M. m. W. 1904, S. 1621.
- Procházka Frz., Üb. d. wechselseitige Bez. d. Unfalls u. d. Tb. Sbornik klinický 1901, II, 2, 1901/119. A. bohème de méd. clin. Z. f. Tb., II, p. 276.
- Proebsting, Über Tachykardie. A. f. kl. M. 1882, S. 349.
- Rabajoli C., Della diazoreaz. e del suo significato nella tub. Gaz. med. di Torino 1901, 26. sett.
- Raczynski Jan, Über Tb. b. Kindern. Jb. f. Kdhlk. 1901, p. 67, Bd. 54, H. 1, Przegląd lekarski Nr. 41/42. D. m. W. 1900, L. B., p. 175, 247, 256.
- Rancoule J., Contrib. à l'ét. des rapp. de la tub. et de l'arthrist. Th. Montpellier 1899.
- Ranke B., Reagensglas z. exakt. u. bequem. Darstellg. d. E. Diazor. F. d. M. 1899, Nr. 36.
- Rasmussen V., Fortgesetzte Beobacht. üb. d. Hämoptyse. Hosp. Tidende, 12. Jg., Nr. 11 u. 12; Nord. med. Arkiv, Bd. I, Nr. 12; Hirsch-Virchow, 1869, Bd. II, S. 101.
- Raviart u. Marlier, Subk. Emphysem b. ein. Phthisiker nach ein. heftig. Hustenstoß. Gaz. hebdom. 1898, Nr. 38. B. kl. W. 1899 L. p. 49.
- Raviart, Subkut. Emphysem infolge ein. tub. Larynxgeschwür. Soc. centrale d. méd. du Nord. März 1899. B. kl. W. 1899 L. p. 33.
- Rebaudi & Lionello, Üb. d. Entstehg. d. tb. Hyperglobul. d. Tuberkulininjekt. Gaz. d. osp. 1904, Nr. 70. M. m. W. 1904, S. 2021.
- Reger, D. Temp.-Kurven d. Tb., Vh. Dtsch. path. Ges. 1903, p. 231, Jena 1904.
- Regnault, Le cœur des tub. 1899.
- Reiche F., Üb. Bluthusten als Initialsymptom d. Lgschw. Z. f. Tb., Bd. III, H. 3, 1902, p. 222.
- Reineboth, Der Einfluß d. Erschütt. d. Brustkorbes auf d. Gefäße d. Pleura u. Lunge u. ein. Entstehungsmodus d. Hämoptye. M. m. W., Nr. 37, 1898. — Über Commotio thorac. u. einen Entstehungsmodus d. traumat. Hämoptye. Ver. d. Ä. z. Halle a. S. 1898. M. m. W. 1899, Nr. 14, S. 458.
- Reinert, M. m. W. 1897.
- Reinert E., Die Zählung d. Blutkörperchen etc. Leipzig 1891, F. C. W. Vogel.
- Rendu, Des anesthésies spont. Thèse d'agrég. 1875, p. 159. — Herpes zoster und Tb. Presse méd. 1893; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 572.

- Renk, Z. f. Biol. 1875, Bd. XI.
- Renon, D. rôle étiol. d. l. tub. ds. quelques cas d'asphyxie et d. gangr. symétr. d. extrémités (Syndrome d. Raynaud) 13. Intern. m. Cgr. Paris 1900. M. m. W. 1900, p. 1318. W. kl. W. 1900, p. 866, B. kl. W. 1900, p. 852.
- de Renzi E., Pathog., Symptomat. u. Beh. d. Lggeschw. Wien 1894, A. Hölder.
- de Renzi, Coop. Tonus d. Muskeln b. Tb. Anti-T. C. i. Neapel 1900. W. m. W. 1900, p. 1332.
- de Renzi, Boeri, Üb. d. Schweiß d. Phthisiker. Anti-T. C. Neapel 1900. W. m. W. 1900, p. 1332.
- Revillet L., La toux nas. chez les tub. Lyon méd. 1900/302.
- Revilliod, Einteil. d. Formen d. Lgtb. Franz. Int. Cgr. April 1898. W. m. W. 1898, p. 1417.
- Reynaud, L'Hypotension artér. et sa valeur clin. dans les états tox. et infect. Paris 1901. — Contrib. à l'ét. de la douleur phrén. au cours de la tub. pulm. Th. Paris 1901.
- Riebold G., Üb. eigentüml. Delir. b. Phthis. M. m. W. 1904, S. 511, Discuss., S. 537.
- Riegel, B. kl. W. 1875.
- v. Rigler Gustav, Das Schwanken von Alkalizität d. Gesamtblutes u. d. Blutser. bei versch. ges. u. kranken Zuständ. C. f. B., 30, S. 823, 862, 912, 948.
- Rille I. H., Morph. Veränd. d. Blut. b. Syphilis u. einigen Dermatosen. Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 188.
- Rilliet et Barthez, Rech. anatomo-path. sur la tuberculisat. des ganglions bronch. chez les enfants, 1840—1842.
- Rindfleisch E., Chron. und akute Tb. v. Ziemssens Hb. 1877, Bd. V, 2. Aufl.
- Rivier P., D. l. Diazor. de Ehrlich. Th. Paris. G. Steinheil 1898. C. f. i. M. 1899, p. 1222.
- Robert, Purpura hémorrh. et tb. chron. Th. Paris 1904.
- Robin Albert et du Pasquier, La sécrét. gastr. dans la tub. pulm. chron. C. r. biol., T. LV, 1903, p. 743.
- Roché H., Caries dent. multipl. b. Tb. Prog. m. 1900, Nr. 29. D. m. W., L. B., p. 179.
- Roemisch W., Purpura haemorrh. bei Lungentub. M. m. W. 1902, p. 66.
- Roepke, Die Anl. u. Führ. d. Krankenjour. in d. Heilstätt., Belzig Z. f. Tb. 1901, Bd. II, p. 325.
- Rogée, Essai sur la curabil. de la phthisie pulm. etc. A. gén. de méd. 1839, 3. serie, t. V.
- Rohden, Bem. üb. meteor. Reaktion b. Phthisikern. B. kl. W. 1870, Nr. 16 u. 17.
- Romberg, Wie entsteht die Herzschwäche bei Infektionskrankheiten? 67. Naturf. Vers. in Lübeck; D. M. Z. 1895, S. 930.
- Rome, Rhumat. tub. Hydrocèle essentielle, d'orig. tub. Gaz. hebd. 1902, p. 1093.
- Rosen R., Üb. d. Atm. b. Lungentub. Z. f. Krkpf. 1900, Jän., p. 23, Z. f. Tb., 1, p. 254.
- Rosenbach O., Üb. d. Auskultat. d. Resp.-Appar. u. Bem. z. Path. d. Lungenphthis. Ä. Praktiker 1893, Nr. 22; M. m. W. 1902, p. 131. — Üb. pseudopulmon. u. pseudo-pleur. Geräusche (Muskelknacken etc.). W. kl. R. 1899, Nr. 26. — Üb. nervös. Husten u. seine Beh. B. kl. W. 1887, Nr. 43; C. f. m. W. 1888, Bd. XXVI. — Die Erkr. d. Brustfells. Nothnagels spez. Path., Bd. XIV, 1. T., Wien 1894, A. Hölder.
- Rosenfeld H., D. Diagnostik inn. Krankh. mittels Röntgenstrahlen. Wiesbaden 1897.
- Rosenstein L., Vorkommen des Tb. B. im Harn. C. f. m. W. 1883, Nr. 8, S. 65.
- Rossi G., Sull rapporto tra la tub. e le neuropatie. Gaz. d. osp. 1899.
- Roth G. G., Üb. d. subj. Beschwerden i. Beginne d. Phth. I. D. Marburg 1903. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 282.

- Rothschild D., Z. Char. d. Thorax paralytic. St. Pet. m. W. 1900, Nr. 18; Z. f. Tb., 1, p. 346.
- Rueff L., D. l. tb. emphysémat. (emphys. général. au cours d. l. tb. pulm.) Th. Nancy 1903.
- Ruehle H., D. Lgschw. u. d. ak. Miliartub. v. Ziemssens Hb. 1877, Bd. V, H. 2, 2. Aufl.
- Sabourin Ch., Die mangelh. Heil. d. Lgtb. R. d. m. März 1903; M. m. W. 1903, 1, p. 875. — D. Menstruationsfieb. d. Phthisik. R. d. m. März 1905. M. m. W. 1905, S. 1409.
- Salinas Pablo, Üb. Tub. in d. Entwicklungszeit. 14. Int. m. Cgr. z. Madrid 1903. M. m. W. 1903, 1, p. 1009.
- Salomon, Üb. d. Vork. v. Glycogen i. Eiter. Verh. d. phys. Ges. Berlin 1877/78, p. 17, Ref. i. Malys Jb. 1879, Bd. VIII, S. 55.
- Salter A., The elimination of bact. toxins etc. Lanc. 1898, 15. Jän. — Die Ausscheidung v. Bakterientox. durch die Haut mit bes. Betonung d. Anwes. v. Tuberkulin im Schweiß d. Phthis. Lanc., 15. Jän. M. m. W. 1898, p. 220.
- Santini, Üb. d. Toxizität tub. u. einfach eitrig. Auswürfe. 11. Ital. Congr. f. i. M., Pisa 1901. D. m. W. 1901, p. 295, V. B.
- De Santos Saxe, The psych. relat. of. tb. in fact and fict. N. Y. m. J. 1. u. 8. Aug. 1903. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 278.
- Sarda, D. l. tb. pulm. chez. les arthritiques. Cgr. Montpellier 1897.
- Sawyer J., The use of inspect. in diseases of the lungs and pleurae. Br. m. J., 6. Juli 1901. D. m. W. 1901, p. 181, L.
- Schaeffer M., Zur Diagn. d. Lungentub. D. m. W. 1883, Mai, S. 307.
- Schaumann, Üb. d. Häufigkeit u. kl. Bedeutg. d. Pupillendiff., nebst einig. spez. Bemerk. üb. d. sog. „springende Mydriasis“. Z. f. kl. M. 1903, Bd. 49, H. 1—4.
- Schetty F., Unters. üb. d. Magenfunktion b. Phthis. pulm. A. f. kl. M. 1889, Bd. XLIV, S. 219; C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 557.
- Schirmer, Noch einmal d. Meth. d. Pupillenunters. D. m. W. 1902, p. 412.
- Schlenker, Üb. d. Häufigkeit tub. Veränd. in menschl. Leichen. V. A. 1893, Bd. CXXXIV.
- Schloßmann (Dresden), Üb. Tub. im frühen Kindesalter. 74. Naturf. Vers. 1902, p. 33, Karlsbad, M. m. W. 1902, p. 1676.
- Schmidt R., Zur kl. Path. d. periph. Nervensyst. b. Lungentub. mit spez. Rücks. auf Arthroparästhesien. W. kl. W. 1899, Nr. 27; M. m. W. 1899, Nr. 29, S. 969.
- Schmidt Ad., Üb. Herkunft u. chem. Natur d. Myelinenformen d. Sput. B. kl. W. 1898, p. 73.
- Schneevogt, Üb. d. prakt. Wert d. Spirometers. Z. f. rat. M., N. F., Bd. V.
- Schneider L., Üb. eine merkwürd. Schallerschein. b. Pneumothorax. Ver. Freib. Ä. 1899. M. m. W. 1900, p. 204.
- Schnyder, Ein Beitrag zur Lehre vom Husten. Cor. f. Sch. Ä. 1882, Nr. 7.
- Schröder u. Naegelsbach, Diazoreakt. im Harne u. Bakterienbefunde im Blute v. Phthis. M. m. W. 1899, p. 1339, 1380.
- Schroen v., Neapel, Üb. d. Bezieh. zw. alten tub. Herden i. d. Lungensp. u. d. croup. Pneumonie. C. geg. d. Tub. 1900. M. m. W. 1900, p. 710.
- Schroetter v., Zur Heilbark. d. Tub. Z. f. Tb., I., 1900/17.
- Schultze Ernst, Harn-Albumose nach Injekt. v. Tuberkulin b. Phthis. A. f. kl. M., Bd. 58, p. 325. — Weitere Erfahr. üb. d. Bez. zw. Fieber u. Albumosurie. A. f. kl. M., Bd. 60, p. 55.
- Schultze K., D. Verhalt. d. Vitalkapaz. b. Lgtb. I. D. Leipzig 1905.
- Schultzen, Das Verhalten d. örtl. Veränderg. d. Lungenspitze. Die Volksheilstätte Grabowsee. Berlin 1899.
- Seognamiglio u. Smiraglia, Eine neue Unters. Meth. b. Herz- u. Aortenkrankh. (Lungenkavernen). 14. Int. med. Congr. z. Madrid 1903. M. m. W. 1903, p. 919.

- Scott, Peripher. neuritis of tub. orig. Br. m. J. 1902, 16. Aug.; C. f. i. M. 1902, S. 1151.
- Sée G., Die baz. Lungenphthise. Berlin 1886, Gustav Hempel. — De la phthisie bac. des poumons. 1883.
- Seifert O., Lehrb. d. Kinderkrankh. v. C. Gerhardt, Bd. II, Tübingen, H. Laupp, 1899.
- Senator H., Üb. d. Kalkausscheid. im Harn d. Lgschw. Ch. A. 1882, t. VII. p. 397.
- Sequer J., Le coeur des tub. Th. Paris 1903.
- Shermann, A study of the blood in 73 cases of tub. bone disease in children etc. (Tub. Knochenkrankh.) Occident. med. Times 1897, Mai; C. f. Chir. 1897, p. 885 (Beil).
- Shively Henry L., The physiol. of chron. pulm. tub. A. charact. peculiar. in the appearance of the nose. Phil. m. J., 1. Sept. 1901; Z. f. Tb., I., p. 430.
- Siebenmann F., Ein Fall v. Lungentub. m. retrolabyrinthärer Neuritis interstit. bei d. Schneckenerven etc. Z. f. Ohr., Bd. XLIII, Jubil. Bd., Bezold, 1903, p. 216; D. m. W. 1903, L. B., p. 63; W. m. W. 1903, II, p. 1928.
- Simon G., Üb. die Menge d. ausgeatm. Luft bei verschied. Mensch. Gießen 1848.
- Skulteki, J. tub. davanti alla legge. Gaz. d. osp. No. 96. C. f. i. M. 1900, p. 1100.
- Smith R. C., Tb. B. im Urin. Lanc. 1883, I, p. 942.
- Smith E., Med. chir. transact., Vol. XXXIX; A. f. wissensch. Heilk. 1858, H. 4.
- Sobotta E., Üb. d. Fieber im Verl. d. Lungentub. F. d. M., Bd. XXI, 1903, p. 561. D. m. W. 1903, L. B., p. 228.
- Sokolowsky A., Üb. die fibröse Form d. Lungenschwinds. A. f. kl. M. 1885, Bd. XXXVII, S. 433.
- Sokolowski A. u. Greiff F., Üb. d. Vork. v. elast. Fasern im Auswurfe v. Lungenschwindsüchtigen. D. m. W. 1878, p. 66.
- Sörensen S., Undersøgelser om Antallet of røde og hvide Blodlegemer under Forskjellige physiolog. og path. Tilstande. Kjöbenhavn 1876.
- Sorgo J., Üb. d. Ätiol. u. Prophyl. d. Nachtschw. Tub. W. m. W. 1904, p. 2462. — V. d. Armstellungen beeinfl. Differ. d. Radialpuls. b. schrumpfend. Prozessen im Thoraxraum. W. kl. W. Nr. 50. M. m. W. 1904, S. 2336.
- Squire J. E., The „physiolog.“ differ. between the two sides of the chest. Br. m. J., 23. Mai. D. m. W. 1903, L. B., p. 142.
- Stadelmann, Klin. u. therap. Unters. b. Phthisis pulm. D. m. W. 1901, Nr. 26, p. 411/426, p. (183) V. B.
- Staehelin August, Üb. den Einfluß d. Muskelarb. auf d. Herztätigk. mit bes. Berücks. d. Erholungsvorg. u. d. Gewöhn. d. Herzens an eine best. Arbeit. A. f. kl. M., Bd. 59, p. 79.
- Stanculescu St., E. F. v. Granulie, kompliz. mit allg. subk. Emphys. Spitalul 1905, Nr. 4. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 575.
- Statham S. C. B., The low phosphates and urea in the urine of the tub. Lanc. 1903, Vol. 1, No. 3, p. 199; C. f. B., Bd. 33, p. 57.
- Staudacher, Üb. Lungenspitzenerrhose. I. D. München 1884.
- Steffen, Beitr. zu Indikanurie-Ausscheid. bei Kindern. Jb. f. Khlk. 1892. Bd. XXXVI, S. 18; Jb. f. Khlk. 37, 1.
- Steinert H., Z. Kenntn. d. Polyneurit. d. Tb. B. z. Tb. 1904, Bd. 2, H. 4.
- Stern R., Üb. Lungensteine. D. m. W. 1904, Nr. 39, p. 1414.
- Stevens M. L., Quantit. changes in the blood in pulm. tub. Med. Rec. 1902, Vol. 62, Nr. 4, p. 133.
- Stich E., Die Erblichkeit und Heilbarkeit d. Tb., A. f. kl. M. 1888.

- Stieker G., Lungenblut., Anämie u. Hyperämie d. Lunge etc. Noth. Handbuch d. spez. Path., Bd. XIV, T. II, Abt. 4, Wien (Hölder) 1900. — Die semiot. Bedeutg. des Frédéricq-Thompsonschen Zahnfleischsaumes in der tuberkulösen Phthise. M. m. W. 1888, Nr. 37.
- Stockvis, Die Phosphorsäure-Ausscheid. d. Lgschw. B. kl. W. 1879, Nr. 41, S. 620.
- Strauer, System. Blutunters. b. Schwinds. u. Krebskranken. Z. f. kl. M., Bd. XXIV, S. 295.
- Strübing P., Zur Lehre vom Husten. W. m. Pr. 1883, Nr. 44 u. 46; C. f. m. W. 1884, Bd. XXII. — Üb. Hust. u. Auswurf. E. v. Leydens u. F. Klemperers. D. Klinik. Urban & Schwarzenberg, Berlin u. Wien 1901, 4. Lief., Bd. IX, 1. Abt.
- Strümpell, Z. Kenntn. d. multipl. degen. Neuritis. A. f. Psych. 1883, Bd. XIV, S. 339.
- Sudakoff J. W., Üb. Bakterienausscheidg. m. d. Schweiß bei einig. Infektionskrankh. Wratsch 1898, Nr. 25. C. f. B., 25, S. 575.
- Szekely A. v., Die Behandl. d. tb. Lungenschwinds. Berlin 1894, A. Hirschwald.
- Tarchetti, Sull' iperglobulia tb. Gaz. d. osp. 1905, Nr. 154, Z. f. Tb., Bd. 7, S. 565.
- Tauber & Bernd, Üb. spin. Veränd. b. Polyneur. d. Tb. Z. f. Heilk., Bd. XXVI, 1905; M. m. W. 1905, p. 2189.
- Teichmüller W., Das Vork. u. d. Bedeutg. d. eosinophil. Zell. i. tb. Sput. C. f. i. M. 1898, Nr. 13, 20. A. f. kl. M., 60. Bd., 6. H., p. 586.
- Teissier fils, Associat. franç. pour l'avancem. des sc. 1875.
- Teissier Lyon, Üb. intermitt. Album. i. Kindesalt. v. Gesichtsp. ihres Zusammenh. m. tb. Hered. od. als Vorzeich. d. Infekt. Paris. T. C. 1905; M. m. W. 1905, S. 2200.
- Thévénot, Rhumat. tub. Lyon méd. Année XXXV, 1903, p. 1094.
- Thompson Th., Clin. lectures on Pulm. consumpt. London 1854.
- Thorel, a) Dreilappenbild d. linken Lunge; b) Hypoplasie d. rechten oberen Lungenlappens. (Ausgeh. Tb.) Ä. Ver. i. Nürnberg, Nov. 1902. D. m. W. 1903, V. B., p. 28.
- Tompofolsky E., Essai sur le rhum. tb., Th. Montpellier 1903.
- Trébeneau C., Fréqu. du rhumat. articul. tub. dans les tub. viscé. et dans les tub. loc. Th. Lyon 1902.
- Treupel G., Üb. Täusch. b. d. Ausk. d. Lung. Ver. Freib. Ä. 1897. M. m. W. 1898, p. 377.
- Truhart, Tub. m. Sehstörungen. Med. Gesellsch. z. Dorpat. Pet. m. W. 1899, S. 256.
- Tschernoschwarz N., Ein Fall v. multipl. Neuritis nach Influenza. Djetskaja Medicina Nr. 3—4. Pet. m. W. 1900, p. 57.
- Turban, Einheitl. Unters.-Nomenklatur u. einheitl. Klassifik. d. Lungentb. als Grundlage internat. Verständigung. Ber. d. I. intern. Tub. Conf., Berlin 1902, p. 281. M. m. W. 1902, p. 1858. — Beitrag zur Kenntnis d. Lungentb. Wiesbaden 1899.
- Ughetti Catania, Üb. d. paradoxe Tatsache d. Fiebers ohne Temp.-Erhöh. d. „apyret. Fieber“. Rif. med. 1899, Nr. 296. M. m. W. 1900, p. 743.
- Uhthoff, XIII. intern. med. Congr.
- Upton Ch., The diazo react.; its value as a prognost. sign in pulm. tub. J. of Tub. 1902, Vol. 4, p. 366.
- Utéza S., Contrib. à l'ét. de la polynévrite tub. Th. Toulouse 1903.
- Vaissade J., De la névralgie faciale tub. Th. Lyon 1902.
- v. d. Velden R., Lg.-Randgeräusche. A. d. m. Polikl. z. Marburg. B. z. Tb., Bd. IV, 2. H.; M. m. W. 1905, S. 2190.
- Venn H., Üb. einen Fall v. multipl. degenerativ. Neuritis bei Tb. I. D. Berlin 1889.
- Vibert, Étud. exp. et clin. sur la tub., 1887, fasc. 2, p. 356.
- Vierordt, Beitr. z. Studium d. multipl. degenerat. Neuritis. A. f. Psych. u. Nervkr. 1883, Bd. XIV, S. 678.

- Villa, Contrib. sperim. allo stud. della tossiemia nella tub. Gaz. d. osp. 1898 Nr. 148.
C. f. i. M. 1899, p. 521.
- Villedieu G., Sciatique d'orig. tub. Th. Lyon 1902, mit zahlr. Literatur.
- Volland. Die Lungenschwindsucht. Tübingen 1898.
- van Voornveld J. A., Febris intermenstrual. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 543.
- Waldenburg L., Die pneumat. Behdlg. d. Respirations- u. Zirkulationskrankh. im Anschl. an d. Pneumatometrie u. Spirometrie. Berlin 1880, 2. Aufl., S. 108 ff.
- Walsham H., Myoidema in pulm. tub. Lanc. 1900, p. 230. C. f. i. M. 1900, p. 967.
- Wanner F., Beitr. z. Chemie d. Sput. A. f. kl. M. 1903, Bd. 75, H. 3—6. M. m. W. 1903, 1, p. 1000.
- Wassermann, W. Ges. d. Ä. Ref. B. kl. W. 1897, Nr. 6.
- Weber Hermann, Üb. psychische Störungen b. Herzkr. I. D. Jena, März 1902. M. m. W. 1902, p. 763.
- Weber, Parkes F., Arrested pulm. tub. chiefly from the clinic. point of view. Z. f. Tb., Bd. 5, 1904, p. 213.
- Weicker, Mitteilungen 1898.
- Weiß Hugo, Das Wesen d. wichtigst. Störungen d. Magentätigk. b. d. chron. Lungenschwinds. (Preisgekr. Arbeit.) I. D. Dez. 1901, Leipzig. M. m. W. 1902, p. 1479.
- Went, J. C., Eenige beschouwingen over het nachtzweet by longtub. I. D. Amsterdam. Z. f. Tb., III, p. 441.
- Widstrand A., Stud. üb. d. Diazor. b. Lgphthise etc. Hygiea 1904, Nr. 8; M. m. W. 1904, p. 1758; Z. f. Tb., Bd. 7, p. 94.
- Wiechel, Ätiol. der hämorrhag. Diathesen mit bes. Berücks. ders. bei Lungentb. Diss., Greifswald 1897.
- Wieting J., Ein F. v. ischäm. Rückenmarkaff. b. tb. Spondyl. Z. f. Ch., Bd. 70, 1903, p. 112.
- Williams Francis H., Die Röntgenstrahlen in ihrer Anwend. auf Thoraxaffektionen. Am. J. of the m. sc. 1897, Dez.; M. m. W. 1898, Nr. 5, S. 154.
- Williams C. Theodore, A. clinic. lect. on the arrest of pulm. tub. Br. m. J., July 6, 1901. D. m. W. 1901, p. (181) L. — A. lect. on the diagnos. of pulm. tub. Br. m. J. 1903, Nr. 2202, p. 589, Nr. 2238, p. 1317. D. m. W. 1903, L. B., p. 294, L. B., p. 78.
- Winternitz H., Üb. d. resp. Stoffw. b. d. chron. Lgtb. Th. d. G. 1904, April.
- Wintrich M. A., Krankheiten d. Respirationsorg. Virchows Handb. d. spez. Path. u. Ther., Erlangen 1854.
- Wittmaack, D. toxische Neuritis acustica. Z. f. O., Bd. 46, p. 1.
- Wolf H., Kritik d. Diazoreakt. W. m. Pr. 1899, Nr. 10. C. f. i. M. 1899, p. 1222. — Üb. d. Diazoreakt. W. m. Club v. 30. Nov. 1898. W. m. 1899, p. 26.
- Wolff, Saugmann, Mitteil. aus d. Brehmerschen Heilanstalt 1891, Wiesbaden.
- Wolff A., Die eosinophil. Zellen, ihr Vork. u. ihre Bedeutg. Ziegl. Beitr. 1900. Bd. XXVIII, H. 1. M. m. W. 1900, p. 1353. — Erfahrungen m. d. Perkussion d. Lungenspitze n. Kroenig. D. m. W. 1903, Nr. 6.
- Wood Francis Carter, The prognostic value of the Diazor. in pulm. tub. Med. News, Vol. 82, 1903, p. 631.
- Wyß O., Gerhardts Handbuch für Kinderkrankheiten, Bd. III, S. 807.
- Zanoni, Les pupilles chez les pneumon. Méd. mod. 1900, Nr. 21. C. f. i. M. 1900, p. 844.
- Zechnisen, Considér. sur l'examen phys. des sommets d. poum. chez le sold. Ref. a. d. Milit. Geneeskundy Tydschr. 1899, Nr. 2. D. mil.-ä. Z. 1900, p. 59.
- Ziehl, Z. Lehre v. d. Tb.B., insbes. v. deren Bedeutung f. Diagn. u. Progn. D. m. W. 1883, p. 62.

- Ziemssen H. v., Klin. Vorträge. V. Respirationsapparat. Z. Diagnost. d. Tb. Leipzig 1888. F. C. W. Vogel. — Aktinoskopische Mitteilungen. XVI. Cgr. für innere Medizin 1898, S. 310.
- Ziffer E., Zur Lehre vom hektischen Fieber. W. m. W. 1901/1166.
- Zuppinger, Zur Ätiolog. d. Pneumothor. i. Kindesalter. W. kl. W. 1902, p. 13.

Verlauf.

- Baginsky, Üb. infiltr. Tb. A. f. Khlk. V.
- Bard M. L., Des formes clin. d. l. tb. pulmonaire. Lyon. — D. l. phthisie fibr. chron. Paris 1879. (Baillièrre et fils.)
- Benecke, Die allg. Bindegewebshyperplasie. A. f. kl. M. XXIV.
- Blumenau M., Üb. d. ak. tb. (käsige) Pneum. Wratsch. Gas. 1903. Nr. 47. M. m. W. 1904, S. 357.
- Bouchut, Des fistul. pulm. cut. Gaz. des hôp. 1884, Nr. 50.
- Bowditch V. Y., Arrested. tub. J. Am. m. Ass., V. 41, 1903, p. 1203.
- Brow L., An. analys. of fifteen hundred cases of tb. J. Am. m. Ass. 1903, p. 1268.
- Canter Ch., Üb. Lungentb. (Pathog., Verlauf, Azidität d. Blut.) Rev. de m. 1904, April. M. m. W. 1904, S. 1443.
- Clark A., Clin. transact. V. I., p. 188.
- Daremborg G., Les diff. form. clin. et soc. d. l. tub. pul., pronost. diagnos. traitem. Paris (Masson et Cie.) 1905. — Infl. d. l. fonct. menstruelle sur la Phthisie A. gén. méd. Paris 1880.
- Frank A., Beitr. z. Lehre v. d. Beh. d. Lgschw. I. D. Göttingen 1894.
- Gairdner, On the path. anat. of bronchitis. Monthly J. of m. sc. 1850/51.
- Gregor K., Üb. d. Lok. d. Lungenerkr. b. Säugl. 20. Vers. d. Ges. f. Khlk. Kassel 1903, p. 268.
- Grünfeld F., Die Tb. d. erst. Kindht. Spitalul 1904, Nr. 4. M. m. W. 1904, S. 847.
- Guetschel J., L. guérison d. l. tub., sa possibilité, ses facteurs. Th. Lyon 1902.
- Guinard L., Ber. üb. e. Form d. intern. Verständ. bezügl. d. Grad. od. Stad. d. chron. Ltb. Tbs. 1904. Beil. H. z. Nr. 8, p. 35.
- Hauser G., Üb. ei. F. v. beiders. abgeh. Lgsptztb. m. Bronchiektas. bei gleichz. Tub. d. Kehlkopf. D. A. f. kl. M. Bd. 84, 1905, p. 99.
- Henoch, Vorles. üb. Kinderkrankh. III. Aufl., p. 68.
- Herz M., Üb. Lgtb. i. Kindesalter. Schnitzlers klin. Zeit- und Streitfragen. Bd. II, H. 9, 1888, p. 306.
- Hirtz, D. l'emphysème chez l. tuberculeuse. Th. doct. Paris 1878.
- Holmgren, Ett prakt. syst. för beteckn. af andningsljud på schabloner. Hyg. 1904, Nr. 5. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 281.
- Hughes H., Die Aufhell. tub. infiltr. Lungenteil. 25. Balneol. Cgr. Berlin 1904, p. 261.
- Klepetař D., Ein Beitr. z. Kas. d. Säuglingstb. Pr. m. W. 1905, p. 4.
- Kuss, Classificat. d. div. form. d. tb. pulm. chron. apyrét. Bull. med. 1904, Nr. 42, Z. f. Tb., Bd. 7, p. 470.
- Mulert, Üb. d. Heilung d. bazill. Lgschw. I. D. Greifswald.
- Perkins, Jay. Var. of pulm. tb. M. N. 1904, p. 744.
- Petit G., Les tub. pulm. cavit. fermées. Th. Paris 1905.
- Petrusehky, Krit. u. Kontrolle d. Heil. b. Lgtb. C. f. B., Bd. 35, Ref., S. 255.
- Powell, On consumption 1878.
- Quint, Üb. phthisische Lungenhautfisteln. I. D. Würzburg 1888.
- Schröder G., Üb. d. Fieber b. d. chron. Lgtb. D. M. Z. 1897.

- Sokolowski Alfr., Üb. d. fibr. Form d. Lgschw. A. f. kl. M. 1884 mit Literatur.
 Spengler K., Klassenstadieneinteil. d. Lgtb. u. Phth. u. üb. Tblinbeh. Kochs. Jena 1903.
 Stoeber H., Üb. ausged. Heilungsvorg. b. e. F. v. vorgesch. Lungen- u. Darmtb. I. D. Würzburg 1904.
 Strümpell, Üb. d. Fieber b. d. chron. Lgtb. M. m. W. 1892, Nr. 50/51.
 Weber F., Arrest. pulm. tub. chiefly from. the clin. point of view. Z. f. Tb., Bd. 5, Nr. 213.
 Williams. Pulmon. consumption 1871.
 Winkler, Z. Path. d. Tb. d. Kindesalt. Ergänzh. z. XV. Bd. 1905 d. C. f. path. Anat., p. 118.
 Wohlmuth, Zwei Fälle v. Lungenhautfist. W. kl. W. Nr. 32. M. m. W. 1904, S. 1525.

Diagnose.

- Abadie J., L'épreuve de la tblin dans le diagnost. des affect. tub. ou non tub. du système nerveux. C. r. biol. 1902, p. 1414.
 Adler Richard, Prag, Die therap. u. diagnost. Verwend. d. Tuberkulin. vetus Kochii. Ver. d. A. i. Prag 1902, 31. Oktober. W. kl. W. 1902, p. 1236. Pr. m. W. 1903, p. 25, 40, 51, 64, 76, 87, 101.
 Alexander, Üb. d. Krönigschen Schallfelder b. d. Lungenspitzentub. u. üb. d. Perkussionsschall d. Wirbelsäule. D. m. W. 1903, p. 552. M. m. W. 1903, p. 1397.
 Ambler P. C., Bemerkung. z. Frühdiagn. d. Lungentub. N. Y. m. J., 12. Febr. 1898. M. m. W. 1898, p. 468.
 Anderson T., McCall, The value of tub. in diagn. and treatment. Lanc. 16, Juni 1900. Z. f. Tb., I, p. 429. — A plea for the more gen. use of tblin. by the profession Br. m. J., 1. Oktober 1898; D. m. W. 1899, L. B., p. 50.
 Antze O., Üb. prim. Lungenkrebs. I. D. Kiel 1903.
 Arloing, Agglutinat. du bac. de la tub. vraie. C. r. Ac. d. sc., T. 126, Nr. 20, p. 1398. — Die Serumdiagn. b. d. Tb. d. Rindes. B. kl. W. 1901, p. 712. — L'agglutinat. du bac. de Koch par un serum specif. s'accompagne-t-elle d'une act. bacteriolyt. et bacterie. C. r. soc. d. biol. 1899/751. — Agglutinat. d. Tb. B. Mitteil. B. kl. W. 1899 (L. 53). Pet. m. W. 1899, p. 410. — Agglutin. Eigensch. b. Blute ein. Ziege nach wiederh. Injekt. v. Tuberkulin. Ac. d. sc. 31. Mai 1898. W. m. W. 1898, p. 2042. W. m. W. 1902, p. 283. Soc. de biol., 1. Juni 1901. — De l'infl. d. l. splénectom. s. l. marche d. l'infect. intra-vein. p. l. bac. d. l. tub. en cult. homog. C. r. biol. 1904, Nr. 35; C. f. B., Bd. 36, S. 621.
 Arloing S. u. Courmont P., Üb. d. Wert d. Serumreaktion f. d. frühzeitige Diagn. d. Tb. D. m. W. 1900, 766. Z. f. Tb., III, p. 173. — Du diagn. de la tub. par la séro-agglut. 13. Intern. m. Cgr. Paris, Aug. 1900. D. m. W. 1900, V. B., p. 236. — De l'agglutinat. du bac. de Koch; applicat. au sérodiagnostie de la tub. Z. f. Tb., Bd. 1, p. 11 u. 116. — De l'act. du froid ou des antisept. sur la conservat. des cult. homog. de bac. tub. destinées à l'agglutinat. C. r. biol. 1901, p. 1093. C. f. B., Bd. 33, p. 565. — Homog. Kult. d. Kochschen Baz. u. d. Serodiagn. d. Tb., Paris T. C. 1905; M. m. W. 1905, S. 2247.
 Ascoli V. e de Gregorio C., L'agglutinazione dei bac. tub. Policl. 1902, 25. Genn.
 Askanazy M., Echinokokkenzyste b. chron. Tb. V. f. wiss. Hlk. i. Königsberg i. Pr. 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 288.
 Auerbach Max, Zur Diagn. d. Lungenechinokokkus. D. Ä. Ztg. 1901, Nr. 23. Pr. m. W. 1902, p. 306.
 Babcock R. H., The diagn. of pulm. tub. J. of the Am. med. Ass. 1900/1015.
 Bade, Über d. Wert d. Röntgenuntersuch. b. d. Lungentub. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahl., Bd. V, H. 3. D. m. W. 1902, L. p. 71.

- Bahr dt, Üb. d. Bez. d. Tblin.-Empfindlichkeit z. tb. Prozeß. 77. Naturf. Vers. Meran 1905; C. f. B., Ref. Bd. 37, p. 549.
- Baldwin E. R., Differ. in precipit. produc. by. tb. b. J. of m. Research., V. 7, 1904, Nr. 2, p. 243.
- Bandelier, Üb. d. diagnost. Bedeut. d. alt. Tuberkulins. D. m. W. 1902, p. 357.
- Barbier H., Sémiologie prat. d. poumons et d. l. plèvre (Préface du Prof. Grancher). Baillière éd. Z. f. Tb., III, p. 359.
- Barcock, The diagn. of pulm. tub. J. Am. m. Ass. Nr. 16, D. m. W. 1900, L. B., p. 267.
- Barié E., Les faux cardiaques. S. m. 1903, Nr. 6. D. m. W. 1903, L. B., p. 54.
- Barjon et Cade, Examen cytolog. des épanchem. pleur. Lyon méd. Nr. 32, 11. Aug. 1901. C. f. i. M. 1901, p. 1117. — Formule cytolog. spéc. des pleurés. par infarctus chez les cardiaques. C. r. biol., 22. Juni 1901. — Contrib. à l'ét. cytol. des plèvres tub. A. gén. méd., Aug. 1902. D. m. W. 1902, L. p. 293.
- Bäumler Ch., Zur Diagnose d. durch gewerbl. Staubinhalat. hervorgeruf. Lungenverändg. M. m. W. 1900, p. 402, 525. — Lgschw. u. Tb. D. m. W. 1899/330. C. f. i. M. 1900/79. Z. f. Tb., I, p. 77. — D. Einfl. v. Lgtb. auf d. Kreislaufsorg. M. W. 1901, Nr. 29. — Üb. d. Einfl. v. Anomalien d. Brustskeletts a. d. Perkuss. d. Lge. u. a. d. Lage d. Herz. M. m. W. 1904, S. 1329. — The early diag. of. tub. of the lungs. Br. m. J. 1904, Nr. 2257, pag. 769.
- Beck M., Üb. d. diagnostische Bedeut. des Kochschen Tuberkulin. D. m. W. 1899/137. C. f. i. M. 1899, p. 893. C. f. B., Bd. 33, p. 564.
- Beck M. und Rabinowitsch, Über den Wert d. Courmontschen Serumreaktion f. d. Frühdiag. d. Tb. D. m. W. 1900/400. C. f. i. M. 1900/815. Z. f. Tb., III, p. 173 u. 1901/205. — Weitere Untersuch. üb. den Wert der Arloing-Courmontschen Serumreaktion bei Tb., spez. b. B. Tb. D. m. W. 1901, p. 145.
- Becker F., Bemerk. z. prognost. Bedeutg. d. Diazo-reaktion Tb. M. m. W. 1900, p. 1198.
- Béclère, Les rayons de Röntgen et le diagnostic de la tub. Paris, Baillière et fils 1899. M. m. W. 1899, S. 663.
- Beitzke H., Das Anreicherungsverf. z. Nachweis d. Tb. B. i. Sputum. H. R. 1902, p. 1. Hyg. R. 1902, Nr. 13, p. 639.
- Bendix E., Zur Cytodiagn. d. Meningitis. D. m. W. 1901, p. 746. — Zur Serodiagn. d. Tb. D. m. W. 1900/224. D. m. W. 1900, V. B., p. 70. Ver. f. i. M. 1899, p. 19.
- Bertarelli E., Über einen ziemlich seltenen Tuberkelsputumsbefund. C. f. B., Bd. 34, 1903, p. 411.
- Berton J., Tub. et lithiase rénales; essai s. diagn. diff. Th. Paris 1900.
- Betschart E., Üb. d. Diagn. maligner Lgtumor. a. d. Sputum. V. A. 1895, 142. Bd., p. 86.
- Bezançon F., Griffon V. & Philibert, Rech. du bac. tub. dans le sang par homogénéisation du caillot. C. r. biol. 1903, p. 35; C. f. B., Ref. Bd. 34, p. 132.
- Bezançon F., Griffon V., Rech. du bac. tub. dans le liquide céphalo-rachidien par la culture sur „sang gélosé“. C. r. biol. 1903, pag. 237.
- Bialyk M., Zur Diagn. d. Skrofulotub. i. früh. Kindesalt. I. D. Berlin 1905.
- Biedert Ph., Ein Verf., d. Nachw. vereinzelter Tb. B. zu sichern. B. kl. W. 1887, p. 30. — Zur Diagn. u. Behdlg. d. Tb., B. kl. W. 1891, p. 31. — Üb. d. Biedertsche (Mühlhäuser-Czaplewskische) Meth. z. Auffind. vereinzelt. Tb. B. H. R. 1905, p. 241.
- Bire F., Contrib. à l'ét. du diagnostic précoce de la tub.; étude clin. et ét. thérapeut. du syndrome gastro-intestinal. Th. Montpellier 1902.
- Birgelen, M. m. W. 1899, Nr. 15.
- Bluhm Agnes, Über d. Einfluß d. Lufttemperatur a. d. Temperat. d. Mundhöhle nebst Bemerkg. üb. d. Mess. im Munde. Z. f. Tb., II, p. 309.

- Blumentritt Fritz, Über ein neues im Menschen gefund. *Aspergillus* (*Aspergillus bronchialis* n. sp.) Ber. d. Deutsch. bot. Ges., Bd. XIX, 1900/442. C. f. B., 31, p. 366.
- van Bogaert et Klynens, d'Anvers, Diagnostie précoce de la tub. pulm. Z. f. Tb., 1900/44, 194.
- Boix, Franz. Ges., Okt. 1900. W. m. W. 1901, p. 1365.
- Bolton S. J., The X-rays as a diagnostic agent in pulm. condit. Br. m. J., 24. Okt. 1903. D. m. W. 1903, L. B., p. 274.
- Bonardi, Üb. d. Wert d. Inoskopie. Gaz. d. osp. 1904, Nr. 88; M. m. W. 1904, S. 2246.
- Bosin H., B. z. *Aspergillus*mykose d. menschl. Lg. I. D. Königsberg 1902.
- Botey R., Pseudo-Hämoptoe aus dem Nasenrachenraum stammend. Ann. des mal. de l'or. etc. 1901, Nr. 1. M. m. W. 1901, Nr. 15, S. 605.
- Bouyer C., De la tub. pulm. dans les Cystes hydatiques. Th. de Paris, Steinheil 1898. C. f. Ch. 1898, p. 1032.
- Bozzolo, Sulla diagn. precoce della tub. pulm. Riv. crit. d. clin. med. 1901, Nr. 25 u. 27. C. f. i. M. 1901, p. 1184.
- Braine-Hartnell J. C., On the value of the rect. temperat. in pulm. tub. Phil. m. J. 1901, Vol. 8, No. 25, p. 1094.
- Brandenburg K., Die Auswahl d. Krank. f. d. Lungenheilst. u. d. frühzeit. Erkenn. d. Lungentub. i. d. ä. Praxis. „Berl. Klinik“ 1902, H. 168, 169. B. kl. W. 1903, p. 481. Fischers med. Buchhandlg., Berlin 1902. — Üb. d. Frühdiagn. d. Lgtb. u. d. Auswahl d. Krk. f. d. Lungenheilst. Med. Ref. 1902, Nr. 49, p. 455.
- Brehmer H., Die Therapie d. chron. Lungenschw. Wiesbaden 1889, J. F. Bergmann.
- Breitung, Ein Fall v. Reflexhusten durch Fremdkörper i. Ohre. W. kl. W. 1901, p. 588. Z. f. Tb., III, p. 169.
- Brieger L., Üb. d. diagnost. u. therapeut. Bedeutg. d. Tb. B. u. a. Bakterien i. Ausw. C. f. i. M. 1900, p. 877. B. kl. W. 1900/272.
- Brieger L. u. Neufeld F., Zur Diagnose beginn. Tb. a. d. Sputum. D. m. W. 1900, p. 93.
- Brion Alb., Üb. Cytodiagnostik. m. Literatur. C. f. a. Path., Bd. XIV, Nr. 15—17. — Üb. d. Cytodiagnostik d. Cerebrospinalflüssigkeit b. tub. Mening. Unterelsäß. Ä. Ver. i. Straßburg. Juni 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 306. — Vers. ein. neu. Serumdiag. d. Tub. A. f. kl. M., Bd. 82, 1905, p. 603.
- Bronowski S., Z. Fr. d. Heilbark. d. Tb. i. Kindesalter (Kilka myśli w. kwestyi uleczałności gruźlicy u. dzieci), Medyc. 1902, Nr. 11, 12. D. m. W. 1902, L. B., p. 113. Z. f. Tb. III, p. 457.
- Brook B., Green, Stanley, Röntgenstrahlen b. d. Diagnose d. Phthise. Quarterly Med. Journ., Aug. 1903. M. m. W. 1903, II, p. 1979.
- Brunniche, Hospitals Tidende 1872. Gz. hebd. 1874.
- Buard G., Diagnostie précoce de la tub. et séroréact. tub. Gz. hebd. des sciences méd. de Bordeaux 1901, p. 26. C. f. i. M. 1901, S. 768. — De la séroréact. comme moyen de diagnostie de la tub; div. moyens de la prat. Gz. hbd. d. sc. m. de Bordeaux 1901, No. 30. C. f. i. M. 1901, p. 1186. — De la séro réact. tub., cult. du bac. agglutin.; ét. spéc. chez l'enf. Th. Bordeaux 1900.
- Bucco, Sul valore diagn. del siero artific. nelle affezioni tub. Nuov. riv. clin. terapeut. 1901, No. 4. C. f. i. M. 1902, S. 212.
- Buchholz, Üb. menschenpathogene Streptothrix. Z. f. H. 24, 1897. — Üb. Zücht. v. Tb. B. i. menschl. Sput. H. R. 1904, S. 821.
- Budden Ch. W., The Diazor. i. tub. Br. m. J. 1905, Nr. 2314, p. 984. M. m. W. 1905, S. 1600.

- Burghart, Beitrag z. Diagnose d. Lungenspitzenkat. D. mil.-ä. Z. 1900, H. 1., D. m. W. 1900, L. B., p. 36. Z. f. Tb., I., p. 254.
- Burkhardt O., Ein neues Frühsympt. d. Lungenphthise. Corr. Schw. Bl. 1903, Nr. 2.
- Cabot R. C. and Whoriskey J. J., Substitut. tub. as a means of diagn. J. of the Boston Soc. of Med. Sc., Vol. III, 1899, p. 71. C. f. B., 28, S. 404.
- Caffarena T., Üb. d. agglutinier. Eigenschaft d. Pferdeblutserums auf Tb.B. Cgr. f. i. M. i. Rom, Okt. 1902. M. m. W. 1903, p. 90. — Sul potere agglutinante ad antitossico. del siero di cavallo normale e di immuniz. contro la tub. Gz. d. osp. Nr. 68. D. m. W. 1903, L. B., p. 158.
- de la Camp, Einig. neue diagn. Forschungsergebn. a. d. Geb. d. Lgtb. B. kl. W. 1905, Nr. 29. — Üb. d. Tb. d. Mediastin.- u. Bronchialdrüs. B. m. Ges. 1905, M. m. W. 1905, S. 2202.
- Cange A., D. l. pré tuberculose. Pr. m. Belge, Ann. LVII, 1905, p. 509.
- Carrière G., Le séro-diagnostic, de la tub. C. r. biol. 1901/746.
- Chappell, The early appearances, diagnos. and treatm. of tub. of the upper air tract. J. of the Am. med. Ass., No. 8. D. m. W. 1903, L. B., p. 76.
- Charlier A., L. capae. pulm. chez l. suj. sains et chez l. suj. tub. C. r. biol. 1904, p. 422.
- Clarke, Floyd, S., The early diagn. of pulm. tub. Med. Rec. 65, 1904, p. 55.
- Clément H., Contrib. à l'étud. séro-diagn. de la tub; son applicat. aux cas de tub. chirurg. Th. Lyon 1900.
- Clifford-Beale E., Walsham H., The diagn. of tub. disease of the temps by means of the Röntgen rays. Praet. 1901, July. C. f. i. M. 1901, S. 924.
- Combemale et Mouton, Frühzeit. Diagn. d. Tb. V. frz. C. f. i. M. i. Lille. D. m. W., 1899, V. B., p. 229. — Le sérum artific., moyen de diagn. précoce de la tub. pulm. Gz. hebdom. 1900, Nr. 7. C. f. i. M. 1900, p. 625.
- Cooper J. C., Acute and chronie tub. phthisis with cases. Med. News, Vol. LXXXI, 1902, Nr. 17, p. 784—787.
- Coppen Jones, Üb. ein. neuen bei Tb. häufig. Fadenpilz. C. f. B., Bd. XIII, S. 697. 1893.
- Courmont J., L. tub. hum. sans Bac. d. Koch; 2 cas nouv. B. T. C., p. 243.
- Courmont P., Rech. et valeur clin. de l'agglutinat. du bac. de Koch. Séro-diagnostic de la tub., p. 229, B. T. C. — Üb. Agglutination d. Kochschen Baz. durch tub. Ergüsse d. serösen Häute. S. m., 49, 1900. W. kl. W. 1901, p. 127. C. r. biol. 1900, 1000. V. f. i. M. 1899, p. 76. M. m. W. 1899, S. 779. A. d. m. exp. 1900/697.
- Courmont Paul et Descos A., De l'agglutinat. des cult. homog. des bac. „acidophiles“, J. d. phys. et de path. génér. 1902, p. 1102. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 289. C. r. biol. 1902, p. 1357.
- Courtois-Suffit & Levi Sirugue, L. diagn. précoce d. l. tub. pulm. Gaz. d. hôp. 1901, p. 11; C. f. B., 31, p. 91.
- Craandyk M., Davos-Platz, Ein seltenes Sputum. Cor. f. Sch. Ä., 32. Jg., Nr. 21. M. m. W. 1902, p. 1929. D. m. W. 1902, L., p. 296.
- Croner Wilhelm, Üb. d. Magenbeschw. i. Frühstadium d. Lungenschwinds. D. m. W. 1898, p. 757. C. f. i. M. 1899, p. 533.
- Cruchet, Tb.B. i. Stuhl. d. Kinder. Paris. T. C. 1905. M. m. W. 1905, p. 2390.
- Czaplewski, Zum Nachweis d. Tb.B. i. Sputum. Z. f. Tb. 1900, 387.
- Dahmen, Neues Verf. z. Auffindung v. Tb.B. M. m. W. 1891, S. 667.
- Dally, J. F. Halls, Die Diagn. d. Lungenkrankh. vermittle d. Röntgenstrahlen. Lanc., 27. Juni 1903. M. m. W. 1903, p. 1399.
- Daremborg & Chuquet, Infl. inverse d. l. fatigue et d. repos sur l. températ. des tub. R. d. m. 1899, p. 681. C. f. i. M. 1900, p. 816.
- Delorme E., Üb. prim. Lungenkarzinom. I. D. Jena 1902.

- Denison, The tub. test and the need of a more complete diagn. of tub. Journ. of the Am. m. Ass. 1900, No. 1. D. m. W. 1900, L. B., p. 23.
- Descos André, Le sérodiagn. de la tub. chez les enf. Th. Lyon. Paris, J. B. Baillière & Fils, 1902. C. f. B., Bd. 33, p. 165.
- Dettweiler, Die Behandl. d. Lungenschw. i. geschlossenen Heilanstalten. Berlin 1880, G. Reimer.
- Dieudonné, Zur Frühdiagn. d. Tb. D. mil.-ä. Z. 1900/526.
- Dieulafoy, Comment savoir si une pleurésie séro-fibrin. est ou non tub? S. m., 48, 20. November 1901.
- Dilg K., Unters. üb. d. versch. Sedimentierverfahren z. Nachweise v. Tb.B. C. f. B. 1903, Bd. 35, Nr. 3.
- Dombrowsky, Üb. d. Widalsche Reakt. u. deren prakt. Bedeutg. (Phthise). H. R., Jg. XIII, 1903, p. 209. D. m. W. 1903 (L. B.), p. 298.
- Donath J., Zur Serodiagnostik d. Meningitis tub. C. f. i. M. 1902, S. 422.
- Dreyfuß, Blutungen an d. oberen Luftwegen b. Lebereirrhose. (Larynx tub.) M. m. W. 1898, Nr. 32.
- Ducas M., Diagn. préc. d. l. tub. p. l'inoculat. exp. au cobaye. Th. Nancy 1900.
- Dumont A., Phlébite prétub. et phlébite précoce des tub. Th. de Paris 1900. (Boyer éd.) Z. f. Tb., II, p. 178.
- Dünges, D. Frühdiagn. d. Lgspitzenerkr. durch vergl. Palpitat. B. z. Tb. 1904, p. 79.
- Dworetzky A., Erf. m. Spenglers Formalinmeth. z. Reinzücht. Tb.B. aus Bakterien-gemisch. C. f. B. 1904, Or. Bd. 37, S. 626.
- Earl H. C., Die Cytologie d. serösen u. serofibrinösen Ergüsse d. Pleura u. a. serösen Höhlen, sowie d. Liquor cerebrospin. Dublin, J. of med. sc., Dezember 1903. M. m. W. 1904, p. 403.
- Eichhorst H., Handbuch d. spez. Path. u. Therap., Bd. IV, S. 758. Wien u. Leipzig 1897, Urban u. Schwarzenberg. — Art. Chlorose. Eulenburgs Realenzyklopädie, 3. Aufl., Bd. IV.
- Eisenberg u. Keller, Die Serodiagnostik d. Tb. Przegląd lekarski, No. 2. D. m. W. 1903, L. B., p. 37.
- Elkan J., Üb. prim. Sarkome d. Lg. in Anschl. an ein. F. v. prim. Sarkom d. link. Lg. I. D. München 1903.
- Ennet M., E. F. v. prim. Krebs d. rechten u. Tb. d. linken Lg. I. D. Greifswald 1903.
- Eppinger Hans, Üb. eine neue pathogene Cladothrix u. eine durch sie hervorgerufene Pseudotub. W. kl. W. 1890, S. 321.
- Feiter R., De l'agglut. du bac. de Koch par les épanchem. tub., sérodiagnostic. Thèse Lyon 1900.
- Fernet, Erkrank. d. Achselhöhlendrüsen b. Beginn d. Lungentub. Bull. de l'Acad. 10. März 1903. B. kl. W. 1903, L. A., p. 69.
- Ferran J., Nouv. méth. d. diagn. Z. f. Tb. 1900, H. 3, Bd. 1, p. 177. C. f. i. M. 1900, p. 1210.
- Fétau J., Méth. de diagnostic précoce du terrain de prédisposit. à la Tub. pulm. par l'Ét. de la tempér. moy. A. méd. d'Angers 1901. Z. f. Tb., III, p. 268.
- Fichtner, Beitr. z. Zücht. d. Influenzabaz. C. f. B., Bd. 35, S. 374.
- Finck, Les méth. clin. de diagn. précoce de la tub. pulm. R. m. de l'Est 1902, 15 mars.
- Fischer C., Z. Frühdiagn. u. Frühkur d. Lgtb. Corr. f. Schw. Ä. 1904, p. 14. — Z. Diagn. d. Kavern. b. Lgtb. B. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 397.
- Fischer E., Üb. d. Tuberkulinprobe. Cor. f. Schw. Ä., 33. Jahrg., Nr. 19. M. m. W. 1903, p. 1838.

- Forsell Olof, Eine verbess. Method. z. Nachw. v. Tb.B. i. Harn. D. Z. f. Chir., Bd. LXVI, 1903, p. 276.
- Foß, Pulsuntersuch. b. Lungenkranken. F. d. M. 1904, p. 99.
- Foulerton, On Streptothr. inf. Lanc. 1899, C. f. B. 38.
- Fournier, De la phthisie syphilitique. Gz. hebdom. 1878.
- Fournier et Beaufumé, Rech. du bac. de Koch dans l'urine. C. r. biol. 1902, p. 1258. C. f. B., Bd. 33, p. 153.
- Fraenkel A., Das Tuberculinum Kochii als Diagnostikum. Z. f. Tb., I., 1900/291. — Vorkommen d. Ps.Tb.B. i. Sputum Lungenkrank. Pat. V. f. i. M. i. Berlin, März 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 130.
- Fraenkel C., Unters. üb. d. Serumdiagn. d. Tub. nach d. Verfahren v. S. Arloing u. P. Courm. H. R. 1900/630.
- Fraenkel, Chemnitz, Augenspiegelbef. b. Pneumonie. Graefes A., Bd. XLVIII, H. 2.
- Freymuth, Diagnost. Erfahr. m. Tuberkulin a. Lungenkrank. M. m. W. 1903, p. 801.
- Fries J., Vers. m. d. Thorakodynamometer nach Sticker. Z. f. Tb. B. 5, Nr. 251.
- Froment J., Sérodiagn. d. l. tb. chez l. vieillard. C. r. biol., T. 55, 1903, p. 1603.
- Fromm Eugen, Welche klin. Bedeutg. besitzt. ephemere auf den Aufnahmetag i. Krankenhaus beschränkte Temperatursteigerung. C. f. kl. M. 1900, Nr. 26.
- Fuchs E., Üb. eosinoph. Zellen m. bes. Ber. d. Sputums. C. f. i. M. 1899, p. 513.
- Fussel M. H., The value of sput. exam. to the gener. practit. Phil. m. J. 1901/382.
- Gabbet, Rapid staining of the tubercle Bac. Lanc. 1887, 9. April, p. 757.
- Gähtgens R., Üb. d. Vermehrungsfähigk. d. Tb.B. i. entleerten Sputum nebst Bemerkg. üb. d. Hesseschen Züchtungsverfahren. Z. f. Tb., I., 1900/409.
- Gaïde, Pseudotb. d'orig. palustre. Ann. d'hyg., T. VI, 1903, p. 666.
- Gardiner F., Die Röntgenstrahl. i. d. Diagnostik d. Lungentub. Scot. med. and surg. Journ., Nov. 1902. M. m. W. 1903, p. 127.
- Garel, Lyon, Der Kompressionshusten, seine Bedeutg. f. d. Diagn. d. Verenger. d. Bronchien. Ann. des malad. de l'oreille etc. 1902, Nr. 3. M. m. W. 1902, p. 891.
- Gargano G. u. Nesti G., Su di alcuni rec. met. di ricerca d. bac. d. Koch nei liquid. coagulabili. Riv. critica di clin. med. 1903, Nr. 31., C. f. B., Ref. Bd. 36, S. 604.
- v. Gebhardt F. u. v. Torday A., Üb. d. Serumdiagn. d. Tub. M. m. W. 1902, p. 1171. Orvosi Hetilap. (ungar.), Nr. 1. Ungar. med. Pr. 1902, Nr. 3.
- Geipel, Üb. Schimmelmikose d. Lunge. Ges. f. Nat. u. Heilk. z. Dresden. M. m. W. 1904, S. 1222.
- Gerhardt D., Üb. d. diagn. u. ther. Bedeut. d. Lumbalpunkt. Mitt. Grenz. M. Ch., 13. Bd., 4. H., 1904.
- Gerö A., D. Frühdiagn. d. Lgtb. Pest. m. chir. Pr. 1901/1051.
- Gidionsen, Üb. Fieber u. Fiebertess. u. kein Ende. Beitr. z. Kl. d. Tb., Bd. IV, H. 2, p. 123. M. m. W. 1905, S. 2190.
- Gioelli P., S. m. m. di rapido usc. e soil. del bac. del. tb. Boll. R. Accad. m. i. Genova, V. 16, Nr. 15. C. f. B., 1. R. Bd. 34, S. 649.
- Gordon D. G., The etiology and early diagnosis of pulm. tub. Phil. med. J., Vol. VIII, 1901/446.
- Gout H., D. diagn. préc. d. l. tub. pulm.; anapnomét. Th. Paris 1905.
- Graff, Ein F. v. prim. Lgaktinomyk. v. d. Spitze d. l. Lung. ausg. Z. f. Hlk., Bd. 25, H. 10, 1904.
- Grasset E., La cryoscopie et son applicat. chez les tub. Th. Paris 1901.
- Grasset H., Difficul. du diagn. entre la tub. pulm. au début et cert. localisat. arthrit. Indicat. thérapeut. Progr. méd. 1902, Nr. 8. C. f. i. M. 1902, S. 1220.

- Grasset, Der diagn. Wert d. Tuberkulins. V. frz. Cgr. f. i. M. i. Lille. D. m. W. 1899, V. B., p. 229.
- Grazia F. de, Die Serumdiagn. b. d. Lungentub. B. kl. W. 1902, p. 229, 262. Gaz. d. osp. 1901, Nr. 108.
- Graziani, Considér. intorno all albuminuria tempor. en contin. nella costituz. linpatico-scerofulosa. Gaz. d. osp. 1899, Nr. 139. C. f. i. M. 1900, p. 488.
- Green & Stanley, The use of the X rays as an aid to the early diagn. of pulm. tub. Dublin. J. of med. sc. 1904, Nr. 394, p. 241.
- Gröber A., Ein Beitr. z. kl. Diagn. d. intrathorak. Erkr. A. f. kl. M., Bd. 82, H. 3.
- Grünenwald Th., Üb. d. Verwendg. d. alten Kochschen Tuberkulins z. Erkenn. d. Lungentub. M. m. W. 1903, p. 1870.
- Grundt E., Lyster, Temperaturverh. d. Tub. nach Beweg. u. Arbeit. Z. f. Tb., VII., p. 396.
- Guilland, Lorell G., Die Cytodiagn. d. Pleuraergüsse. Scot. med. and surg. J., Juni 1902. M. m. W. 1902, p. 1361.
- Guilleminot H., L'orthodiagraphie et l. diagn. d. l. tub. R. d. l. tub. 1905, p. 177.
- Guyot G., L'espet. come mezzo d. cult. d. bac. d. tub. Gaz. d. Osp. 1903, Nr. 80. C. f. B., I. R. Bd. 36, S. 265.
- Hammer C., Üb. d. diagnost. Tuberkulininj. u. ihre Verwendg. beim Heilstättenmaterial. B. z. Tub., Bd. I, 1903, H. 4, p. 325. — Tuberkulin als wicht. Mittel f. d. Diagn. d. Fröhrtub. 51. Vers. Mittelrhein. Ä. a. 2. Juni 1903 z. Wiesbaden. D. m. W. 1903, V. B., p. 199.
- Harrington, An early sign. of tub. Phil. m. J., 28. April 1900. Z. f. Tb., I., p. 347.
- Harris S., The early diagnosis of pulm. tub. Med. Rec. 1902, Vol. 62, Nr. 16, p. 608.
- Hawthorn E., De la séro-réact. tub. et sa valeur pour le diagn. précoce de la tub. C. r. biol. 1902, p. 632. J. de Physiol. et de Path. génér. 1903, Nr. 1, p. 104. — Ess. de séro-réact. tub. avec les cult. homog. du bac. de Koch en eau peptonée. C. r. biol. 1903, p. 402. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 741. — Cult. homog. du bac. de la tub. en eau peptonée. C. r. biol., T. LIV, 1903, Nr. 11, p. 398. (Réun. biol. de Marseille.) C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 741.
- Hedenius J., Bidrag till lungsjukdomarnas diagn. och kasuist. Upsala läkarefören. förh. N. F., Bd. VIII, 1903, p. 269.
- Heim L., Lehrb. d. bakt. Untersuch. u. Diagnost. Stuttgart 1894, Ferd. Enke.
- Henkel, Klin. Beiträge z. Tub. I. Beitr. z. Frühdiagn. d. Lungentub., d. Punktion d. Lunge z. Nachw. v. Tb. B. M. m. W. 1900, p. 419, 799.
- Hennecart, Üb. d. Wichtigk. d. Radioskopie u. Radiographie f. d. Diagn. d. beginn. Lungentub. XIV. intern. med. Cgr. z. Madrid 1903. M. m. W. 1903, p. 966. — Diagn. d. Lgtb. mitt. Röntgenstr. Paris. T. C. 1905. M. m. W. 1905, S. 2248.
- Heron, Üb. d. diagn. u. therapeut. Wert d. Tuberkulins. T. C. i. London. Z. f. Tb., II., p. 447. M. m. W. 1901, S. 1333. Phil. m. J., Vol. VIII, 1901/494.
- Herz Robert, Üb. d. Agglut. d. Tb. B. b. Hauttub. A. f. Derm. 1903, Bd. 64, H. 2. Naturf. Vers. Karlsbad 1902, p. 457.
- Heß Karl, Üb. Temperaturmessg. b. Lungentub. Z. f. prakt. Ä. 1900, p. 435. C. f. i. M. 1900, p. 1099. — Üb. d. Diagn., spez. d. Frühdiagn. d. Lungentub. München 1901, Seitz u. Schauer. W. kl. W. 1902, p. 1112.
- Hesse W., D. Bedeut. d. Ausw. als Nährbod. f. d. Tb. B. A. f. kl. M., Bd. 77, 1903, p. 538. — Ein neu. elektiv. Nährbod. f. Auswurf-Tb. B. C. f. B., I. Or. Bd. 35, S. 384. — Meth. d. Zücht. d. Tb. B. aus menschl. Auswurf. C. f. B., I. Or. Bd. 35, S. 386. — Ein neu. Verfah. d. Zücht. d. Tb. i. menschl. Luftröhrenschl. nebst Bemerk. z. Ät. d. Lgschw. Jbr. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. Dresden 1902/03, ersch. 1904, p. 25—28.

- Hildebrand H., Üb. d. diagnost. Wert d. Röntgenstrahlen i. d. inn. Med. M. m. W. 1901, S. 1957, 2008.
- Hildebrandt Wilhelm, Üb. eosinophile Zellen im Sputum. M. m. W. 1904, p. 100.
- Hoche Cl. L., Note à propos d'un cas d'aspergill. pulm. C. r. biol. 1905, p. 557.
- Höchstetter F., Einwirk. d. Beweg. auf d. Temperatur d. fieberfreien Lungentub. I. D., Erlangen 1894.
- Hoffa, Die frühzeitige Diagn. d. tub. Spondylitis. Z. f. prakt. Ä. 1897, Nr. 1. C. f. Ch. 1897, p. 288. Corr. f. Schw. Ä. 1897, p. 157.
- Hoke E., Zur Kasuistik d. Streptotrichosis pulmonum. Pr. m. W. 1901, p. 29.
- Holmes, The importance of an early diagn. of tub. J. Am. med. Ass. No. 8. D. m. W. 1901, L. p. 71.
- Holzknrecht Guido, Die röntgenologische Diagnostik d. Erkrankg. d. Brusteingew. 6. Ergänzt.-Heft d. Arch. u. Atlas d. norm. u. pathol. Anatomie i. typ. Röntgenbild. Hamburg, Lukas Gräfe u. Sillem.
- Honl J., Z. bakt. Diagn. d. Tb., Časopis č. lékařů. 1902 (Böhm). C. f. B., 35, S. 409.
- Horčíčka, Serumdiagn. d. Tub. H. R. 1900/1073.
- Huyberegts Th., Diagn. précoce de la tub. pulm. et d'une tum. anéorism. par les rayons X. Presse méd. belge 1901, Nr. 45, p. 703.
- Ilvento, Üb. die Agglutinat. d. Tb.B. d. verschied. Serumarten u. ihre diagnost. Wichtigk. M. m. W. 1903, p. 528. Rif. med. 1902, No. 36 u. 37, 261, 262, p. 424—435.
- Immelmann, Kann man mittels Röntgenstrahlen Lungenschwinds. schon z. einer Zeit erkennen etc.? Balneol. Cgr. z. Berl. 1899. Z. f. diät. Th., Bd. 3, p. 353.
- Immermann, Üb. d. Bedeutg. d. Röntgenstr. f. d. Pneumatothérapie. D. m. W. 1897, Nr. 36. C. f. i. M. 1899, p. 622.
- Iwanow Alexander, Üb. d. Serumdiagn. d. Tb. Medizinskoje Obosrenije 1901, Nr. 12. Z. f. Tb., III, p. 361.
- Jacqué L., A. propos d. procédés d. Hesse et d. Spengler, pour l. cult. d. bac. d. l. tub. C. f. B., Orig. Bd. 36, S. 461.
- Janowsky G. u. Wyssokowicz, Z. Symptom. u. Pathog. d. käs. Pneum. Z. f. Tb., Bd. 4, H. 1, p. 33.
- Jaworski, Beitrag z. diagnost. X-Durchstrahlung d. Respirationsorgane. W. kl. W. 1897, Nr. 30.
- Jehle L., Üb. eine neue Bakterienart i. Sputum. C. f. B. 1902, Bd. 32, S. 192. D. m. W. 1902, L. p. 224. — Üb. d. Nachw. v. Typhusbaz. i. Sputum Typhuskranker. W. kl. W. 1902, p. 232, M. m. W. 1902, p. 419.
- Jemma, S. un n. m. di ric. del bac. tub. del liqu. cef. rach. Riv. d. clin. psich. 1903, Nr. 6. C. f. B., R. Bd. 34, J. 649.
- Jochmann G., Das biolog. Anreicherungs- u. b. d. Untersuchg. auf Tb.B. H. R. 1902, Nr. 11, p. 524.
- Johnston Georg, The diagn. and treatm. of incipient pulm. tub. Am. méd. Ass. 21. Juni 1902. Z. f. Tb., Bd. 4, 3, p. 270.
- Josefson, Prim. lungkanees med. soulsteeller i pleuraexsud. och sputum. Hygiea (schwed.) No. 11. D. m. W. 1902, L. p. 5.
- Jourdin Ch. & Fischer G., L. diagn. préce. d. l. tub. pulm. Malvine éd. Paris 1902. C. f. i. M. 1901, p. 1107. Z. f. Tb., III., p. 359. B. kl. W. 1903, p. 551.
- Jousset, Inoskopie, eine Methode, d. Tb.B. direkt z. untersuchen. Acad. de méd., 3. Febr. 1903. Sem. méd. 1903, Nr. 3. M. m. W. 1903, p. 446.
- Jousset A., Nouv. méth. p. isoler le bac. d. Koch d. hum. d. l'organ. S. m. 1903, Nr. 3. C. f. B., 1. R. Bd. 34, S. 77.

- Jousset A. & Parakevopoulos P., Et. comp. d. div. méth. d. séro-diagn. d. l. tub. C. r. biol., T. 58, 1905, p. 1063.
- Julliard Charles, Die klin. Verwend. d. Cytologie, d. Kryoskopie u. d. Hämatolyse b. serösen Ergüssen. Rev. de chir., Februar 1902. M. m. W. 1902, p. 1194.
- Jundell, Bem. z. Perkuss. d. Lungenspitze. C. f. i. M. 1904, Nr. 17.
- Kelsch, Anwend. v. Röntgenstrahlen b. Verdacht auf Tb. Acad. de méd., 21. Dezember 1897. W. m. W. 1898, p. 1024.
- Kelynaek N. T., Williams u. Sydney R., The comparat. value of or. and rect. temper. in the study of pulm. tub. The Br. m. J. 1903, p. 1054, 24. Oktober. D. m. W. 1903, L. B., p. 274.
- Kernig W., Subfebrile Zustände. A. f. kl. M., XXIV. Bd., 1879. — Michaelis Faser-nachweis. D. m. W. 1901.
- van Ketel B. A., Beitr. z. Unters. auf Tb. B. A. f. H., Bd. XV, S. 109.
- Kétly v. u. Torday v., Üb. d. diagn. Wert d. Cytodiagnostik b. d. Beurteil. d. Brust- u. Bauchhöhlenfluss. A. f. kl. M., Bd. 77, H. 1 u. 2.
- Kienböck, Auf d. Röntgenschirm beobacht. Beweg. i. einem Pneumothorax. W. kl. W. 1898, Nr. 22, p. 538.
- Kikuth, Üb. d. Frühdiagn. d. Lgtb. Ges. prakt. Ärzte z. Riga, 7. März 1901, Pet. m. W. 1901, p. 485.
- Kirchner, Üb. d. Notwendigk. u. beste Art d. Sputumdesinfektion b. Lgtb. C. f. B. 1891, Bd. IX, S. 5.
- Kitajima T., Eine neue Reakt. geg. Tuberkelserum. Mitt. d. m. Ges. z. Tokio, Bd. XII, 1902, Nr. 78, p. 38 (japan.). C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 747.
- Klebs C., Der diagnost. u. therap. Wert d. Tuberkulins u. seiner Derivate. Boston med. and surg. J., 10. u. 17. Februar 1898, Vol. CXXXVIII, S. 241. M. m. W. 1898, p. 468.
- Klebs E., Numer. Bestimm. d. Tb. B. D. kaus. Ther. 1903, p. 19, S. 801. C. f. B. 1. R. Bd. 34, S. 801.
- Kleczetoff J., Z. Diagn. d. allg. Miliartb. Wojenno-med. Shurn. 1904, Nr. 4, p. 721. M. m. W. 1904, S. 1122.
- Klingmüller Viktor, Mikroskop. Untersuch. üb. d. Bedeutg. d. Reaktionszone nach Tuberkulininjekt. A. f. Derm. 1902, Bd. 60, H. 1, p. 109—118.
- Klüber J., E. F. v. Bronchialkarzinom u. Lungenzyste. I. D. Erlangen 1898.
- Knopf S. A., Die Früherkennung d. Tb. Z. f. Tb., I., 1900/100, 187.
- Koch R., Üb. d. Agglutin. d. Tb. B. u. üb. d. Verw. d. Agglutin. D. m. W. 1901, p. 829.
- Köhler, Bronchialdrüsentb. Röntgen-Cgr. 1905, M. m. W. 1905, S. 925.
- Königstein R., Üb. Anreicherung d. Tb. B. i. Sputum (n. Hesse). W. kl. W. 1902, p. 839. C. f. B., Bd. 33, p. 16.
- Köppen A., Methode f. d. Agglutinationsprüfung d. Tb., C. f. B., Bd. 34, p. 6.
- Kotowtschikoff, Medicinskoje Obosrenie. 1898, No. 41 (cf. folg.).
- Kraus F., D. Erkennung d. Tb., m. vorwieg. Berücks. d. Frühdiagn. Z. f. ä. Fortbildung 1904, Nr. 3. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 93.
- Krause, D. Tblin.-Ther. i. d. ambul. Beh. u. b. Fiebernden. M. m. W. 1905, p. 2523.
- Krönig, Die perkussor. Frühsympt. d. Lungensp.-Tub. Diskuss. B. m. Ges., März 1900, p. 107. B. kl. W. 1900, p. 442.
- Kühnau, Üb. d. wirkl. Wert d. Tuberkulinprobe. B. t. W. 1899, p. 275. M. m. W. 1899, S. 914.
- Kupfer Karl, Beitr. z. Kasuistik d. Lungengangrän, a) nach Durchbruch eines Ösophagus, Karzinoms, b) Lungengangrän nach Phthise. I. D. München, Oktober 1902.
- de Lannoise et Girard, Zur Untersuch. d. tub. Sputa. Antitub. Cgr. i. Neapel 1900. W. m. W. 1900, p. 1332. — Nouv. méth. pour la rech. du bac. de Koch dans les crachats et le pus des tub. Pr. méd., 5. Mai 1900. Z. f. Tb., I, p. 347.

- Lasker, Erfahr. üb. d. Diazoreakt. b. Infektionskrankh. D. Ä. Z. 1901, Nr. 12 u. 13. C. f. i. M. 1901, S. 939.
- Latham Arth., A Clinie. Lecture on the early diagn. of pulm. consumpt., with special ref. to the value of tub. Lanc. 1901, Vol. II, 1781. Z. f. Tb., III, p. 274. C. f. i. M. 1902, p. 665. M. m. W. 1902, p. 379. — The diagn. and modern treatm. of pulm. consumpt. London (Baillière) 1905.
- Laure Louis, Diagnost. précoce de la tub. pulmon. chron. Th. de Paris 1901, Steinheil éd. Z. f. Tb., III, p. 360.
- Lawson D., Roentgen rays in the diagn. of lung dis., Tr. m. ch. soc. Edinb. 1902/03. V. 22, p. 257. — On streptococcus infection of the Lungs. Edinb. M. J. N. Ser. Vol. XIII, 1903, No. 4, p. 289. M. m. W. 1903, p. 1179.
- Levy u. Bruns, Üb. d. Frühdiagn. d. Lungentub. D. m. W. 1900, p. 141.
- Levy-Dorn, Z. Unters. d. Brust mittels Röntgenstr. B. m. G. 1900, p. 111. M. m. W. 1900, p. 481. B. kl. W. 1900, p. 443. D. m. W. 1900, p. 565, 584, 599.
- Lichtenstein E., Üb. d. Vorkommen v. Ps.Tb.B. i. menschl. Sputum. Z. f. Tb. 1902, Bd. 3, H. 3, p. 193.
- v. Liebig G., D. Pulskurve b. Anlage d. Lgschw. D. m. W. 1882, Nr. 18.
- Llewellyn A., „Don't trust yourself i. the hands of those Country Doctors.“ Med. Rec. 1897, III., p. 33.
- Loeb, The serum diagnosis of tub. Transact. of the Chicago path. soc. 1902, Oktober, No. 7, p. 141. C. f. B., Bd. 33, p. 16, 684. J. Am. m. Ass., Vol. XL, 1903, No. 21, p. 1423. D. m. W. 1903, L. B., p. 152.
- Lommel F., Eine Fehldiagn. auf Gr. d. Gruber-Widalschen Reakt. M. m. W. 1902, p. 314. C. f. i. M. 1902, p. 834.
- Loomis H. P., The pretub. stage of phthis. on the condit. which antedates tub. developm. and some aids to its diagn. Med. Rec., No. 1466, 1898, p. 829. C. f. B., 26, S. 505.
- Lubarsch, Üb. d. Bedeutg. d. mikr. Nachweises v. Tb.B., Ver. Pos. Ä. 1901. D. m. W. 1901, p. 279, V. B.
- Maillard L., L'indoxyle conjugué n'est pas la cause d. l. diazor. urin. d'E. C. r. biol., T. XV, 1903, p. 1421.
- Manquat A., Infekt. bac. prétb. à forme torp. ou anémie bac. prétb. Pr. m. Belge 1904, p. 797.
- Mantoux, Üb. Temperat.-Mess. d. Urin, Mundh., After, spez. b. Tub. Soc. m. d. hôp. 17. Juni 1904. M. m. W. 1904, S. 1327.
- Maragliano V., Üb. Tb.B. im Urin. Gaz. d. osp. 1904, Nr. 7, M. m. W. 1904, S. 1166.
- Marchetti G. & Stefanelli P., S. siero-reaz. tub. Riv. crit. d. clin. med. 1903, No. 42, C. f. B., 1. R., Bd. 34, S. 732. — S. m. nutr. prop. per la diagn. batt. rap. d. tb. Riv. crit. di Clin. Med. 1903, No. 34. C. f. B., 1. R., Bd. 34, S. 566.
- Marx, D. Grenzen d. normal. Temper. Z. f. diät. Ther. 1900, III., p. 555.
- Marzagalli, Sopra d. un nuovo metodo per la siero-diagn. dell tb. Gaz. d. osp. 1905, No. 19. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 473. Ann. Maragliano 1904, No. 1. C. f. B., R., Bd. 34, S. 603.
- Marzagalli u. Caffarena, Die Agglut. d. Tb.B. nach d. Arloing-Courmontschen u. d. Kochschen Methode. Cgr. f. i. M. i. Rom, Oktober 1902. M. m. W. 1903, p. 90.
- Masius V. u. Beco L., Rech. sur la séroréact. dé la tub. Bull. de l'ac. r. de m. de Belgique 1902, p. 107. C. f. i. M. 1902, p. 667.
- May Rich., Orcein z. Nachw. elast. Fasern i. Sputum. A. f. kl. M. 1900, Bd. 68. H. 5 u. 6. Th. M. 1902, p. 56.

- Mazzotti L., Della tubercolina adoperata a scopo diagn. Mem. della R. Accad. delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Anno accademico 1900, I, Serie V, Tomo IX, p. 403. B. kl. W. 1903, p. 552. Clinica med. ital. 1901, Sett., No. 9.
- Medowikoff P., D. Inoskop. d. pleurit. Exsudat. Russky Wratsch 1904, No. 42. M. m. W. 1905, S. 715.
- Meier Otto, Üb. d. Wachst. d. Tb.B. a. veget. Nährbod. I. D. Freiburg i. Br. 1903.
- Meissen, Fieber u. Hyperthermie. B. kl. W. 1898, p. 511, 529.
- Memmi, Üb. d. prognost. Wert v. eosinophil. Zellen i. Auswurf Tb. Gz. d. osp. 1901, No. 114. M. m. W. 1901, S. 2020.
- Merieux, Diagn. d. l'intox. tb. chez l'homme p. l'inject. sous-cut. à d. cob. tub. d. div. liqu. d. l'organ. Lyon m. 1904, p. 625.
- Méry, Cytol. des méning. tub. Soc. de Pédiatrie, 18. Febr. 1902.
- Meyer F., Ein Beitr. z. Bed. d. eosinoph. Zellen im Ausw. d. Tub. D. Ä. Z. 1901/7.
- Michaelis L., Üb. d. Chemismus d. Elastinfärbg. u. seine prakt. Anwendg. a. Sputumpräparate. D. m. W. 1901, p. 219 u. V. B., p. 104.
- Mironescu Theodor, Üb. d. Vorkommen v. Tb.B.-ähnlichen Bakt. i. menschl. Fäces. Z. f. H. 1901, Bd. 37, S. 497.
- Mitulescu L., D. s. diagn. Zeichen b. d. beginn. Lgtb. Spitatul 1904, Nr. 8/9. M. W. 1904, S. 1219.
- Moeller A., Zur Frühdiagn. d. Tb. M. m. W. 1901, p. 1999. C. f. B., 33, p. 140.
- Moeller A. u. Kayserling A., Üb. d. diagn. u. therap. Verwendg. d. Tuberkulins. Z. f. Tb., III, p. 279.
- Moncorvo, Die auß. Guajacolbehandlg. z. Differentialdiagn. zwisch. Intermitt. u. Tb. Paris méd. Ges. 1899, Ac. d. méd. M. m. W. 1899, S. 1405.
- Mongour u. Buard, Z. Serumdiagn. d. Tb., C. r. biol. 1899, p. 656. M. m. W. 1899, S. 36.
- Morkowitin A., Üb. d. Veränd. d. Körpergew. d. Brustkorb. d. Tub. Russky Pathol. klinitsch. Med. i. Bakt., Bd. IX, Abt. 5 u. 6, Bd. X, Abt. 1. Pet. m. W. 1900, p. 53; Z. f. Tb., II, p. 179. — D. Diagn. d. Tb. b. Säugl. auf bakt. Wege. Dietsk. med. 99/4. Pet. m. W. 1899, p. 61.
- Mühlhäuser H., Üb. d. Biedertsche Verfahren z. Nachweis v. Tb.B. D. m. W. 1891, S. 282.
- Müller Hermann, Ein Beitr. z. Kas. d. bösartig. Neubild. i. d. Lunge. I. D. München, März 1898.
- Müller Heinr., Zwei Fälle v. primär. Lungenkarzinom. I. D. Freiburg 1904.
- Müller Leopold, Die Veränderg. i. Augenhintergr. b. mil. Aktinomykose. Kl. Monatsbl. f. Aug., Jg. XLI, 1903, Bd. I, p. 236—247, März. 16. Cgr. ital. ophthalm. Ges. Florenz.
- Murat, Neues Symptom d. Lungenphthise, namentlich d. beginnenden. Gz. hebdt. 1899. Nr. 19. C. f. i. M. 1899, p. 529.
- Nacke W., Symptomat. d. Lungensyphilis auf anat. Grundl. I. D. Erlangen 1898.
- Nathan M., Diag. d. l. tub. pulm. chez l'enfant. R. d. l. tub. 1904, p. 482.
- Naumann, Üb. d. diagn. Wert. d. Tuberkulins. R. m. A. 1902, Nr. 9. B. kl. W. 1902, p. 41, L.
- Naunyn, Cytodiagnostik d. Pleuraexsud. Unterels. Ä. Ver. i. Straßburg, Jänner 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 140.
- Nebel A., Üb. d. Nachweis d. Tb.B. i. Sputum. A. f. Hyg., Bd. 47, H. 1, 1903, p. 57. M. m. W. 1903, p. 1043.
- Neisser E., Stettin, Zur Frühdiagn. d. Tb. b. d. versich. pflicht. Bevölk. Klin. Jb. 1901, Bd. 8, p. 35. M. m. W. 1902, p. 416. — Die Echinokokkuskrankheit. Berlin 1877. — Jahresber. d. städt. Krankenhauses i. Stettin 1901. — Üb. Sondenpalp. d. Bronchialdr. b. gewiss. leichtesten Formen d. Tb. A. f. kl. M., Bd. 86.

- Neufeld L., Zur Diagnostik d. Ohrtb. A. f. Ohr, Bd. 59, H. 1 u. 2.
- Neumann T., Beitr. z. Beleucht. d. Temperaturverhältn. b. Tb. nach leichten Körperbewegungen. Norsk Magazin for Lægeridenskaben 1903, No. 10. M. m. W. 1904, p. 277.
- v. Niessen, Zu Thellungs „Exp. Beitr. z. Fr. d. Agglut. d. Tb.B.“ C. f. B., p. 508.
- Nizzoli, Üb. d. diagnost. Wert d. Diazoreakt. Rif med. 1902, Nr. 118 u. 119, p. 507, 519. M. m. W. 1902, p. 1979.
- de Nobele J. et Beyer Ch., Rech. sur la valeur de l'agglut. du bac. d'Arloing et Courmont etc. Ann. de la soc. de méd. de Gand. 1902. 1903 janvier. Z. f. Tb., 4. H. 1, p. 84.
- Noorden K. v., Die Bleichsucht. Nothnagels spez. Path. u. Ther., Bd. VIII, II. T., S. 125. Wien 1897, A. Hölder.
- Northrup W., The tuberculin test for the presence of tub. Med. News, 23. Apr. 1898. D. m. W. 1898, L. B., p. 178.
- Norvis & Larkin, Two cas. of microb. bronchiopm. with Strept. I. of exp. m. Vol. 5, 1900.
- Ostenfeld I., Mundmessung od. Aftermessung? Z. f. Tb., Bd. 5, S. 451.
- Ott A., Ist die bei Phthisikern nach leicht. Körperanstreng. auftret. Temperatursteig. als Fieber zu betrachten? Sitz. d. T.-Comm. Naturf. Vers. Hamburg 1901. M. m. W. 1901, S. 1997. B. kl. W. 1902, Nr. 6, p. 127.
- Overend, Note concern. a sign often associat. with early phthisis. Lanc., 31. Aug. 1901, p. 592. Z. f. Tb., III, p. 362.
- Pane N., Nota su alkunicasidi pseudotub. polm. Rif. med. 1897, Nr. 192. C. f. B., 25, S. 498. — Un met. simpl. p. l. dim. d. bac. d. Koch nei prodotti tub. i. putrefaz. Rif. med. No. 230; D. m. W. 1900, L. B. p. 255.
- Papapapanagiotu A., Mikr. Diagn. d. beg. Lungentub. u. d. Croups b. Kindern. Ann. d. méd. et chir. infant., 15. Juli 1899. M. m. W. 1899, S. 1655.
- Papillon, Paris, Prétub. et hérédité. Loi de l'hérédo-réact. XIII. inter. m. Cgr. 1900. M. m. W. 1900, p. 1318. W. kl. W. 1900, p. 865.
- Park W. H., Bemerk. üb. d. Wirk. d. Blutserums tub. Tiere u. Mensch. a. d. Tb.B. etc. J. of the Boston soc. of med. sc., Vol. IV, 1900/181. C. f. B., 27, p. 683.
- Parodi, Sul rapido sviluppo del bac. della tub. Gaz. d. Osp. 1902, Nr. 24; D. m. W. 1902, L. p. 83; M. m. W. 1902, p. 1435.
- Patella W., Üb. d. Cytodiagn. d. Ex- u. Transsud., Abstammg. u. Bedeutg. d. sogen. Lymphózyten d. tub. Exsud. Wert d. Cytodiagn. D. m. W. 1902, p. 288. — Sulla citodiagn. degli essud. tub. delle sierose; sulla provenienze e signific. dei cosiddetti linfociti di tali essudati; valore della citodiagnosi. II. Policlinico, 15. febb. 1902.
- Pearson S. V., The diagn. of pulm. tb. in infants and young child. Practition. V. 73, 1904, p. 326.
- Peltriset C. N., Observ. prat. s. l. rech. d. bac. tub. ds. l. crachats. Bull. d. se. pharm., T. VIII, 1903, p. 121. C. f. B., Ref. Bd. 36, S. 606.
- Petruschky Danzig, Über d. diagnost. Verwendbark. d. Spinalgie als Frühsympt. tub. Infekt. 74. Naturf. Vers. Karlsbad 1902. B. kl. W. 1902, p. 1013. M. m. W. 1902, p. 1818. — Über Venenentzündg. als Frühsympt. d. Lungentub. Phlebitis praetub. Naturf. Vers. Karlsbad 1902, p. 85. Die experimentelle Frühdiagn. d. Tb. Gesundheit. 1900, Nr. 8, S. 77. C. f. B., 29, S. 319.
- Phillip R. W., The rôle of percuss. in the diagn. of early pulm. tub. Pract., Vol. 70, 1903, Nr. 1, p. 11—15.
- Pick Fr., Le séro-diagn. de la tub. 19. Cgr. f. i. M. i. Berlin 1901, B. kl. W. 1901, p. 496.

- Pickert M., Üb. den Wert der Tuberkulindiagnostik f. d. Lungenheilstätt. M. m. W. 1903, p. 1872. — Zur Tuberkulindiagn. in d. Heilstätt. Z. f. Tb., Bd. IV, H. 1, p. 21.
- Platey L., D. l. fréq. et d. l'instabilité d. pòuls ds. l. tub. pulm. chron. leur import. pour l. diagn. préc. Th. Paris 1901.
- Podack M., Zur Kenntn. d. sogen. Endothelkrebses d. Pleura u. d. Mucormykose i. menschl. Respirationsappar. D. A. f. kl. M., Bd. LXIII, H. 1 u. 2.
- Pogue G. R., On the early diagn. of pulm. tub. Med. Rec. Vol. 67, 1905, p. 888.
- Poljakow W., Üb. d. diagn. Bed. d. Injekt. v. Na Cl-Lösung b. Tb. Medicinskoje obosrenje März 1898. Pet. m. W. 1898 (p. 28.).
- Pollak C., E. F. v. prim. Lungensarkom. I. D. Würzburg 1897.
- Pollak Jos., Dr., Frühdiagn. d. Tb. aus einem Etwas i. Auge d. Patienten (30. Jhr. ä. Praxis). Greifswald 1902, J. Abel. M. m. W. 1903, p. 613.
- Preisich C. u. Heim P., Über das Wesen der Tuberkulinreaktion. Budapsst. Ä. Ver. 1. März 1902. W. m. W. 1902, p. 1953.
- Prodi, D., Über ein. Fall v. Tb. m. Leukämie. Rif. med. 1903, Nr. 29, p. 792. M. m. W. 1903, p. 2021. — D. orale Auskult. z. Diff.-Diagn. zw. pleur. Reibeger. u. manch. konson. Rasselger. Rif. med. 1905, Nr. 33; Ref. M. m. W. 1905, p. 2508.
- Quensel, Ein neues Sedimentireverfahr. z. Untersuch. v. Sputum. Nord. med. Ark. 1901, Bd. 1, Nr. 4. A. f. D., II., H. 4, Nr. 22. C. f. i. M. 1902, S. 950.
- Quirin A., Beitr. z. Kenntn. d. Lungenphthise im Säuglingsalter. M. m. W. 1902, p. 223.
- Remouchamps, La crépitation laryngée, signe de tub. pulm. S. m. 1903, p. 392.
- de Renzi E., Un caso di carc. del pulm. Rif. med. 1898, Nr. 61. D. m. W. 1898, L. B., p. 114.
- Ribard, Klin. Beginn d. Lgtb. Par. m. Ges. 12. bis 26. Okt. 1903. M. m. W. 1903, p. 1989.
- Riecke W., E. F. v. prim. Lungenaktinomykose m. tötl. Blutung. I. D. Kiel 1903.
- Rieder H., Zur Diagn. d. chron. Lgtb. durch das radiol. Verf. F. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 7, 1903, p. 1; D. m. W. 1903, L. B., p. 296. — Üb. d. Röntgenverf. i. d. intern. Diagn. Ärztl. Ver. München. Nov. 1902. M. m. W. 1903, p. 186.
- Ritter, Zur Bestimmung d. Zahl d. Tb.B., D. m. W. 1893, S. 588.
- Roepke O., Z. Diagnostik d. Lgtb. B. z. Tb., Bd. 1, 1903, H. 3, p. 229. — Bemerk. z. allg. Anw. d. Tuberkulindiagnostik Tbs. Vol. I, 1902, Nr. 5, p. 104. — Üb. d. Frühdiagn. d. Lgtb. i. d. Prax. u. d. Indikat. z. Heilstättenbehandl. Ä. Sachv. Z. 1905, p. 313.
- Romberg E., Zur Serumdiagn. d. Tb. D. m. W. 1901/273, 292.
- Rosenblatt J. M., Zum Nachweis d. Tb.B. i. d. Fäces. C. f. i. M. 1899/755.
- Rosenfeld Georg, Üb. einige Ursach. v. Husten u. Schnupf. B. kl. W. 1903, p. 193. — Die Diagnostik inn. Krkh. mittels Röntgenstrahlen. Bergmann, Wiesbaden. Pr. m. W. 1898, p. 175.
- Rothamel, D. l'agglutination d. bac. d. l. tub. hum. ét. plus spec. chez l. tub. cachect. Th. Bordeaux 1899.
- Rottmann H., Üb. prim. Lungenkarzinome. I. D. Würzburg 1899.
- Rudis-Jicinsky, Üb. d. Frühdiagn. d. Tb. mittels Röntgenstrahlen. N. Y. m. J. 18. Febr. 1899. Z. f. diät. Th., Bd. 3, p. 612. M. m. W. 1899, p. 568.
- Ruik S. v., The early diagn. of pulm. tub. Buffalo m. J., Vol. XLII, 1902/03, p. 77.
- Ruitinga P., De agglutinatatie van Tb.B. ter herkenning van tub. I. D. de Bussy, Amsterdam 1901. Z. f. Tb., III, p. 85. C. f. i. M. 1902, p. 424. — Zur Serumdiagn. d. Tb. Z. f. Tb., Bd. III, 1902, p. 489.

- Rullmann, Üb. eine a. d. Sputum isol. pathog. Streptothrix. M. m. W. 1902, p. 925.
C. f. B., 32, p. 559. M. m. W. 1898, p. 919.
- Rumpf E., Üb. d. Agglutinat. d. Tb. B. üb. d. Verwert. dieser Agglut. D. m. W. 1902, p. 131. — Üb. diagnost. Tuberkulineinspritzungen. Ä. Mitt. a. u. f. Baden 1901, Nr. 22, p. 297.
- Rumpf Th., D. Ergebn. d. Röntgenstr. f. d. i. M. D. m. W. 1905, Nr. 17.
- Sabaréanu & Salomon, Beitr. z. Stud. d. Serumreaktion d. Bazillotub. R. d. m. 1905, Juli. Ref. M. m. W. 1905, p. 2437. (Ref.: Stein.)
- Sabrazès M., Unters. d. kryoskop. Verhalten d. Sputums versch. Kranker. Soc. de. biol. 15. Juni 1901. W. m. W. 1902, p. 284.
- Sampadoris, Zur Frühdiagn. d. Lungentb. M. N. 1899. M. m. W. 1899, S. 1002.
- Saugmann, Fieber u. Nachtschweiße. Hb. v. Schröder-Blumenf. 1904.
- Schabad, Zur Diagn., Kasuistik u. Therap. des Hydropneumothorax. Medicinskoje obosrenje 1900, Nr. 1, im Ref.
- Schellenberg & Scherer A., Was leistet d. Röntgendurchleucht. d. Brustkorb. als Diagnost. b. tb. Lgerkrkg. B. z. Tb., Bd. III, H. 2 u. 3.
- Schlegel M., Z. Lungenaktinomykose. B. tier. W. 1903, Nr. 26. C. f. B., R. Bd. 34, S. 516.
- Schlüter R., Üb. d. diagn. Wert der Tuberkulinreakt. D. m. W. 1904. M. m. W. 1904, p. 400.
- Schmidt Adolf, Bemerk. z. Diagn. d. Lgschw. D. m. W. 1903, p. 713. M. m. W. 1903, p. 1275, 1789.
- Schneider H., Die norm. Temp. b. init. Lgtb. i. Ruhe u. Beweg. I. D. Breslau 1901.
- Schönborn, Gefrierpunkts- u. Leitfähigkeitsbestimm. Ihr pr. Wert f. d. i. M. Bergmann, Wiesbaden 1904. M. m. W. 1904, S. 2103.
- Schreckhaase E., E. F. v. Lungenechinococcus. I. D. Greifswald 1900.
- Schreiber, Üb. Pupillarreakt. m. d. diagn. Wert d. Pupillarstörung. M. Ges. z. Magdeburg. M. m. W. 1904, S. 182.
- Schröder G. und Brühl Th., Üb. d. Bezieh. v. Körperbew., Körperwärme u. Albuminurie zueinander u. z. Fieber i. Verl. d. Phthise. M. m. W. 1902, p. 1373, 1417, 1887. — In welch. Beziehg. stehen Körperbew., Körperw. u. Albuminurie zueinander u. z. Fieber i. Verl. d. Phthise? M. m. W. 1902, p. 1887.
- Schüle, Üb. d. probatorische Tuberkulininjektion. B. z. Tb., Bd. II, 1903, H. 1, p. 69. — Üb. d. Diff. zw. d. Temp. d. Rektum u. d. Achselhöhle. M. m. W. 1900, Nr. 18, p. 603.
- Schur, Fieber b. echter Pseudoleuk. Ges. f. i. M. Wien, 20. Febr. 1901. W. m. W. 1902, p. 426.
- Schwarz B., Bronstein J., Üb. Cytodiagnostik, m. Lit. B. kl. W. 1903, p. 780, 805.
- Schwarzkopf Emil, Exp. Unters. üb. d. Agglutin. b. Tb. M. m. W. 1904, S. 649.
- Seemann C., Z. Roseolenunters. auf Typhusbaz. W. kl. W. 1902, p. 580. C. f. i. M. 1902, p. 836.
- Sehrt Ernst, Beitr. z. K. d. prim. Lungenkarzinoms. I. D. Leipzig 1904.
- Senator H., Berlin, Üb. d. Frühdiagnose d. Phthise. C. geg. d. Tub. 1900. M. m. W. 1900, p. 708. — Üb. einig. ausgew. Punkte d. Diagn. u. Ther. d. Lgtb. B. kl. W. 1900, p. 317, 346.
- Séro-diagnostic d. cancer et l. rôle pathog. d. microc. neoformans. (Doyen, Bender, Petit.) Bull. soc. anat. Paris, Ann. 80, 1905, p. 207.
- Singer, Üb. Venenentzünd. als Frühsymptom d. Lungentb. W. m. W. 1903, p. 602. 74. Naturf. Vers., Karlsbad 1902. M. m. W. 1902, p. 1818.
- Skutezky A., E. F. v. radiosk. sichergest. Lgtb. Prag, m. W. 1903, p. 103.

- Smith A., Meth. of staining sputum for bacteriol. examinat. Boston med. and surg. J. 1902, 18. Dez. C. f. B., Bd. 33, p. 161.
- Sokolowski A. v., Üb. d. larvierten Formen d. Lungentb. Schnitzlers klin. Zeit- u. Streitfragen, Bd. IV, H. 4, Wien 1890.
- Sorgo J., Üb. Tb.B.-Züchtg. a. Sput. u. a. Exsud. b. Pleur. u. Séropneumoth. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 335. — Zum Nachweise d. Tb.B. im Sputum. W. kl. W. Nr. 52.
- Sorgo J. & Sueß E., Üb. ein anat. Stigma angeb. tub. Disp. W. kl. W. 1905, Nr. 48.
- Spengler K., Z. Diagn. geschl. Lgtb., d. Sekundärinf., tub. u. syph. Phthise. Davos 1900. (Richter.) W. kl. W. 1900, p. 1026. C. f. i. M. 1900, p. 1204; Corr. f. Sch. Ä. 1900, p. 752; B. kl. W. 1901, p. 217. — D. Sengzücht. d. Tb.B. i. Sput. Z. f. Hyg. 1905, Bd. 51. M. m. W. 1905, S. 2144. — Üb. Splittersputa Tuberkulöser. Z. f. H. Bd. 49, 1905, p. 541. — Z. Diagn. u. Progn. d. Misch.- u. Begleitinf. b. Lungentb. D. m. W. 1902, L. p. 6. Z. f. Tb., 4, H. 1, p. 88. C. f. B., 30, p. 765.
- Squire E., The early recognit. of pulm. tb. (Med. Mag., Juni 1901.) M. m. W. 1901, Nr. 31, p. 1258.
- Stadlinger H. E., How to recogn. tub. changes in the apices of the lungs on percuss. Phil. m. j. 1902, Vol. 10, Nr. 11, p. 367.
- Stembo, Zur diagnost. Verwertg. d. Röntgen-Untersuchg. D. m. W. 1899, Nr. 28.
- Stenbeck-Litten, Die Zentrifuge im Dienste der klin. Med. D. m. W. 1891, S. 749.
- Stern, Üb. Lungensteine. D. m. W. 1904, Nr. 39. Rf. M. m. W. 1904, p. 1728.
- Stoicescu & Bacaloglu, Üb. pulm. Tb. vortäusch. Influenza. Spitalul, No. 17, 1904. M. m. W. 1904, S. 2201.
- Straßburger J., I. Ein veränderl. Sedimentierungsverfahr. z. mikroskop. Nachw. v. Bakterien. II. Üb. d. Nachweis v. Tb.B. i. d. Fäces. M. m. W. 1900, Nr. 16, p. 533. Z. f. Tb., I, p. 348.
- Strauß H., Üb. d. Wege d. Frühdiagn. d. Lungentb. B. kl. W. 1900, p. 544.
- Stroschein, Mitteilungen aus Brehmers Heilanstalt, 1889, S. 285.
- Stubbert Edward, The early diagnos. of pulm. tub. with exhibit. of ray pictures of diseased lungs. New York County Med. Assoc. State d. Meeting, 16. Dec. 1901. M. m. W. 1902, p. 294.
- Stumpf J. E., Radioscopie en radiograph. van de longen. Weekbl. van het Nederlandsch. Tijdschr. voor Geneesk. 1899, 18. Nov. D. m. W. 1900, L. B., p. 84.
- Suprino R., La ricerca delle fibre elastiche nell' espettorato e l'importanza do loco reporto di fronte al bacillo di Koch nelle diagnosi di tub. polmon. Cl. m. ital. 1901, Nr. 9. C. f. i. M. 1902, p. 320.
- v. Tabora, Z. physik. Diagn. d. Pleuraexud. M. m. W. 1904, S. 2327.
- Tedeschi, Studie ulteriori sulla splenomegalia pretuberculare. Rif. med. 1900, Nr. 264 u. 265. C. f. i. M. 1901, S. 366. M. m. W. 1901, S. 515. — Üb. Milztumor b. latent. Tb. 10. C. d. ital. V. f. i. M. 1899. M. m. W. 1899, p. 1630.
- Thellung F., Exp. Beitr. z. F. d. Agglut. d. Tb.B. u. z. Beh. d. Tub. m. Neutuberkulin. Koch. C. f. B., I. Abt., Bd. XXXII, 1902, Nr. 1, p. 28.
- Thomayer J., Die Frühdiagn. d. Lgtb. Sboreik klinieky, Bd. III, p. 201. C. f. i. M. 1902, S. 969.
- Thomson H., The early diagn. of pulmon. Tub. Lanc. 24. Jan. 1903. Vol. 1, p. 231. M. m. W. 1903, p. 485.
- Trevithick, N. on the meth. of demonstrat. tub. bac. in the urine. Br. m. J., No. 2244. C. f. B., R. Bd. 34, S. 566.
- Trudeau E. L., The importance of a recognit. of the significance of early tub. in its relat. to treatm. Transact. of the Ass. of Am. Physic. 1901. Z. f. Tb., III, p. 541. M. N. 1901/1013. — The tuberculin test in incipient and suspected pulm. tub. M. N., 29. Mai 1897. D. m. W. 1898, L. B., p. 74.

- Tscheglow M., E. F. v. Pseudo-Aktinomykose d. Lunge. Medicinskoje obosrenje 9—10, Nov.—Dez. 1897. Pet. m. W. 1899, S. 6.
- Tuffier, Milian, Mikrosk. Unters. behufs Unterscheid. v. tb. Peritonitis u. Ovarienzysten. Fr. Ges., April 1901. W. m. W. 1901, p. 2412. C. r. biol. 1901/436.
- Turban, D. Vererb. d. Loc. min. resistentiae b. d. Lgschw. Z. f. Tb. 1900, Bd. I, H. 1 u. 2, p. 30, 123.
- Vargas-Suárez, Üb. Urspr. u. Bedeutg. d. i. Pleuraergüssen vorkomm. Zellen. B. z. Tb. 1903, Bd. II, H. 3.
- Vasilescu T., D. Serodiagn. b. Tb. I. D. Bukarest 1904. M. m. W. 1905, S. 1651.
- Vetlescu, Zur Diagn. d. Lungentub. Lyon méd. 1897, p. 49. W. m. W. 1898, p. 612.
- Vincent H., Sur l'agglutination du bac. de Koch cultivé dans l'eau peptonée. Soc. de biol. 1903, Nr. 15, p. 533. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 83. — S. l. cytol. et s. l. signif. d. pleurés. typiq. C. r. soc. biol., T. 55, 1903, p. 1305.
- van Voornveld H. J. A., Üb. d. Resultate v. Sputumunters. b. Lungentb. I. D. Zürich, F. van Rossen, Amsterdam 1900. Z. f. Tb., II, p. 277.
- Wagner, Diagn. ein. prim. Lungentum. Med. Ges. i. Chemnitz 1902. M. m. W. 1902, p. 767.
- Walsham H. & Beale C., On the use of the Roentg. rays i. the diagn. of pulm. tub. Phil. m. J. 1901/406. M. m. W. 1901, Nr. 8, S. 322.
- Weil et Descos, Cytologie et sérodiagnostie tub. Bull. Soc. méd. hôp., 14. März 1902.
- Wells E. F., The early diagn. of pulm. tb. Am. med. Ass., No. 18, 1900, p. 1107. D. m. W. 1900, L. B. p. 124.
- Wertheimer Th., Üb. d. diagn. u. ther Wert d. Lumbalpunkt. b. d. Mening. M. m. W. 1904, S. 1004.
- Widal, Méth. pour l'examen cytolog. Pr. méd., Paris 1901, p. 15. — A propos du cytodiagnostie. Pr. med., 5. Oct. 1901.
- Widal et Ravaut, Applicat. clin. de l'ét. histol. des épanchem. séro-fibrineux de la plèvre (pleurésies tub.). C. r. biol. 1900/648. S. m. 1900, p. 227. — Cytodiagn. d. épanchements séro-fibrin. de la plèvre. Cgr. de méd., Paris 1900. — Rech. sur l'agglutinat. du bac. de Koch et le cyto-diagn. etc. T. C. London. Gaz. des hôp. 1901/94. C. f. B. 31, p. 91.
- Widal, Sicard, Ravaut, 1. Die Cytodiagn., 2. die Cryoskopie d. tb. Meningitis. Soc. de biol. 1900/838. M. m. W. 1900, p. 1646.
- Wild O., Üb. vollk. u. unvollk. Entfieberung b. hochfieberh. Lgtb. B. z. Tb., Bd. III, H. 3, p. 179.
- Williams H. Francis, Boston, Üb. d. Wert d. Unters. m. Röntgenstrahlen i. d. Anfangsstad. d. Lungentb. M. N., 16. Sept. 1899, und Röntgenbilder beim Pneumothorax u. Pneumohydrothorax. Phil. m. J., 23. Sept. 1899. M. m. W. 1900, p. 59.
- Williams C. Th., A. lect. on the diagn. of pulm. tb. Br. m. J. 1903, p. 1317.
- Winternitz H., Beitr. z. funkt. Diagnostik d. Lungenkrankheiten. Med. Klin. 1905, Nr. 49. 77. Naturf. Vers. Meran. M. m. W. 1905, p. 2048.
- Witte J., Studie üb. d. Verhältn. v. elast. Fasern u. Tb.B. i. tb. Sputum. I. D. München, Juli 1902.
- Wolf S., Z. Frühdiagn. d. Tb. I. D. Würzburg, Febr. 1902.
- Wood, The diagn. value of tuberculin. J. Am. m. Ass. Nr. 16, p. 996. D. m. W. 1902, L. p. 120.
- Wood C., Necessity of examin. of the sputum i. the Diagn. of pulm. tub. (Journ. Am. m. Ass. No. 16/1900, p. 1019.) D. m. W. 1900. L. B., p. 267.
- Wright A., A. note on the serum react. of tubercle. Lanc. 1903, Vol. I, p. 1299.
- Wunderlich, Spez. Path. u. Therap. Stuttgart 1856, Bd. IV, S. 534.

- v. Zebrowski E., Z. Fr. d. Untersuchg. d. pleurit. Exsud. a. Tb. B. M. m. W. 1905, p. 1841.
- Zollikofer R., Üb. d. Bef. v. protagonhalt. Körnern b. Probepunkt. d. Thorax u. üb. d. Vork. ders. i. Tumoren u. and. Affekt. d. Lunge. Corr. f. Schw. Ärzte, 32. Jg., Nr. 12. C. f. i. M. 1902, p. 952. M. m. W. 1902, p. 1111.
- Zupnik, Üb. d. Tuberkulinreaktion. Ver. d. Ä. i. Prag, Jänn. u. Febr. 1903; M. m. W. 1903, p. 444, 1219; 74. Naturf. Vers. 1902, Karlsbad; M. m. W. 1902, p. 1818; C. f. B. 33, p. 645; B. kl. W. 1902, p. 1014; D. m. W. 1903; V. B., p. 175. D. A. f. kl. M. 1903, Bd. 76, H. 1—3, p. 290.

Traumatische Phthise.

- v. Behring, Üb. Tb., D. Naturf. Vers. 1903.
- Chaffy, Du rôle étio. d. traumat. et d. l'hémorragie ds. l. phth. pulm. Th. Lyon 1881.
- Coester, Traumat. akut. Miliartb., Ä. Sachv. Z. 1899, Nr. 1.
- Desrousséaux P. J., Tb. pulm. consécut. aux traumat. thoraciq. Th. Lille 1903.
- Dychno R., Z. Fr. d. traum. Entst. d. Lgtb., I. D. Freiburg 1904.
- Ewald, Trauma u. Phth. N. Y. m. W. 1900, Nr. 9.
- Fraenkel A., Üb. d. ak. Form d. Lgtb. Berl. kl. W. 1902, Nr. 21 u. 22.
- Franke, E. F. v. traumat. Lgtb. Msch. f. Unf.-Hlk. 1898, Nr. 6, 11.
- Fürbringer P., Fingerverletz. u. akut. Miliartb. Ä. Sachv. Z. 1904, Nr. 7.
- Gass, Tb. u. Unfall. Mschr. f. Unf.-Hlk. u. Invalidenwes. 1904, p. 85.
- Gosselin, Sur les déchirures du poum. Mémoires d. l. soc. d. chir. I, 1847.
- Grawitz, D. mil.-ä. Z. 1889, H. 10.
- Grosser P., Üb. d. Zusammenhg. v. Lgtb. u. Trauma. D. m. Z. 1904, S. 109, 121; I. D. Leipzig 1903.
- Harris, On pneum. follow. injur. to the chest a. the possible occurrence of pulm. tb. as a sequence to trauma. Lane. 1898, I, 16. April.
- Hildebrand, Tb. u. Skrof. Stuttgart 1902.
- Heller, Üb. traum. Entsteh. inn. Krankht. M. Ges., Kiel, Aug. 1903; M. m. W. 1904, S. 1491.
- Hervouet, Traumat. et tb. pulm. au point de vue medico-légal. Th. Bordeaux 1903.
- Jaccoud, D. l. phth. traumat. Semaine méd. 1889.
- Jaruntowski, Nowiny lekarskie 1892. Ref. D. M. Z. 1892, p. 799.
- Köhler F., Kas. Beitr. z. Unfallsbegutacht. etc. Ä. Sachv. Z. 1904, Nr. 22.
- Lannelongue et Achard, Traumat. et tub. infl.; d. mouvem. s. l'évolut. d. ostéoarthrites tub. Bull. de l'Ac. 1905, p. 132; Soc. med. des hôp., Febr. 1905; M. m. W. 1905, p. 731.
- Lebert, Traité clin. et prat. d. l. phth. pulm. et d. mal. d. divers organes. Paris 1879; Observ. d. phth. consécut. à des traumat. d. l. poitrine. R. mens. de méd. et chir. 1877.
- Liebermeister, Üb. Tb., D. m. W. 1888, p. 566.
- Litten, Üb. d. durch Kontus. erzeugt. Erkrkg. d. Brustorg. Z. f. kl. M., V. 1, 1882.
- Mandry, Z. Kasuist. d. traumat. Tb. Memorabilien 1899, H. 7.
- Mayer, Tb., Urs. u. zugleich Folge v. Trauma. Ä. Sachv. Z. 1897, Nr. 23.
- Moser, Trauma, Lgblutg., Lgtb. Ä. Sachv. Z. 1904, p. 213, 240.
- Muzell, V. e. d. e. Stoß verurs. Blutstürzg. u. dar. erfolgt. let. Lgschw. Med. u. chir. Wahrnehm. Berlin 1754.
- Petrow N. N., Gelenktb. u. Trauma. C. f. Ch. Nr. 47, 1904.
- Procházka, Traumat. ds. l'étiol. d. l. Tb. Ref. in Z. f. Tb. 1901, Bd. II.
- Ranalletti, Traumat. Ätiol. d. Tb. M. m. W. 1904, S. 1939.

- Reinert, Üb. d. Einfl. v. Traumen auf d. Entstehungsf. Lg.-, Pleura-, Herzerkrankg. Festschr. d. Stuttgart. ärztl. Ver. 1897.
- Riebold G., E. Fall v. traum. Lghernie ohne. äuß. Verletzung. M. m. W. 1904, S. 433.
- Rigler, Üb. d. Folg. d. Verletzg. a. d. Eisenbahn etc. Berlin 1879.
- Salvia, Üb. d. Einfl. gering. Traumen a. d. Lokalis. d. Tb., Policlinico 1904. M. m. W. 1904, S. 2021.
- Schmey, Ä. Praxis, Würzburg 1898.
- Schönfeld, E. F. v. traum. Lgtb. Mschr. f. Unf.-Hlk. 1898, Nr. 6.
- Scholz, Üb. d. traum. Phthise. I. D. Breslau 1872.
- Schrader, E. F. v. traum. Phthise. Berl. kl. W. 1897, Nr. 46.
- Schüller, Einige Bemerkg. z. traumat. Tb., Ä. Sachv. Z. 1899, Nr. 8.
- Schwarz, Beitr. z. Lehre v. d. traumat. Entstehg. u. Ausbreitg. d. Tb. im Körper. I. D. München 1900.
- Silberstein L., D. Entstehg. d. Lgtb. nach Trauma. I. D. Leipzig 1903.
- Sokolowski A., Kann e. Trauma d. Urs. f. d. Entstehg. d. Lgschw. abgeb. etc.? Z. f. Tb., Bd. IV, H. 5.
- Stern, Üb. traumat. Entstehg. innerer Krkht. Jena 1896, H. 1; Mschr. f. Unf.-Hlk. 1898, 6. — Trauma u. Lgtb. I. D. Bonn 1903.
- Urban, M. m. W. 1897, Nr. 11.
- Voß W., Kl.-statist. Beitr. z. Fr. d. sogen. traumat. Lokaltub., spez. d. Knochen u. Gelenke. I. D. Rostock 1903. M. m. W. 1905, S. 429.
- Weigel, Zwei Fälle v. Lgtb. nach Trauma. M. m. W. 1905, S. 675.
- Weygandt W., Üb. d. Bez. zwisch. Unf., Tb. u. Geistesstör. Ä. Sachv. Z. 1904, p. 429.
- Ziemke, D. traumat. Entsteh. d. tub. Peritonit. 76. Naturf. Vers. Breslau 1904; M. m. W. 1904, S. 1376.

Komplikationen und Mischinfektion.

- Auelair, Mischinf. b. d. Tub. Par. med. Ges. 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 152.
- Babes, Rech. sur les assoc. bact. d. bac. d. l. tub. Progrès méd. roumain 1888, Nr. 36, 6. Sept.
- Baldwin E. u. Wilder J., A case of lymph. leukaem. comb. with pulm. tb. Am. J. of the m. sc. June 1899. M. m. W. 1899, p. 1188.
- Beco L., Rech. s. l. fréq. d. septicémies sec. au cours d. infect. pulm. A. d. m. exp. 1899, p. 317, R. d. m. 1899, p. 385. C. f. B., Bd. 28, p. 57. C. f. i. M. 1900, p. 817.
- Blondin P., Essai s. l. rôle d. bac. d. Koch ds. l. genèse d. cert. cirrh. d. foie dites-alcool. Th. Paris 1905.
- Brill, Lipman, E. F. v. Pyocyaneusseptikämie. Am. J. of m. sc. Aug. 1899. B. kl. W. 1899, L. p. 85.
- Chazarain-Wetzel, La bacteriol. d. l. tb. pulm. L. assoc. d. bac. d. Koch. Paris, Bailliére et fils 1904.
- de Cigna, Mischinf. im Sputum Tub. Gaz. d. osp. 1901, Nr. 149. M. m. W. 1902, p. 543.
- Clément E., Myélites p. toxines tub. C. r. ac. d. se., T. 140, 1905, p. 392.
- Debove, L. bacillémie tub. subaigue. Gaz. des hôp. Année. LXXVI. 1903, Nr. 29, p. 289. D. m. W. 1903, L. B. p. 85.
- Duburque, Infl. d. altérat. hépatiq. s. l. près. d. sang ds. l. épanchem. pleureux d'orig. tub. Th. Paris 1904. C. f. B., Bd. 35/14.
- Ehrhardt, Üb. d. Mischinf. b. Lgtb. I. D. Königsberg 1897.
- Esau P., E. F. v. Miliartub. m. Staphylokokkensepsis u. schwer. Darmblutungen. M. m. W. 1905, p. 1772.

- Fornaca L., Contrib. allo stud. d. setticem. d. microc. tetrageno nell' uomo. Rif. méd. Anno XIX, 1903, Nr. 13, p. 346.
- Fränkel A., Üb. d. Bedeutg. d. Mischinf. b. Tub., B. kl. W. 1898, p. 315. C. f. i. M. 1899, p. 528.
- Hanseemann, D. sek. Infekt. m. Tb.B., B. m. G. 1898, Disk., p. 245, 247. B. kl. W. 1898, p. 233.
- Hirschlaff, D. m. W. 1898.
- Jakowski, Beitr. z. Fr. üb. d. sog. Mischinf. b. Phthis., Unters. d. Bl. etc. C. f. B. 1893, Bd. 24, Nr. 23, p. 762.
- Jessen F., Lgschw. u. Nervensyst. Jena (Fischer) 1905.
- Jochmann G., Üb. d. Bakt. b. d. Lgtb. E. Beitr. z. Fr. d. Mischinf. A. f. kl. M. 1905, Bd. 88, H. 5. M. m. W. 1905, S. 1940.
- Jünger, E. F. v. Leukämie, kompliz. m. Miliartb. V. A., Bd. 162, H. 2.
- Kerschensteiner H., Stud. z. Bakteriolog. d. Lungen- u. Bronch.-Eiterungen. A. f. kl. M. 1903, Bd. 75, H. 1 u. 2, p. 132; M. m. W. 1903, p. 169. — Z. Lehre v. d. Mischinf. b. Lgtb. Sitzber. d. Ges. f. Morph. u. Phys. München, XVIII, 1902, H. 1, ersch. 1903, p. 53.
- Klebs Edw., Parasit. Begleit. d. Tb. D. kaus. Ther. Bremerhaven. 1903, p. 11 u. 51; C. f. Bd., Ref. B. 35, p. 543.
- v. Koreziński L. R., Üb. d. Einfl. d. Tb.B.-Gifte a. Wachstum u. Giftigk. and. Bakt., spez. d. Bakt. col. comm. W. kl. W. 1905, p. 29.
- Kräutl, Üb. d. Bez. d. Streptokokkenvirulenz z. sept. Fieber d. Phthisiker. Württ. med. Korrr. 1897, Nr. 15.
- Kraus, Bakt. Blut- u. Harnuntersuchungen. Z. f. Hlk., Bd. 17, p. 117.
- Laignel, Lavastine et Bloch P., Syndr. d. Based. chez une tub. A. gén. méd. 1904, p. 2456.
- Lanos E., D. l. cirrh. cardio-tub. chez l'enf. Th. Paris 1904.
- Lartigau A. J., A contrib. to the study of the Microc. tetrag. in ac. angina. Phil. med. J., Vol. III, 1899, p. 899; C. f. B., 28, p. 393 (Ref.).
- Lasker, Bakt. Blutunters. b. Lungenphthise. D. Ä. Ztg. 1901, H. 2.
- Lemmiere, L'ensemencement du sang. Paris 1904.
- Maragliano (Genua), Üb. d. Bed. d. Mischinf. v. klin. Standp. Cgr. geg. d. Tub. 1900; M. m. W. 1900, p. 708.
- Macfadyen A. u. Rowland S., Üb. d. intrazell. Toxine gew. Mikroorgan. C. f. B., I. Or. Bd. 35. S. 415.
- Michelazzi, Int. all' infl. d. microc. tetrag. sub processo tub. d. pulm. Rif. med. 1902, No. 239—42, p. 158, 170, 182, 194; D. m. W. 1902, L. p. 287.
- Mironescu Th., Beitr. z. Stud. d. elast. Gew. i. d. Leber b. Infektionskrkh. V. A., Bd. 174, 1903, p. 406.
- Monteverdi J., Un caso d. bronchite d. tetrageno Gaz. d. osp. 1898 (20. Nov.), Nr. 139; C. f. i. M. 1899, p. 1272.
- Morello e Vaccari, Contrib. sperim. allo stud. d. assoc. batter. nella tub. pulmon. Ann. d'ig. sperim. N. S., Vol. XIV, Fasc. 1; C. f. B., Ref. Bd. 36, S. 577.
- Müller C., Pityr. versie. u. Microsp. furfur. I. D. Straßburg 1904. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 325, m. Lit.
- Murrell W., A case of splen. leukaem. terminat. i. tb. Lanc. Juli 1902. Z. f. Tb., 4, p. 78.
- Oestern Karl, Beitr. z. K. d. Bakt.-Flora d. erweicht. tub. Herde d. Rind. C. f. B., Bd. 37, 1. Abt., Or., 1904, p. 498.
- Ophüls W., Mixed infect. in pulm. tb., Tr. of the Brit. Cgr. on tb. London 1901. C. f. B., I. R., Bd. 34, S. 707.

- Paquin P., Illustr. of mixed. infect. in pulm. phthisis. J. Am. med. Ass. 1903, Bd. XL, p. 1339. D. m. W. 1903, L. B., p. 143.
- Parker G., Splen. leukaem. a. phth. comb. i. th. same patient, Br. m. J. 1902, p. 1136. D. m. W. 1902, L., p. 124.
- Pernice, Üb. eine best. nekrot. Veränd. d. Leberzellen b. tub. Infekt. Rif. med. 1904, Nr. 22. M. m. W. 1904, S. 1890.
- Petrow N., L'infect. mixte ds. la tb. chirurg. Ann. Past. 1904, p. 502. M. m. W. 1904, S. 2310.
- Petruschky, Tub. u. Septikämie. D. m. W. 1893, Nr. 14. Z. f. H. 1894, Bd. 17.
- Pfeiffer R., D. Mischinf. b. d. Tub., Arch. f. pr. u. wiss. Tierhkd. 99/418. B. T. C., p. 195.
- Pick Alois, Z. Fr. d. Mischinf. b. d. Lgtb. W. kl. R. 1905, p. 253.
- Pollak Eugen, Üb. nerv. Taubheit b. Lgtb. B. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 409.
- de Poveda Malo, La asoc. antitub. Española y la hyg. milit. El siglo med. Año. 51. 1904, Nr. 2649, p. 627.
- Ramond & Ravaut, Act. des microb. sur le développement d. bac. d. l. tub. A. d. méd. exp. 1899, p. 494. C. f. i. M. 1900, p. 819.
- Risel, Üb. e. F. v. Schimmelmikose d. Lunge. Med. Ges. z. Leipzig v. 20. Okt. 1903. M. m. W. 1903, p. 2121.
- Roasenda G., Sindrome cerebellare da tub. Arch. di psich., neuropat. 1905, p. 308.
- Sata A., Üb. d. Bed. d. Mischinf. b. Lgsehw. Zieglers Beitr. 1899, III. Suppl., p. 179; B. kl. W. 1901, p. 217. Z. f. Tb. I., p. 72. C. f. i. M. 1900, p. 496. — Üb. d. Bed. d. Mischinf. f. d. klin. Erschein. u. d. Verl. d. Tub. Z. f. Tb. 1901/43, Bd. II. — Üb. d. Mischinf. Cgr. geg. d. Tub. 1900. M. m. W., 1900, p. 708. Corr. f. Sch. Ä. 1900, p. 513.
- Schabad A., Mischinf. b. Lgtb. Z. f. kl. M. 1897, Bd. 33, H. 5 u. 6. M. m. W. 1898, p. 401.
- Schröder G., Üb. d. Bed. d. intrazell. Glykogenreakt. d. Leukoeyten f. d. Lehre v. d. Mischinf. im Verl. d. chr. Lgtb. M. m. W. 1904, S. 473. — Z. Fr. d. chron. Mischinf. im Verl. d. Phth. pulm. B. z. Tb., Bd. IV, 1905, p. 57.
- Schröder G. & Naegelsbach W., Bakterienbefunde im Blut v. Phthisikern. M. m. W. 1899, Nr. 42.
- Schröder G. & Mennes Fr., Üb. d. Mischinf. b. d. chron. Lgtb. Pr. m. W. 1898, p. 589; Th. M. 1899, p. 573; W. kl. W. 1898, p. 2190; W. kl. W. 1899, p. 133.
- v. Schroen O., D. neue Mikrobe d. Lungenphthisis u. d. Unterschied zw. Tub. u. Schwinds. München (Haushalter).
- Schulz, Z. Fr. d. Mischinf. b. Lgtb. (Diphtherie u. diphth.-ähnl. Baz. i. tub. Lgn.). B. kl. W. 1898, Nr. 14—16. C. f. i. M. 1899, p. 527.
- Schütz, Z. Fr. d. Mischinf. b. Lgtb. Naturhist. med. Ver. Heidelberg, 25. Jän. 1898. M. m. W. 1898, p. 283. B. kl. W. 1898, p. 297, 335, 356.
- Simmonds, Üb. bakt. Blutunters. a. d. Leiche. V. A., 175, p. 418.
- Sittmann, Bakterioskop. Blutunters. A. f. kl. M. 1894, Bd. 53.
- Solly S. E., Bronchiect. in the tb. An unusual case reported. M. N. 1903, p. 721.
- Soltmann O., Z. Lehre d. Pathogenität d. Bac. pyocyan. A. f. kl. M. 1901, Bd. 73; M. m. W. 1902, p. 493.
- Sorgo J., Üb. Tb.B.-Züchtung aus Sputum u. aus Exsudat b. Pleuritis u. Seropneumothorax. E. Beitr. z. Fr. d. Mischinf. b. Lungenphthise. Z. f. Tb., Bd. 6, p. 335. — Üb. d. sogen. Sputumkern. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 532. — Üb. d. Sekundärinf. b. Tub. W. kl. W. 1904, Nr. 26, p. 725.

- Strauß, Tub. et infections secondaire. S. m. 1894, p. 253.
 Sturmdorf A., Splen.-myel. leukaem. with pulm., laryng. a. fauc. tb., Am. J. of the m. sc. 1901, p. 166; B. kl. W. 1901, L., p. 53.
 Teissier, D. Sekundärinf. b. Tub. 13. Int. m. Cgr. i. Paris, Aug. 1900. B. kl. W. 1900, p. 921.
 Theilhaber, Üb. chron. Metritis b. Bleichsucht u. bei Lungenspitzenaffektion. Ä. Ver. München v. 14. Okt. 1903. M. m. W. 1903, p. 2164.
 Thue K., Üb. Sekundärinfekt. b. Tub. N. m. Arkiv. 1904, Afd. 2 (Inre med.), Häft 4, N. 15, p. 16.
 v. Weismayr A., Z. Fr. d. Mischinf. b. Lgtb. Z. f. Heilk. 1901, p. 1905. C. f. i. M. 1902, p. 421.
 v. Wunschheim, D. Lgtb. als Mischinfektion (mit Lit. bis 1895). Pr. m. W. 1895.
 Zanoni, La ponction du poumon. Méd. mod. 1900, p. 41. W. m. W. 1900, p. 722.
 D. m. W. 1900. L. B., p. 22. C. f. i. M. 1900, p. 805. — Contrib. allo stud. d. ass. microb. pulm. d. tub. pulm. Clin. m. ital. 1899, Nr. 5. C. f. i. M. 1900, p. 497.

Prognose.

- Berthier, Valeur pron. de l'expect. bac., Tr. r. acad. med. Ireland 1902. J. XX, p. 166—170; R. d. l. tub. 1902, p. 255.
 Brown, The progn. value of tub. bac. in sput. J. Am. med. Ass. 1903, Nr. 8; D. m. W. 1903, L. B., p. 76.
 Clemens P., D. Diazor. d. Harns. A. f. kl. M., Bd. 63, H. 1/2, p. 74.
 Gottstein A., Beitr. z. Progn. d. Lgschw., Th. M. 1900, August, p. 703.
 Jaccoud, La curab. et le traitement d. l. phthisie pulm. Paris 1881.
 Mircoli, Üb. klin. Bed. versch. Tb. B.-Form. Gaz. deg. osp. 1905, Nr. 49; M. m. W. 1905, S. 1989. — D. lat. Fieber b. d. chron. Tb., A. f. kl. M., Bd. 63, H. 1/2, p. 162 (30. Mai 1899).
 Oeder, Wie lange kann ein Mensch leben, d. zum Diab. mell. eine Lgtb. hinzu bekommen hat? D. m. W. 1903, p. 455 u. 693; C. f. B., 33, p. 153.
 Pickert M., Üb. d. Progn. d. chron. Phthise m. bes. Berücks. d. Heilstättenbewegung. M. m. W. 1899, p. 785.
 Price Fred. W., The progn. a. treatm. of early pulm. tub. Edinb. m. J., Vol. 17, 1905, p. 451.
 van Riemsdyk, Syphilis acquis. in longtub. I. D. Amsterdam 1899. C. f. i. M. 1900, pag. 382; Z. f. Tb., II., p. 180.
 Schneider H., Üb. d. progn. Bed. d. Puls b. chron. Lgtb. 76. Naturf. Vers. Breslau, Sept. 1904; M. m. W. 1904, S. 1374 u. 1805; D. Ä. Z. 1904, p. 533.
 Schamelhout G., Le pron. d. l. tub. pulm. chron. Ann. d. l. soc. méd. d'Anvers 1900. Mars, Avril.
 Sewall H., A prelim. note on the relat. of the form of the tub. bac. To the clin. aspects of pulm. tub. Med. News 1901, p. 418.
 Shattuck, Progn. and treatment of tub. peritonitis. Am. J. of m. sc. 1902. Mai; C. f. i. M. 1902, p. 1134.
 Stadler Ed., D. Einfl. d. Lgtb. auf Lebensdauer u. Erwerbsfähigk. u. d. Wert d. Volksheilst.-Behdlg. A. f. kl. M. 1903, Bd. 75, H. 3/6, p. 412; M. m. W. 1903, p. 1001.
 Sterling S., Üb. d. progn. Bedeut. d. konstant. Pulsbeschleunigung i. Verlauf d. Lgtb. M. m. W. 1904, p. 103.
 Strümpell, Üb. d. Fieber b. d. Lgtb. u. s. progn. Bedeutung. M. m. W. 1892.
 v. Szaboky J., Beob. üb. d. Temperaturverl. d. Tb. u. d. Verwert. d. b. d. Progn., W. m. R. Nr. 36; M. m. W. 1904, S. 1890.
 Turban, Beitr. z. Kenntn. d. Lgtb. Wiesbaden 1899, p. 125.

7. Kapitel.

Prophylaxis.

Für die Bekämpfung der Tb. erwachsen uns aus der Erkenntnis, daß die Ursache dieser Erkrankung der Tb. B. ist, mehrfache Aufgaben. Man muß suchen: 1. ihn zu vernichten, seine Verbreitung einzuschränken, seinen Eintritt in den Körper zu verhindern, 2. ihn, wenn er einmal eingedrungen ist, tunlichst bald durch die Kräfte des Organismus zu entfernen oder sein Wachstum einzudämmen.

Der erste Teil dieser Bestrebungen bildet den Gegenstand der sogenannten antibazillären Prophylaxis, der zweite den der individuellen Prophylaxis und zum Teil der Therapie.

I. Antibazilläre Prophylaxis.

Die Grundpfeiler der antibazillären Prophylaxis, bezüglich deren ausführlicher Motivierung ich auf den ätiologischen Teil dieses Buches verweise, bilden folgende Tatsachen:

Der Tb. B. ist ein **strenger Parasit**, d. h. er vermag unter **natürlichen Verhältnissen** sich **nicht außerhalb des tierischen Körpers** zu vermehren, teils weil er ein höheres Wärmebedürfnis hat, besonders aber, weil er seines langsamen Wachstumes wegen von Saprophyten jeglicher Art, wie sie überall in der Natur vorkommen, überwuchert wird. In die freie Natur, in die Umgebung des Menschen gelangt er nur durch die Se- und Exkrete tuberkulöser Menschen und Tiere und durch Fleisch und Milch tuberkulöser Tiere.

Eine Ansteckung findet, wie wir in den Kapiteln der Infektion gesehen haben, **in der Regel** nur statt durch die **Einatmung** bazillenhaltiger Luft, durch Genuß bazillenhaltiger Nahrung, durch direkte Berührung, wenn Tb. B. durch Risse und leichte Wunden in die Haut oder äußere Schleimhaut gelangen.

Die letztere Art der Infektion hat relativ die geringste Bedeutung; sie zu verhindern, genügt meist Reinlichkeit, Wasser und Seife. — Der Nahrungsinfektion ist durch Kochen der Speisen, durch Beaufsichtigung des Schlachtbetriebes und durch Kontrolle der Milchkühe zu begegnen. — Weitaus die größte Gefahr liegt in der Einatmung des getrockneten